

小学校の復習 (1)

p.4~p.7

- 1** (1) 100 (2) 36 (3) 102
(4) 53 (5) 300 (6) 17
(7) 16 余り 2 (8) 2 (9) 17
(10) 36
- 2** (1) 10.02 (2) 4.48 (3) 8.4
(4) 7.8 余り 0.02 (5) 4
- 3** (1) 1, 3, 9, 27 (2) 32, 64, 96
(3) 8 (4) 105
- 4** (1) 8.9 (2) 3400 (3) 3.8
(4) 600 (5) 3332 (6) 2575
- 5** (1) 約 680000 (2) 約 180000
- 6** (1) 約 1000000 (2) 約 1200
- 7** (1) $\frac{7}{8}$ (2) $\frac{49}{84}, \frac{33}{84}$
(3) $\frac{6}{13}$
- 8** (1) $\frac{9}{10}$ (2) $\frac{2}{3}$
(3) $\frac{5}{6}$ (4) $\frac{49}{48} \left[1 \frac{1}{48} \right]$
(5) $\frac{1}{5}$ (6) 57
- 9** (1) 0.29 (2) 0.345
(3) 0.7 (4) 0.51
- 10** (1) 24% (2) 30 人 (3) 525L
(4) 99g (5) 3040 円 (6) 1620 人
- 11** (1) ひろとさんの畑 (2) A 市
- 12** (1) 48 分 (2) 時速 4km
(3) 2400m (4) 3 時間
- 13** (1) 5 : 3 (2) 4 : 7
(3) 3 : 2 (4) 9 : 8
- 14** (1) 10 (2) 8 (3) 3
- 15** (1) 720 円 (2) 55 枚
- 16** (1) 比例 (2) ×
(3) × (4) 反比例
- 17** (1) $y = 80 \times x$
(2) 式... $y = 5 \times x$ y の値...100

解説

- 1** (8) $(12+8) \div (5 \times 2) = 20 \div 10$
 $= 2$
(9) $3+4 \times 5-6 = 3+20-6 = 17$

$$(10) 12 \div 2 \times 6 = \frac{12 \times 6}{2} = 36$$

- 2** (4) 余りの小数点の位置に気をつける。

3 (1) $27 = 1 \times 27 = 3 \times 9$

(2) $32 \times 1 = 32, 32 \times 2 = 64, 32 \times 3 = 96$

(3) 24 の約数 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
56 の約数 : 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56

よって, 24 と 56 の最大公約数は 8

(4) 15 の倍数 : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, ...

21 の倍数 : 21, 42, 63, 84, 105, 126, ...

よって, 15 と 21 の最小公倍数は 105

4 (2) $4 \times 17 \times 25 \times 2 = 4 \times 25 \times 17 \times 2$

$$= 100 \times 34$$

$$= 3400$$

(3) $3.8 \times 1.9 - 1.8 \times 1.9 = (3.8 - 1.8) \times 1.9$

$$= 2 \times 1.9$$

$$= 3.8$$

(4) $25 \times 24 = 25 \times 4 \times 6$

$$= 100 \times 6$$

$$= 600$$

(5) $98 \times 34 = (100 - 2) \times 34$

$$= 100 \times 34 - 2 \times 34$$

$$= 3400 - 68$$

$$= 3332$$

- 5** (1) たされる数, たす数を一万の位までの概数にして計算する。

$$250000 + 430000 = 680000$$

- 6** (1) かけられる数, かける数を上から 1 けたの概数にしてから計算する。

$$200 \times 5000 = 1000000$$

7 (1) $0.875 = \frac{875}{1000} = \frac{7}{8}$

- (2) 分母を 12 と 28 の最小公倍数 84 にする。

(3) $\bigcirc \div \triangle = \frac{\bigcirc}{\triangle}$ より, $36 \div 78 = \frac{36}{78} = \frac{6}{13}$

8 (2) $\frac{4}{5} - \frac{2}{15} = \frac{12}{15} - \frac{2}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

(4) $\frac{14}{15} \div \frac{32}{35} = \frac{14}{15} \times \frac{35}{32} = \frac{49}{48} \left[1 \frac{1}{48} \right]$

(5) $\frac{1}{2} - \frac{4}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{2} - \frac{3}{10}$

$$= \frac{5}{10} - \frac{3}{10}$$

$$= \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

$$(6) \left(\frac{4}{5} - \frac{1}{6}\right) \times 90 = \frac{4}{5} \times 90 - \frac{1}{6} \times 90$$

$$= 72 - 15$$

$$= 57$$

9 1% → 0.01, 1割 → 0.1, 1分 → 0.01

1厘 → 0.001

10 (1) $72 \div 300 \times 100 = 24(\%)$

(割合)
= (比べる量)
÷ (もとにする量)

(2) 12.5% → 0.125 より,
 $240 \times 0.125 = 30(\text{人})$

(3) 7割 → 0.7 より,
 $750 \times 0.7 = 525(\text{L})$

(4) 1割8分 → 0.18 より,
 $550 \times 0.18 = 99(\text{g})$

(5) 2割 → 0.2 より,
 $3800 \times (1 - 0.2) = 3040(\text{円})$

(6) 35% → 0.35 より,
 $1200 \times (1 + 0.35) = 1620(\text{人})$

11 (1) 面積 1m^2 あたりにとれたじゃがいもの重さで
比べると,

たくみ… $300 \div 250 = 1.2(\text{kg})$

ひろと… $500 \div 400 = 1.25(\text{kg})$

(2) 面積 1km^2 あたりの人口で比べると,

A市… $540000 \div 200 = 2700(\text{人})$

B市… $400000 \div 160 = 2500(\text{人})$

12 (1) 1時間 = 60分 だから, $60 \times \frac{4}{5} = 48(\text{分})$

(2) $12 \div 3 = 4$

よって, 時速 4km

(3) $60 \times 40 = 2400(\text{m})$

(4) A地点からB地点までの道のりは,

$4.5 \times 4 = 18(\text{km})$

したがって, 帰りにかかる時間は,

$18 \div 6 = 3(\text{時間})$

道のり = 速さ × 時間
速さ = 道のり ÷ 時間
時間 = 道のり ÷ 速さ

13 (1) $15 : 9$ 両方の数を3でわって $5 : 3$

(2) $24 : 42$ 両方の数を6でわって $4 : 7$

(3) $0.45 : 0.3$ 両方の数に100をかけて $45 : 30$,

両方の数を15でわって $3 : 2$

(4) $\frac{3}{4} : \frac{2}{3}$ 両方の数に12をかけて $9 : 8$

14 (1) $65 \div 13 = 5$, $2 \times 5 = 10$

(2) $36 \div 9 = 4$, $32 \div 4 = 8$

(3) $21 \div 4.5 = \frac{14}{3}$, $14 \div \frac{14}{3} = 3$

15 (1) $450 \times \frac{8}{5} = 720(\text{円})$

(2) 兄の枚数は全体の $\frac{11}{11+7} = \frac{11}{18}(\text{倍})$


よって, $90 \times \frac{11}{18} = 55(\text{枚})$

16 一方が2倍, 3倍, …となると,
もう一方も2倍, 3倍, …となるなら比例,


もう一方が $\frac{1}{2}$ 倍, $\frac{1}{3}$ 倍, …となるなら反比例である。

p.8~p.11

- 1 (1) 85° (2) 60°
 (3) 70° (4) 100°
 (5) 116° (6) 135°
- 2 (1) 21cm^2 (2) 48cm^2 (3) 51cm^2
 (4) 48cm^2 (5) 108cm^2 (6) 40cm^2
- 3 (1) 7cm (2) 8cm (3) 10cm
- 4 (1) 18.84cm
 (2) ㉞ 4.56cm^2 ㉟ 48cm^2
- 5 (1) ㊦ (2) ㊧ (3) ㉠, ㊤, ㊨
 (4) ㊢, ㊣
- 6 (1)




(2)



- 7 (1) 辺 AE, BF, CG, DH (2) 辺 AB, DC, HG
 (3) 辺 BA, CD, BF, CG
- 8 (1) ア, イ, ウ (2) ア, イ, ウ
 (3) エ (4) エ, オ
- 9 (1) 112cm^3 (2) 54cm^3 (3) 72cm^3
 (4) 314cm^3 (5) 288cm^3
- 10 (1) 82.6 点 (2) 86 個
- 11 (1) 4 通り (2) 6 通り
- 12 (1) 4 試合 (2) 10 試合
- 13 (1) 24.5m ソフトボール投げの記録 (6年生)
 (2) 中央値...24.5m,
 最頻値...25m
 (3) 右の表

きより(m)	人数(人)
以上 未満	
15 ~ 20	4
20 ~ 25	6
25 ~ 30	7
30 ~ 35	3
合計	20


- (4) ソフトボール投げの記録 (6年生)



- (5) 25m 以上 30m 未満の階級
 (6) 65%

解 説

- 1 (1) $180^\circ - (55^\circ + 40^\circ) = 85^\circ$
 (2) $180^\circ - (33^\circ + 27^\circ) = 120^\circ$, $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$
 (3) 平行四辺形の向かいあう辺は平行なので,
 $110^\circ + \text{㉞} = 180^\circ$
 (4) $360^\circ - (95^\circ + 95^\circ + 70^\circ) = 100^\circ$
 (5) $180^\circ - 64^\circ = 116^\circ$
 (6) 正八角形の中心のまわりは
 360° で, 8 等分した 1 つの角
 度は 45° になる。
 よって, ㉞の角度は,
 $(180^\circ - 45^\circ) \div 2 \times 2 = 135^\circ$



- 2 (1) $6 \times 7 \div 2 = 21(\text{cm}^2)$

面積

三角形...底辺×高さ÷2
 平行四辺形...底辺×高さ
 台形...(上底+下底)×高さ÷2
 ひし形...対角線×対角線÷2

- (2) $8 \times 6 = 48(\text{cm}^2)$
 (3) $(7+10) \times 6 \div 2 = 51(\text{cm}^2)$
 (4) $12 \times 8 \div 2 = 48(\text{cm}^2)$
 (5) 例1 $10 \times 14 - 4 \times (14-6) = 108(\text{cm}^2)$
 例2 $4 \times 6 + 6 \times 14 = 108(\text{cm}^2)$
 (6) 例1 $7 \times (4+4) - 4 \times (7-3) \div 2 \times 2 = 40(\text{cm}^2)$
 例2 $\{(3+7) \times 4 \div 2\} \times 2 = 40(\text{cm}^2)$

- 3 (1) (縦の長さ)×12 = 84 より, $84 \div 12 = 7(\text{cm})$
 (2) (底辺の長さ)×9÷2 = 36 より, $36 \times 2 \div 9 = 8(\text{cm})$
 (3) (もう1つの対角線の長さ)×7÷2 = 35 より,
 $35 \times 2 \div 7 = 10(\text{cm})$

- 4 円の周の長さは, 直径×3.14 (半径×2×3.14)

円の面積は, 半径×半径×3.14

- (1) $3 \times 2 \times 3.14 = 18.84(\text{cm})$
 (2) ㉞ $2 \times 2 \times 3.14 - 4 \times 4 \div 2 = 4.56(\text{cm}^2)$

㉟ 半円の部分を移動すると,
 縦 6cm, 横 (4+4)cm の長方形となる。
 $6 \times 8 = 48(\text{cm}^2)$

- 5 (1) それぞれの辺の長さや、角の大きさが等しくなっているものを選ぶ。

三角形㉗は、底辺を3マスとすると、高さも3マスである。三角形㉘, ㉙, ㉚, ㉛はこの条件にあてはまらない。三角形㉜はこの条件にあてはまり、三角形㉗と辺の長さや角の大きさも等しい。

- (2) それぞれの辺の長さの比や、角の大きさが等しくなっているものを選ぶ。

三角形㉗は、底辺を6マスとすると、高さも6マスである。三角形㉚は、三角形㉗の2倍の拡大図になっている。

- (3) 1つの直線について対称な図形を見つける。
二等辺三角形は線対称な図形である。→三角形㉘, ㉛
円は線対称な図形である。→円㉑
- (4) ある点を中心にして180°まわすと、もとの形にぴったり重なる図形を見つける。
平行四辺形は点対称な図形である。→平行四辺形㉔
円は点対称な図形である。→円㉑

- 6 (1) 対応する点を結ぶ直線は対称の軸と垂直に交わり、その交わる点から対応する2つの点までの長さは等しくなっている。

- (2) 対応する点を結ぶ直線は対称の中心を通り、その中心から対応する2つの点までの長さは等しくなっている。

- 7 (1) 直方体で1つの面に垂直な辺は4本ある。
(2) 同じ向きにある4つの辺は平行である。
(3) 直方体の面はすべて長方形だから、各頂点に集まる3本の辺は、それぞれが垂直になる。

- 8 (1) 角柱は、平面だけで囲まれている。
円柱は、平面と曲面で囲まれている。
(2) 立方体は、正方形だけで囲まれた四角柱である。
直方体は、長方形だけ、または長方形と正方形で囲まれた四角柱である。

- 9 (1) $4 \times 7 \times 4 = 112(\text{cm}^3)$
(2) $4 \times 3 \div 2 \times 9 = 54(\text{cm}^3)$
(3) $(3+5) \times 3 \div 2 \times 6 = 72(\text{cm}^3)$
(4) $5 \times 5 \times 3.14 \times 4 = 314(\text{cm}^3)$
(5) $11 \times 8 \times 4 - 4 \times 4 \times 4 = 288(\text{cm}^3)$

角柱、円柱の体積 = 底面積 × 高さ


- 10 (1) $(82+75+91+86+79) \div 5 = 413 \div 5 = 82.6$
よって、平均点は82.6点
(2) $80 \times 4 - 78 \times 3 = 320 - 234 = 86$
よって、ゆうこさんはおはじきを86個持っている。

- 11 (2) (A, B), (A, C), (A, D), (B, C), (B, D), (C, D)の6通り。

- 12 (1) A-B, A-C, A-D, A-Eの4試合。
(2) (1)のほかに、B-C, B-D, B-E, C-D, C-E, D-Eの6試合がある。

表や図で表してもよい。

	A	B	C	D	E
A		○	○	○	○
B			○	○	○
C				○	○
D					○
E					



- 13 (1) $(16+18+19 \times 2+20+22+23 \times 2+24 \times 2+25 \times 3+26+27+28+29+30+33+34) \div 20 = 24.5(\text{m})$
- (2) データの数が偶数なので、中央にある2つの値の平均値を中央値とする。きよりの短い方から10番目と11番目の記録の平均は、
 $(24+25) \div 2 = 24.5(\text{m})$
最頻値は、記録の中でもっとも多く出てくる値で25m。
- (6) 20m以上25m未満が6人、25m以上30m未満が7人だから、20m以上30m未満の人の割合は、
 $(6+7) \div 20 = 0.65, 0.65 = 65\%$


1 正の数・負の数

p.12~p.13

① (1) $+5$ (2) -0.7 (3) $+\frac{2}{7}$

② (1) $-14, 5, 0, +47$
 (2) $-14, -\frac{8}{9}, -7.1$
 (3) $5, +47$

③ (1) A... -5 , B... -2.5 , C... $+3.5$ [3.5]



④ 6°C 低い... -6°C
 $+9^{\circ}\text{C}$...(ある温度より) 9°C 高い

⑤ 77 点

⑥ (1) -2 個多い (2) -200 円余る
 (3) 北へ -7km

⑦ (1) 絶対値...6, 符号を変えた数... $+6$
 (2) 絶対値...2.5, 符号を変えた数... -2.5
 (3) 絶対値... $\frac{3}{2}$, 符号を変えた数... $+\frac{3}{2}$

⑧ (1) $>$ (2) $<$ (3) $<$

⑨ (1) $-9 < 0 < 9$
 (2) $-4.4 < -0.8 < 8.4$

⑩ (1) -5 (2) -8 (3) -7

(3) 「南へ 7km 」 = 「北へ -7km 」

⑦ (1) -6 の絶対値は 6。絶対値は、正の数、負の数から、符号「+」, 「-」をとり去ったものと考えてよい。

⑧ (3) 負の符号をとって、絶対値だけで比べると、

$$\frac{3}{2} > \frac{2}{3}$$

負の符号がつくと、大小関係

係が逆になるので、 $-\frac{3}{2} < -\frac{2}{3}$

負の数どうしの大小関係は、絶対値が大きい数ほど小さい数になる。
 (0 から遠いほど、小さい数になる。)

⑨ (2) $-4.4 < -0.8$ であることに注意する。

⑩ (2) 2 より 2 小さい数は 0, 0 より 8 小さい数は、 -8 である。

(3) 「 -1 より -6 大きい数」 = 「 -1 より 6 小さい数」なので、 -1 より左に 6 進んだ点で -7 になる。


p.14~p.15

▶ 確認問題

① (1) $+4$ (2) -3 (3) $+0.2$
 (4) -0.5 (5) $+\frac{2}{3}$ (6) $-\frac{5}{9}$

② (1) $-12, 6, +27, 0, -8$
 (2) $-12, -\frac{5}{7}, -4.8, -8$
 (3) $-12, -8$

③ (1) A... -4 , B... -0.5 , C... $+2.5$ [2.5]
 (2)



④ (1) $+3\text{m}$
 (2) 800 円の支出... -800 円
 -1000 円の収入...1000 円の支出
 (3) 200m 西... -200m
 $+70\text{m}$...(ある地点から)70m 東の地点

⑤ (1) $+6$ 点 (2) 65 点

⑥ (1) -3 個多い (2) -150 円余る
 (3) -8cm 短い (4) -50g 減る
 (5) 東へ -3km (6) -20 分前

⑦ (1) 絶対値...9, 符号を変えた数... $+9$
 (2) 絶対値...3.6, 符号を変えた数... -3.6
 (3) 絶対値... $\frac{3}{8}$, 符号を変えた数... $+\frac{3}{8}$

⑧ (1) $>$ (2) $>$ (3) $>$
 (4) $<$ (5) $<$ (6) $>$

⑨ (1) $-6 < 0 < 6$ (2) $-2.3 < -1.3 < 3.2$

⑩ (1) -2 (2) -4 (3) 6

解説

① 分数でも小数でも、0 より小さい数には負の符号「-」を、0 より大きい数には必要があれば正の符号「+」をつける。

② (1) 整数は、② にあげた数の中では小数と分数以外の数のことで、0 も整数である。

したがって、 $-14, 5, 0, +47$

(2) 負の数は、負の符号がついた数すべて。

したがって、 $-14, -\frac{8}{9}, -7.1$

(3) 自然数に 0 はふくまない。したがって、 $5, +47$

③ (2) $-\frac{1}{2} = -0.5$ なので、 $-\frac{1}{2}$ は 0 と -1 のまん中である。

④ 4°C 高いことを $+4^{\circ}\text{C}$ で表すから、ある温度より 6°C 低いことは -6°C と表される。

⑤ 違いが「-」だから、目標より低いので、 $80 - 3 = 77$ (点) になる。

⑥ (1) 「2 個少ない」 = 「 -2 個多い」

(2) 「200 円たりない」 = 「 -200 円余る」

解説

1 小数でも分数でも、0より小さい数には負の符号「-」をつけて表す。

2 (1) 整数は、自然数と0と負の整数をふくむから、
-12, 6, +27, 0, -8

(2) 負の数は、負の符号がついた数で、-12, $-\frac{5}{7}$,
-4.8, -8

(3) 負の整数は、負の符号がついた整数で、-12,
-8

3 (1) Bは、0と-1のまん中だから、-0.5

(2) $-\frac{5}{2} = -2.5$ なので、-2と-3のまん中である。

4 (1) ある地点より「6m低い」ことを-6mと表す
ので、「3m高い」ことは+3mと表される。

(2) 「600円の収入」を+600円で表すので、「800円
の支出」は-800円と表される。
「-1000円の収入」は1000円の支出を表す。

5 (2) 目標点の70点との違いが「-5点」であるこ
とは、70点より5点低いということを表している。
 $70 - 5 = 65$ (点)

6 (2) 「150円たりない」=「-150円余る」

(4) 「50g増える」=「-50g減る」

(6) 「20分後」=「-20分前」

7 絶対値は、(1)は9, (2)は3.6, (3)は $\frac{3}{8}$ である。


8 (2) 絶対値で比べると、 $4 < 7$ であるが、負の数ど
うしの大小関係は、絶対値が大きいほど小さい数に
なるので、 $-4 > -7$

(6) $-\frac{3}{4} = -\frac{9}{12}$, $-\frac{4}{3} = -\frac{16}{12}$ より、 $-\frac{3}{4} > -\frac{4}{3}$

9 (2) -2.3は-1.3より小さいから、
 $-2.3 < -1.3 < 3.2$

10 (1) -7より、右へ5進んだ点は、-2である。

(2) 「3より-7大きい数」=「3より7小さい数」だ
から、3より左へ7進んだ点の-4である。



2 正の数・負の数の加法、減法

p.16~p.19

1 (1) +4 (2) -7 (3) -13
(4) 0 (5) -1 (6) -3
(7) +1 (8) +8 (9) -7
(10) -1.5 (11) -2.3 (12) +1.3
(13) $-\frac{3}{4}$ (14) $+\frac{1}{6}$ (15) $-\frac{13}{30}$

2 (1) -5 (2) -3 (3) -7
(4) -12 (5) +6 (6) +17
(7) +4 (8) +12 (9) 0
(10) -4.9 (11) -6.5 (12) -1.7
(13) +5.5 (14) +1.7 (15) $-\frac{1}{4}$
(16) -1 (17) $+\frac{8}{15}$ (18) $+\frac{1}{12}$

3 (1) 5 (2) 11 (3) 1
(4) 2 (5) 6 (6) -12

4 (1) 7 (2) -9 (3) 20
(4) -15 (5) 5 (6) 3

5 (1) -3 (2) 11 (3) -17
(4) -2 (5) $-\frac{5}{12}$ (6) $-\frac{3}{14}$

6 (1) 正の項...2, 6 負の項...-7, -3
(2) 正の項...13, 2 負の項...-9, -14

7 (1) 3 (2) 4 (3) 3
(4) 1 (5) -6 (6) 7

8 (1) -4 (2) 10 (3) 5
(4) -7 (5) -1 (6) 0

解説

1 (4) 絶対値が等しい異符号の2数の和は、0になる。

(5) $(-5) + (+4) = -(5-4) = -1$

(12) $(-2.6) + (+3.9) = +(3.9-2.6) = +1.3$

(14) $(-\frac{1}{6}) + (+\frac{1}{3}) = (-\frac{1}{6}) + (+\frac{2}{6})$
 $= +(\frac{2}{6} - \frac{1}{6})$

$= +\frac{1}{6}$

(15) $(+\frac{2}{5}) + (-\frac{5}{6}) = (+\frac{12}{30}) + (-\frac{25}{30})$

$= -(\frac{25}{30} - \frac{12}{30})$

$= -\frac{13}{30}$

$$\boxed{2} \quad (2) \quad (+4)-(+7)=(+4)+(-7)$$

$$=-(7-4)$$

$$=-3$$

$$(7) \quad (-6)-(-10)=(-6)+(+10)$$

$$=+(10-6)$$

$$=+4$$

$$(14) \quad 0-(-1.7)=0+(+1.7)=+1.7$$

$$(15) \quad \left(+\frac{5}{8}\right)-\left(+\frac{7}{8}\right)=\left(+\frac{5}{8}\right)+\left(-\frac{7}{8}\right)$$

$$=-\left(\frac{7}{8}-\frac{5}{8}\right)$$

$$=-\frac{2}{8}$$

$$=-\frac{1}{4}$$

$$(18) \quad \left(-\frac{2}{3}\right)-\left(-\frac{3}{4}\right)=\left(-\frac{2}{3}\right)+\left(+\frac{3}{4}\right)$$

$$=\left(-\frac{8}{12}\right)+\left(+\frac{9}{12}\right)$$

$$=+\left(\frac{9}{12}-\frac{8}{12}\right)$$

$$=+\frac{1}{12}$$

$$\boxed{3} \quad (3) \quad (-5)+(+6)=-5+6=1$$

$$(5) \quad (+11)+(-5)=11-5=6$$

$$(6) \quad (-4)+(-8)=-4-8=-12$$

$$\boxed{4} \quad (2) \quad (-4)-(+5)=-4-5=-9$$

$$(3) \quad (+9)-(-11)=9+11=20$$

$$(5) \quad (-7)-(-12)=-7+12=5$$

$$\boxed{5} \quad (1) \quad 5-8=-3$$

$$(2) \quad -8+19=11$$

$$(4) \quad -0.6-1.4=-2$$

$$(5) \quad \frac{1}{3}-\frac{3}{4}=\frac{4}{12}-\frac{9}{12}=-\frac{5}{12}$$

$$(6) \quad -\frac{1}{2}+\frac{2}{7}=-\frac{7}{14}+\frac{4}{14}=-\frac{3}{14}$$

$\boxed{6} \quad (1) \quad -7+2-3+6$ は、 $(-7)+2+(-3)+6$ と加法だけの式に表すことができる。この式での -7 , 2 , -3 , 6 を式の項という。また、 2 , 6 を正の項、 -7 , -3 を負の項という。

$$\boxed{7} \quad (1) \quad -2+6-1=6-2-1$$

$$=6-3$$

$$=3$$

$$(4) \quad -3-(-9)-5=-3+9-5$$

$$=9-3-5$$

$$=9-8$$

$$=1$$

$$(5) \quad 13-24-(-5)=13-24+5$$

$$=13+5-24$$

$$=18-24$$

加法と減法の混じった式では、正の項の和、負の項の和をそれぞれさきに求めてから計算することもできる。

$$=-6$$

$$\boxed{8} \quad (2) \quad -1+7-4+8=7+8-1-4$$

$$=15-5$$

$$=10$$

$$(5) \quad -13+5-12-(-19)=-13+5-12+19$$

$$=5+19-13-12$$

$$=24-25$$

$$=-1$$

p.20~p.21

確認問題

$$\boxed{1} \quad (1) \quad +5 \quad (2) \quad -7 \quad (3) \quad +2$$

$$(4) \quad 0 \quad (5) \quad -6 \quad (6) \quad -3$$

$$(7) \quad +0.9 \quad (8) \quad +0.6 \quad (9) \quad -4$$

$$(10) \quad -\frac{5}{6} \quad (11) \quad -\frac{1}{4} \quad (12) \quad +\frac{5}{18}$$

$$\boxed{2} \quad (1) \quad -7 \quad (2) \quad +3 \quad (3) \quad +4$$

$$(4) \quad -2.5 \quad (5) \quad -3.4 \quad (6) \quad +0.9$$

$$(7) \quad +\frac{2}{3} \quad (8) \quad +\frac{17}{20} \quad (9) \quad -\frac{7}{24}$$

$$\boxed{3} \quad (1) \quad -5 \quad (2) \quad 3 \quad (3) \quad -4$$

$$(4) \quad -14 \quad (5) \quad 8 \quad (6) \quad 7$$

$$\boxed{4} \quad (1) \quad \text{式の項}\cdots-9, 12, -6, 8$$

$$\text{正の項}\cdots 12, 8 \quad \text{負の項}\cdots -9, -6$$

$$(2) \quad \text{式の項}\cdots 1.2, -0.5, -0.9, 0.7$$

$$\text{正の項}\cdots 1.2, 0.7 \quad \text{負の項}\cdots -0.5, -0.9$$

$$\boxed{5} \quad (1) \quad 4 \quad (2) \quad -8 \quad (3) \quad -23$$

$$(4) \quad -10$$

$$\boxed{6} \quad (1) \quad -3 \quad (2) \quad 5 \quad (3) \quad -7$$

$$(4) \quad -2 \quad (5) \quad -2 \quad (6) \quad 0$$

解説

$$\boxed{1} \quad (3) \quad (-4)+(+6)=+(6-4)=+2$$

$$(6) \quad 0+(-3)=-3$$

$$(9) \quad (-2.5)+(-1.5)=-(2.5+1.5)=-4$$

$$(12) \quad \left(+\frac{7}{9}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)=\left(+\frac{14}{18}\right)+\left(-\frac{9}{18}\right)$$

$$=+\left(\frac{14}{18}-\frac{9}{18}\right)=+\frac{5}{18}$$

$$\boxed{2} \quad (1) \quad (-3)-(+4)=(-3)+(-4)$$

$$=-(3+4)$$

$$=-7$$

$$(3) \quad (-5)-(-9)=(-5)+(+9)$$

$$=+(9-5)$$

$$=+4$$

$$\begin{aligned}
 (9) \quad & \left(-\frac{5}{8}\right) - \left(-\frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{15}{24}\right) + \left(+\frac{8}{24}\right) \\
 & = -\left(\frac{15}{24} - \frac{8}{24}\right) \\
 & = -\frac{7}{24}
 \end{aligned}$$

3 (1) $4 + (-9) = 4 - 9 = -5$

(3) $-7 - (-3) = -7 + 3 = -4$

4 (2) 加法だけの式で表すと,
 $1.2 + (-0.5) + (-0.9) + 0.7$

5 (2) $18 - 35 + 9 = 18 + 9 - 35$
 $= 27 - 35$
 $= -8$

(4) $-36 + 19 - (-7) = -36 + 19 + 7$
 $= -36 + 26$
 $= -10$

6 (1) $-6 - 5 - (-2) + 6 = -6 - 5 + 2 + 6$
 $= -11 + 8$
 $= -3$

(3) $(-7) - 12 - (-15) - 3 = -7 - 12 + 15 - 3$
 $= -7 - 12 - 3 + 15$
 $= -22 + 15$
 $= -7$

別解 $(-7) - 12 - (-15) - 3 = -7 - 12 + 15 - 3$
 $= -7 - 12 - 3 + 15$
 $= -7 - \underline{15} + 15$
 $= -7$

(6) $16 - 17 - 18 - (-19) = 16 - 17 - 18 + 19$
 $= 16 + 19 - 17 - 18$
 $= 35 - 35$
 $= 0$

別解 前の2数と後ろの2数をさきに計算して求めることもできる。

$$\begin{aligned}
 16 - 17 - 18 - (-19) &= (16 - 17) + (-18 + 19) \\
 &= -1 + 1 = 0
 \end{aligned}$$

3 正の数・負の数の乗法, 除法

p.22~p.27

1 (1) 35 (2) 24 (3) 72
 (4) -16 (5) -21 (6) -18

(7) -60 (8) -32 (9) -63

(10) 6 (11) 98 (12) 80

(13) 0 (14) 0 (15) 100

2 (1) 2 (2) -7 (3) -9

(4) 16 (5) $-\frac{1}{4}$ (6) $-\frac{2}{3}$

(7) $-\frac{3}{5}$ (8) $-\frac{2}{9}$ (9) $\frac{9}{2}$

(10) -0.8 (11) -0.7 (12) 8

(13) -5 (14) 0

3 (1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{5}{7}$ (3) $-\frac{1}{4}$

(4) $\frac{1}{2}$ (5) -3 (6) 10

4 (1) $-\frac{2}{15}$ (2) $\frac{1}{8}$ (3) $-\frac{28}{33}$

(4) $-\frac{1}{35}$ (5) $-\frac{13}{17}$ (6) $\frac{6}{5}$

5 (1) 700 (2) -630 (3) -7000

6 (1) $\triangle$ (2) $\bigcirc$ (3) $\bigcirc$

(4) $\triangle$ (5) $\triangle$ (6) $\bigcirc$

7 (1) 80 (2) -36 (3) $-\frac{6}{5}$

(4) 9 (5) -3 (6) -1

(7) $\frac{1}{2}$ (8) -1

8 (1) 3^5 (2) $(-5)^4$ (3) $7^2 \times (-2)^3$

9 (1) 216 (2) -64 (3) 64

(4) -0.01

10 (1) -24 (2) -675 (3) -392

(4) 4 (5) $-\frac{9}{16}$ (6) $-\frac{5}{4}$

11 (1) 10 (2) 4 (3) -4

(4) 40 (5) -12 (6) -8

12 (1) -3 (2) 2 (3) 12

13 (1) -14 (2) -5 (3) -11

14 (1) 3400 (2) -360 (3) -1300

解説

1 (4) $(-4) \times 4 = -(4 \times 4) = -16$

(7) $12 \times (-5) = -(12 \times 5) = -60$

(10) $(-3) \times (-2) = +(3 \times 2) = 6$

(13) $0 \times (-4) = 0$ ← 0にどんな数をかけても0

(14) $(-13) \times 0 = 0$ ← どんな数に0をかけても0

2 (2) $(-21) \div 3 = -(21 \div 3) = -7$

(4) $(-48) \div (-3) = +(48 \div 3) = 16$

(6) $(-8) \div 12 = -(8 \div 12) = -\frac{2}{3}$

(8) $(-14) \div 63 = -(14 \div 63) = -\frac{2}{9}$

(12) $(-4.8) \div (-0.6) = +(4.8 \div 0.6) = 8$

(14) $0 \div (-15) = 0$ ← 0をどんな数でわっても0

3 (1) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = 1$ だから、 $\frac{2}{3}$ の逆数は $\frac{3}{2}$

(3) $(-4) \times \left(-\frac{1}{4}\right) = 1$ だから、 -4 の逆数は $-\frac{1}{4}$

(6) $0.1 = \frac{1}{10}$

$\frac{1}{10} \times 10 = 1$ だから、 0.1 の逆数は10

4 (1) $\frac{3}{10} \times \left(-\frac{4}{9}\right) = -\left(\frac{3}{10} \times \frac{4}{9}\right) = -\frac{2}{15}$

(4) $\left(-\frac{4}{7}\right) \div 20 = -\left(\frac{4}{7} \times \frac{1}{20}\right) = -\frac{1}{35}$

わる数の逆数をかける。

(6) $\left(-\frac{4}{15}\right) \div \left(-\frac{2}{9}\right) = +\left(\frac{4}{15} \times \frac{9}{2}\right) = \frac{6}{5}$

5 (1) $(-25) \times 7 \times (-4) = (-25) \times (-4) \times 7$
 $= \{(-25) \times (-4)\} \times 7$
 $= \{+(25 \times 4)\} \times 7$
 $= 100 \times 7 = 700$

乗法の交換法則、
結合法則を使って
くふうして計算する。

(2) $2 \times (-9) \times 35 = (-9) \times 2 \times 35$
 $= (-9) \times (2 \times 35)$
 $= (-9) \times 70$
 $= -630$

(3) $(-7) \times (-8) \times (-125) = (-7) \times \{(-8) \times (-125)\}$
 $= (-7) \times \{+(8 \times 125)\}$
 $= (-7) \times 1000$
 $= -7000$

6 (4) $3 \times (-4) \times (-5) \times (-6)$ は負の符号の個数が3個で奇数個なので、計算結果は負の数。

(6) $-3 \times (-4) \times (-5) \times (-6)$ は負の符号の個数が4個で偶数個なので、計算結果は正の数。

7 (1) $(-8) \times 5 \times (-2) = +(8 \times 5 \times 2) = 80$

(3) $\left(-\frac{1}{6}\right) \times \left(-\frac{4}{5}\right) \times (-9) = -\left(\frac{1}{6} \times \frac{4}{5} \times 9\right)$
 $= -\frac{6}{5}$

(4) $(-3) \times 18 \div (-6) = (-3) \times 18 \times \left(-\frac{1}{6}\right)$
 $= +\left(3 \times 18 \times \frac{1}{6}\right)$
 $= 9$

(5) $(-48) \div (-8) \div (-2) = (-48) \times \left(-\frac{1}{8}\right) \times \left(-\frac{1}{2}\right)$
 $= -\left(48 \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{2}\right)$
 $= -3$

(7) $\frac{1}{5} \div \left(-\frac{5}{13}\right) \times \left(-\frac{25}{26}\right) = \frac{1}{5} \times \left(-\frac{13}{5}\right) \times \left(-\frac{25}{26}\right)$
 $= +\left(\frac{1}{5} \times \frac{13}{5} \times \frac{25}{26}\right)$
 $= \frac{1}{2}$

8 (3) 7を2個、 (-2) を3個かけあわせるので、
 $7^2 \times (-2)^3$

9 (1) $6^3 = 6 \times 6 \times 6 = 216$

(2) $-8^2 = -(8 \times 8) = -64$

(3) $(-8)^2 = (-8) \times (-8) = 64$

(4) $-0.1^2 = -(0.1 \times 0.1) = -0.01$

10 (1) $(-2)^2 \times (-6) = (-2) \times (-2) \times (-6) = -24$

(2) $-3^3 = -(3 \times 3 \times 3) = -27$

$(-5)^2 = (-5) \times (-5) = 25$

よって、 $-3^3 \times (-5)^2 = -27 \times 25 = -675$

(3) $(-7)^2 \times (-2^3) = 49 \times (-8) = -392$

(5) $(-3^2) \div (-2)^4 = (-9) \div 16 = -\frac{9}{16}$

11 (1) $4 - (-3) \times 2 = 4 - (-6)$
 $= 4 + 6 = 10$

(4) $30 - 20 \div (-2) = 30 - (-10)$
 $= 30 + 10 = 40$

(5) $2 \times (-4) - 8 \div 2 = -8 - 4$
 $= -12$

(6) $40 \div 2^2 - 2 \times (-3)^2 = 40 \div 4 - 2 \times 9$
 $= 10 - 18$
 $= -8$

指数の計算
をさきにし、
乗法・除法、
減法の順に
計算する。

12 (1) $(9-12) \div 3 - 2 = (-3) \div 3 - 2$
 $= -1 - 2 = -3$

(2) $\{-2 - 2 \times (-3)\} \div 2 = (-2 + 6) \div 2$
 $= 4 \div 2 = 2$

(3) $4 - \{(-2^2) - 2^3 + 4\} = 4 - (-4 - 8 + 4)$
 $= 4 - (-12 + 4)$
 $= 4 + 8 = 12$

13 (1) $\left(\frac{1}{2} + 3\right) \times (-4) = \frac{1}{2} \times (-4) + 3 \times (-4)$
 $= -2 - 12$
 $= -14$

(2) $(-12) \times \left(-\frac{1}{3} + \frac{3}{4}\right) = (-12) \times \left(-\frac{1}{3}\right) + (-12) \times \frac{3}{4}$
 $= 4 - 9$
 $= -5$

(3) $\left(\frac{4}{3} + \frac{8}{5}\right) \times \left(-\frac{15}{4}\right) = \frac{4}{3} \times \left(-\frac{15}{4}\right) + \frac{8}{5} \times \left(-\frac{15}{4}\right)$

$$= (-5) + (-6) = -11$$

$$\boxed{14} \quad (1) \quad \underline{34} \times \underline{82} + \underline{34} \times \underline{18} = 34 \times (82 + 18)$$

$$= 34 \times 100$$

$$= 3400$$

$$(3) \quad \underline{26} \times (-17) + (-33) \times \underline{26} = 26 \times \{(-17) + (-33)\}$$

$$= 26 \times (-50)$$

$$= -1300$$

p.28~p.29

確認問題

$$\boxed{1} \quad (1) \quad -36$$

$$(2) \quad -45$$

$$(3) \quad 96$$

$$(4) \quad -70$$

$$(5) \quad 18$$

$$(6) \quad -48$$

$$\boxed{2} \quad (1) \quad -6$$

$$(2) \quad \frac{8}{9}$$

$$(3) \quad -5$$

$$\boxed{3} \quad (1) \quad \frac{10}{9}$$

$$(2) \quad -\frac{6}{5}$$

$$(3) \quad -\frac{1}{7}$$

$$(4) \quad -\frac{10}{19}$$

$$\boxed{4} \quad (1) \quad -\frac{1}{6}$$

$$(2) \quad -\frac{8}{15}$$

$$(3) \quad \frac{2}{3}$$

$$\boxed{5} \quad (1) \quad 270$$

$$(2) \quad -4000$$

$$(3) \quad 180$$

$$\boxed{6} \quad (1) \quad 260$$

$$(2) \quad -2$$

$$(3) \quad \frac{8}{7}$$

$$\boxed{7} \quad (1) \quad 4^5$$

$$(2) \quad (-9)^4$$

$$(3) \quad 2^2 \times (-3)^3$$

$$\boxed{8} \quad (1) \quad 125$$

$$(2) \quad -36$$

$$(3) \quad 49$$

$$(4) \quad -0.001$$

$$\boxed{9} \quad (1) \quad 32$$

$$(2) \quad -\frac{25}{49}$$

$$(3) \quad \frac{27}{16}$$

$$\boxed{10} \quad (1) \quad -12$$

$$(2) \quad 21$$

$$(3) \quad 14$$

$$\boxed{11} \quad (1) \quad -8$$

$$(2) \quad 2$$

$$(3) \quad -4$$

$$\boxed{12} \quad (1) \quad -22$$

$$(2) \quad 4$$

$$(3) \quad 11$$

$$\boxed{13} \quad (1) \quad 130$$

$$(2) \quad -180$$

$$(3) \quad 450$$

解説

$$\boxed{1} \quad (1) \quad (-6) \times 6 = -(6 \times 6) = -36$$

$$(3) \quad (-8) \times (-12) = +(8 \times 12) = 96$$

$$(4) \quad 5 \times (-14) = -(5 \times 14) = -70$$

$$(5) \quad (-2) \times (-9) = +(2 \times 9) = 18$$

$$(6) \quad (-3) \times 16 = -(3 \times 16) = -48$$

$$\boxed{2} \quad (1) \quad (-42) \div 7 = -(42 \div 7) = -6$$

$$(2) \quad (-56) \div (-63) = +(56 \div 63) = \frac{8}{9}$$

$$(3) \quad 7.5 \div (-1.5) = -(7.5 \div 1.5) = -5$$

$$\boxed{3} \quad (2) \quad \left(-\frac{5}{6}\right) \times \left(-\frac{6}{5}\right) = 1 \text{ だから, } -\frac{5}{6} \text{ の逆数は } -\frac{6}{5}$$

$$(4) \quad -1.9 = -\frac{19}{10}, \quad \left(-\frac{19}{10}\right) \times \left(-\frac{10}{19}\right) = 1 \text{ だから,}$$

$$-\frac{19}{10} \text{ の逆数は } -\frac{10}{19}$$

$$\boxed{4} \quad (2) \quad \left(-\frac{4}{9}\right) \div \frac{5}{6} = \left(-\frac{4}{9}\right) \times \frac{6}{5} = -\left(\frac{4}{9} \times \frac{6}{5}\right) = -\frac{8}{15}$$

$$(3) \quad \left(-\frac{3}{5}\right) \div \left(-\frac{9}{10}\right) = \left(-\frac{3}{5}\right) \times \left(-\frac{10}{9}\right) \\ = +\left(\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}\right) = \frac{2}{3}$$

$$\boxed{5} \quad (1) \quad (-15) \times 9 \times (-2) = (-15) \times (-2) \times 9$$

$$= \{+(15 \times 2)\} \times 9$$

$$= 30 \times 9 = 270$$

$$(2) \quad 125 \times (-4) \times 8 = 125 \times 8 \times (-4)$$

$$= 1000 \times (-4)$$

$$= -(1000 \times 4) = -4000$$

$$\boxed{6} \quad (1) \quad (-5) \times 13 \times (-4) = +(5 \times 13 \times 4) = 260$$

$$(2) \quad (-54) \div (-9) \div (-3) = (-54) \times \left(-\frac{1}{9}\right) \times \left(-\frac{1}{3}\right) \\ = -\left(54 \times \frac{1}{9} \times \frac{1}{3}\right) \\ = -2$$

$$\boxed{7} \quad (3) \quad \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{(-3)} \times \underline{(-3)} \times \underline{(-3)} = 2^2 \times (-3)^3$$

$$\boxed{8} \quad (2) \quad -6^2 = -(6 \times 6) = -36$$

$$(4) \quad (-0.1)^3 = (-0.1) \times (-0.1) \times (-0.1)$$

$$= -(0.1 \times 0.1 \times 0.1) = -0.001$$

$$\boxed{9} \quad (2) \quad (-5^2) \div (-7)^2 = (-25) \div 49 = -\frac{25}{49}$$

$$(3) \quad (-3)^3 \div (-2^4) = (-27) \div (-16) = \frac{27}{16}$$

$$\boxed{10} \quad (2) \quad 9 + \underline{(-6)} \times \underline{(-2)} = 9 + 12 = 21$$

$$(3) \quad 3 \times 4 - \underline{(-18)} \div \underline{3^2} = 3 \times 4 - (-18) \div 9 \\ = 12 + 2 = 14$$

$$\boxed{11} \quad (2) \quad 6 - \{8 \times \underline{(-2-5)}\} \div (-14)$$

$$= 6 - \{8 \times \underline{(-7)}\} \div (-14)$$

$$= 6 - (-56) \div (-14)$$

$$= 6 - 4 = 2$$

$$(3) \quad (-2)^2 - (3^2 - 1)$$

$$= 4 - (9 - 1)$$

$$= 4 - 8$$

$$= -4$$

$$\boxed{12} \quad (1) \quad \underline{(-10)} \times \left(3 - \frac{4}{5}\right) = \underline{(-10)} \times 3 - \underline{(-10)} \times \frac{4}{5} \\ = -30 - (-8)$$

$$= -30 + 8 = -22$$

$$(3) \quad \left(\frac{3}{2} + \frac{6}{7}\right) \times \frac{14}{3} = \frac{3}{2} \times \frac{14}{3} + \frac{6}{7} \times \frac{14}{3} \\ = 7 + 4 = 11$$

$$\boxed{13} \quad (1) \quad \underline{13} \times 55 - \underline{13} \times 45 = \underline{13} \times (55 - 45)$$

$$= \underline{13} \times 10 = 130$$

$$(2) \quad \underline{7.3} \times \underline{(-18)} + \underline{2.7} \times \underline{(-18)} = (\underline{7.3} + \underline{2.7}) \times \underline{(-18)}$$

$$= 10 \times (-18)$$

$$= -180$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & (-9) \times (-75) - (-25) \times (-9) \\
 &= \{(-75) - (-25)\} \times (-9) \\
 &= (-50) \times (-9) = 450
 \end{aligned}$$

4 数の世界のひろがり / 正の数・負の数の利用

p.30~p.33

- ① (1) A…0.8, $-\frac{2}{9}$, $\frac{6}{7}$ B…0, -9, -6
C…19, 25, 33

(2) イ, エ

- ② イ, エ

- ③ ア, イ, ウ, オ

- ④ 17, 23, 29, 31

- ⑤ (1) 2×3^2 (2) 2^5 (3) $3^2 \times 5$

(4) $2^4 \times 5$ (5) $2 \times 3 \times 5^2$

(6) $2^3 \times 3 \times 7$ (7) $2^2 \times 3^2 \times 7$

(8) $2^3 \times 5 \times 7$ (9) $2^2 \times 3^4$

- ⑥ 6の倍数…イ, エ, オ 15の倍数…ア, エ

- ⑦ 2をかける

- ⑧ (1) 40回

(2)

	月	火	水	木	金
水曜日との差(回)	-5	-4	0	+2	+7

(3)

	月	火	水	木	金
仮平均との差(回)	-7	-3	-1	0	+1

48回

- ⑨ (1) 90点 (2) 11点 (3) 83点

- ⑩ 生産数の平均…1504個 総生産数…10528個

解説

- ① (1) Cの自然数から決めていくとわかりやすい。

C…正の整数なので, 19, 25, 33

B…0と負の整数がBにあてはまるので, 0, -9, -6

A…CとBで選ばなかった, 残りの数を選ぶ。

$$0.8, -\frac{2}{9}, \frac{6}{7}$$

- (2) ア $3+5=8$ のように, 自然数どうしの和はかならず自然数のCにあてはまるので, 正しくない。

イ $-3-(-5)=+2$ はCに, $-5-(-3)=-2$ はBにあてはまり, Aになることはないので, 正しい。

ウ $\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = 1$ はCにあてはまるので, 正しくない。

エ $3 \div 2 = 1.5$ はAに, $4 \div 2 = 2$ はCにあてはまる。したがって, Aにあてはまる場合もあるが, Cにあてはまることもあるので正しい。

- ② イは, $2-3=-1$ で, 自然数にならないこともある。

エは, $2 \div 3 = \frac{2}{3}$ で分数なので, 自然数にならない。

- ③ 実際に数字をあてはめて考える。

エ 商が整数になる場合とならない場合があるので, つねに成り立つとはいえない。

例 $(-4) \div 2 = -2$ $(-2) \div 4 = -\frac{1}{2}$

4 12, 21, 25, 33 は、それぞれ 1 とその数のほかに
も約数があるので、素数ではない。

5 (1) $\begin{array}{r} 2 \overline{)18} \\ 3 \overline{)9} \\ 3 \end{array}$ (2) $\begin{array}{r} 2 \overline{)32} \\ 2 \overline{)16} \\ 2 \overline{)8} \\ 2 \overline{)4} \\ 2 \end{array}$ (3) $\begin{array}{r} 3 \overline{)45} \\ 3 \overline{)15} \\ 5 \end{array}$
 $18 = 2 \times 3^2$ $45 = 3^2 \times 5$
 $32 = 2^5$

(5) $\begin{array}{r} 2 \overline{)150} \\ 3 \overline{)75} \\ 5 \overline{)25} \\ 5 \end{array}$ (6) $\begin{array}{r} 2 \overline{)168} \\ 2 \overline{)84} \\ 2 \overline{)42} \\ 3 \overline{)21} \\ 7 \end{array}$
 $150 = 2 \times 3 \times 5^2$ $168 = 2^3 \times 3 \times 7$

(7) $\begin{array}{r} 2 \overline{)252} \\ 2 \overline{)126} \\ 3 \overline{)63} \\ 3 \overline{)21} \\ 7 \end{array}$ (9) $\begin{array}{r} 2 \overline{)324} \\ 2 \overline{)162} \\ 3 \overline{)81} \\ 3 \overline{)27} \\ 3 \overline{)9} \\ 3 \end{array}$
 $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$ $324 = 2^2 \times 3^4$

6 素数の積の中に、 $6 = 2 \times 3$ 、 $15 = 3 \times 5$ の積をふく
むものを見つける。エ $2 \times 3 \times 5$ は、 2×3 と 3×5 を
ふくむので、6 の倍数であり、15 の倍数でもある。

7 105 を素因数分解すると、 $3 \times 5 \times 7$ であるから、105
に 2 をかけると、 $105 \times 2 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$ で、6 の倍数に
なる。

8 (1) $(35 + 36 + 40 + 42 + 47) \div 5 = 40$ (回)
(2) 水曜日と跳んだ回数との差を求める。
月 $\cdots 35 - 40 = -5$ 、火 $\cdots 36 - 40 = -4$ 、
木 $\cdots 42 - 40 = +2$ 、金 $\cdots 47 - 40 = +7$
(3) 仮平均と跳んだ回数との差の平均を求めて、跳
んだ回数の平均を求めることができる。
 $50 + \{(-7) + (-3) + (-1) + 0 + 1\} \div 5$
 $= 50 + (-10) \div 5 = 50 - 2 = 48$ (回)

9 (1) A の得点は、D の得点より 8 点高いから、
 $82 + 8 = 90$ (点)

(2) $+6 - (-5) = 11$ 点

$\uparrow$ $(82 + 6) - (82 - 5)$

(3) $82 + \{8 + 6 + (-5) + 0 + (-4)\} \div 5 = 82 + 5 \div 5$
 $= 82 + 1 = 83$ (点)

10 生産数の平均は、
 $1500 + \{37 + (-28) + (-12) + 55 + (-43) + 0 + 19\} \div 7$
 $= 1500 + 28 \div 7 = 1500 + 4 = 1504$ (個)
7 日間の総生産数は、 $1504 \times 7 = 10528$ (個)

p.34~p.35

確認問題

1 ㉞ $0.3, -\frac{4}{7}, \frac{3}{8}, -0.8$

㉟ $0, -18, -1, -22$

㊱ $9, 2, 4, 15$

2 ア、ウ

3 イ、エ

4 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

5 (1) 2^2 (2) 2×3 (3) $2^2 \times 3$

(4) $2^3 \times 5$ (5) $2^3 \times 7$ (6) $2^3 \times 3 \times 5$

(7) $2^2 \times 7^2$ (8) $3^2 \times 5^2$ (9) $3^2 \times 5 \times 11$

6 9 の倍数…イ、エ、カ 14 の倍数…オ、カ

7 (1) 6 をかける (2) 6 でわる

8 (1) 35.4cm

(2)

	A	B	C	D	E
記録(cm)	37	35	42	29	34
基準との差(cm)	+2	0	+7	-6	-1

(35cm より)0.4cm 高い

9 (1) 9cm 高い (2) 151.4cm

解説

1 ㉞…正の整数である。数直線で 0 より右側にある整
数で、0 はふくまないから、9, 2, 4, 15

㉟…0 と負の整数なので、0, -18, -1, -22

㊱…㉞と㉟で選ばなかった、残りの数を選ぶ。

$0.3, -\frac{4}{7}, \frac{3}{8}, -0.8$

2 イは、 $2 - 5 = -3$ のように、計算の結果が負の数に
なる場合もあり、エは、 $1 \div 5 = 0.2$ や $2 \div 9 = \frac{2}{9}$ に
なる場合もあるから、イとエは、計算の結果がいつでも
自然数であるとは限らない。

3 アは、自然数 - 自然数 = 負の整数になる場合がある。
ウは、整数 $\div$ 整数 = 小数や分数になる場合がある。

5 (1) $\begin{array}{r} 2 \overline{)4} \\ 2 \end{array}$ (2) $\begin{array}{r} 2 \overline{)6} \\ 3 \end{array}$ (3) $\begin{array}{r} 2 \overline{)12} \\ 2 \overline{)6} \\ 3 \end{array}$
 $4 = 2^2$ $6 = 2 \times 3$ $12 = 2^2 \times 3$

(4) $\begin{array}{r} 2 \overline{)40} \\ 2 \overline{)20} \\ 2 \overline{)10} \\ 5 \end{array}$ (5) $\begin{array}{r} 2 \overline{)56} \\ 2 \overline{)28} \\ 2 \overline{)14} \\ 7 \end{array}$ (6) $\begin{array}{r} 2 \overline{)120} \\ 2 \overline{)60} \\ 2 \overline{)30} \\ 3 \overline{)15} \\ 5 \end{array}$
 $40 = 2^3 \times 5$ $56 = 2^3 \times 7$ $120 = 2^3 \times 3 \times 5$

$$\begin{array}{r}
 (7) \quad 2 \overline{)196} \\
 2 \overline{)98} \\
 7 \overline{)49} \\
 \hline
 7
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 (8) \quad 3 \overline{)225} \\
 3 \overline{)75} \\
 5 \overline{)25} \\
 \hline
 5
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 (9) \quad 3 \overline{)495} \\
 3 \overline{)165} \\
 5 \overline{)55} \\
 \hline
 11
 \end{array}$$

$$196 = 2^2 \times 7^2 \quad 225 = 3^2 \times 5^2 \quad 495 = 3^2 \times 5 \times 11$$

- 6 素数の積の中に $9 = \underline{3^2} = \underline{3 \times 3}$, $14 = \underline{2 \times 7}$ の積をふくむものを見つける。

イ $2 \times \underline{3^2} \times 5$

エ $2^2 \times 3^3 \times 13 = 2^2 \times \underline{3 \times 3 \times 3} \times 13$

オ $2^3 \times 3 \times 7 = 2 \times 2 \times 3 \times \underline{2 \times 7}$

カ $2 \times 3^2 \times 5 \times 7 = \underline{3^2} \times 5 \times \underline{2 \times 7}$

- 7 (1) 175 を素因数分解すると, $175 = 5^2 \times 7$ だから, 6 の倍数にするには, 175 に 6 をかける。

- (2) 216 を素因数分解すると, $216 = 2^3 \times 3^3$ で, ある数の 2 乗にするには, 指数が偶数であればよい。

よって, $2^3 \times 3^3$ を (2×3) でわると,

$$2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \div (2 \times 3) = 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

$$= (2 \times 3) \times (2 \times 3) = 6 \times 6 = 6^2 \rightarrow 6 \text{ の } 2 \text{ 乗になる。}$$

- 8 (1) $(37 + 35 + 42 + 29 + 34) \div 5 = 177 \div 5 = 35.4(\text{cm})$

- (2) 基準との差の平均は,

$$\{2 + 0 + 7 + (-6) + (-1)\} \div 5 = 2 \div 5 = 0.4(\text{cm})$$

であり, これは, 5 人の垂直跳びの平均が, 基準の 35cm より 0.4cm 高いことを示している。

- 9 (1) $(+7) - (-2) = 9(\text{cm})$

(2) $150 + \{7 + (-1) + (-2) + 0 + 3\} \div 5$
 $= 150 + 7 \div 5 = 151.4(\text{cm})$

p.36~p.39

- 1 (1) ㉞ 負の数 ㉠ 正の数 ㉡ 自然数

(2) ㉢ 絶対値 ㉣ $\frac{2}{3}$

(3) ㉦ <

(4) ㉧ 項 ㉨ 負の項

(5) ㉩ 逆数 ㉪ $-\frac{5}{3}$


(6) ㉫ 2 乗 ㉬ 3 乗 ㉭ 指数

(7) ㉮ 素数

(8) ㉯ 素因数分解

㉺ 12

- 2 (1) A...-3 B...-1.5 C...+4



- 3 (1) -200 (2) -3 (3) 多い

- 4 (1) -7 (2) -7, 0, +4 (3) +4

(4) -7, -4.7, $-\frac{7}{4}$, 0, +0.7, +4

- 5 (1) $+8 > -11$ (2) $-9 < 0 < +6$

(3) $-0.1 > -\frac{1}{5}$

- 6 (1) -4 (2) 20 (3) -32

(4) -5.5 (5) -4.8 (6) 4.7

(7) $-\frac{19}{15}$ (8) $\frac{1}{14}$ (9) $-\frac{11}{15}$

- 7 (1) $(-4) + 3 + 5 + (-7)$

(2) 正の項...3, 5 負の項...-4, -7

- 8 (1) 2 (2) -19 (3) -8

(4) -6 (5) -4 (6) 2

- 9 (1) 91 (2) -4.08 (3) $-\frac{5}{6}$

(4) 0 (5) -2.4 (6) $-\frac{1}{9}$

- 10 (1) $-\frac{5}{6}$ (2) $\frac{7}{9}$ (3) 40

(4) -1.8 $\left[-\frac{9}{5}\right]$ (5) $-\frac{1}{2}$ (6) $\frac{2}{3}$

- 11 (1) -27 (2) -2 (3) 6

(4) 14 (5) 28 (6) $\frac{1}{16}$

- 12 (1) $\left(-\frac{3}{4} + \frac{4}{5}\right) \times (-60)$

$$= \left(-\frac{3}{4}\right) \times (-60) + \frac{4}{5} \times (-60)$$

$$= 45 - 48$$

$$=-3$$

$$(2) -17 \times 3.14 - 13 \times 3.14$$

$$=(-17-13) \times 3.14$$

$$=(-30) \times 3.14$$

$$=-94.2$$

13 ア, ウ

14 6の倍数…ア, ウ, オ, カ

18の倍数…ア, ウ

15 (1) 67点 (2) 86点

解説

2 (2) $-\frac{7}{2} = -3.5$ だから, -4 と -3 のまん中の数になる。

3 (1) 利益を正の数で表すから, 損失は負の数で表される。

(2) 何分後を正の数で表すから, 何分前は負の数で表される。

(3) 「7個少ない」ことと等しいのは, 「-7個多い」ことである。

4 $-\frac{7}{4} = -1.75$ だから, $-\frac{7}{4}$ は -1 と -2 の間にある数になる。

5 (2) 3つ以上の数の大小関係は, 大きさの順に並べなおして, 同じ向きの不等号で表す。

負の数 $< 0 <$ 正の数であるから, $-9 < 0 < +6$

(3) 負の数どうしの大小は, 絶対値が大きいほど小さい数になる。

$$-\frac{1}{5} = -0.2 \text{ より, } -0.1 > -\frac{1}{5}$$

$$\textbf{6} (1) 8 + (-12) = -(12-8) \\ = -4$$

$$(2) (+6) - (-14) = (+6) + (+14) \\ = +(6+14) \\ = 20$$

$$(3) -15 - 17 = -(15+17) = -32$$

$$(4) (-2.3) + (-3.2) = -(2.3+3.2) = -5.5$$

$$(5) -5.2 - (-0.4) = -5.2 + (+0.4) \\ = -(5.2-0.4) \\ = -4.8$$

$$(6) 0 - (-4.7) = 0 + (+4.7) = 4.7$$

$$(7) \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{3}{5}\right) = -\left(\frac{2}{3} + \frac{3}{5}\right) \\ = -\left(\frac{10}{15} + \frac{9}{15}\right) \\ = -\frac{19}{15}$$

$$(8) -\frac{1}{2} - \left(-\frac{4}{7}\right) = -\frac{1}{2} + \left(+\frac{4}{7}\right)$$

$$= +\left(\frac{4}{7} - \frac{1}{2}\right)$$

$$= +\left(\frac{8}{14} - \frac{7}{14}\right)$$

$$= \frac{1}{14}$$

$$(9) -\frac{2}{5} - \frac{1}{3} = -\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{3}\right) \\ = -\left(\frac{6}{15} + \frac{5}{15}\right) \\ = -\frac{11}{15}$$

$$\textbf{8} (1) -3 - 5 + 10 = 10 - 3 - 5 \\ = 10 - 8 \\ = 2$$

$$(2) -7 + (-3) - 9 = -7 - 3 - 9 = -19$$

$$(3) -7 - (-3) + (-4) = 3 - 7 - 4 \\ = 3 - 11 \\ = -8$$

$$(4) -10 - 7 - 1 + 12 = 12 - 10 - 7 - 1 \\ = 12 - 18 \\ = -6$$

$$(5) 9 - 8 - (-5) + (-10) = 9 - 8 + 5 - 10 \\ = 9 + 5 - 8 - 10 \\ = 14 - 18 \\ = -4$$

$$(6) -15 + 9 - (-10) - 2 = 9 + 10 - 15 - 2 \\ = 19 - 17 \\ = 2$$

$$\textbf{9} (2) 1.2 \times (-3.4) = -(1.2 \times 3.4) = -4.08$$

$$(3) \left(-\frac{3}{8}\right) \times \frac{20}{9} = -\left(\frac{3}{8} \times \frac{20}{9}\right) = -\frac{5}{6}$$

$$(5) (-7.2) \div 3 = -(7.2 \div 3) = -2.4$$

$$(6) \frac{7}{3} \div (-21) = -\left(\frac{7}{3} \times \frac{1}{21}\right) = -\frac{1}{9}$$

$$\textbf{10} (3) 56 \div (-14) \times (-10) \\ = 56 \times \left(-\frac{1}{14}\right) \times (-10) \\ = 56 \times \frac{1}{14} \times 10 \\ = 40$$

$$(4) (-0.25) \times 0.9 \times 8 = 0.9 \times (-0.25) \times 8 \\ = 0.9 \times \{(-0.25) \times 8\} \\ = 0.9 \times (-2) \\ = -1.8$$

別解 分数にしてもよい。

$$\left(-\frac{25}{100}\right) \times \frac{9}{10} \times 8 \\ = \left(-\frac{1}{4}\right) \times 8 \times \frac{9}{10}$$

$$= -\frac{9}{5}$$

$$(5) \frac{2}{15} \div \frac{4}{9} \times \left(-\frac{5}{3}\right)$$

$$= -\left(\frac{2}{15} \times \frac{9}{4} \times \frac{5}{3}\right)$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$(6) -\frac{2}{7} \div \left(-\frac{9}{7}\right) \times 3$$

$$= +\left(\frac{2}{7} \times \frac{7}{9} \times 3\right)$$

$$= \frac{2}{3}$$

$$\boxed{11} (2) 3 \times (-2) + 4 = -6 + 4$$

$$= -2$$

$$(3) (-12) \div (-6) + 2^2 = 2 + 4$$

$$= 6$$

$$(4) (-9 + 2) \times (-2) = (-7) \times (-2)$$

$$= 14$$

$$(5) (-2)^2 \times 3 - (-4^2) = 4 \times 3 - (-16)$$

$$= 12 + 16$$

$$= 28$$

$$(6) 3^2 \div 36 \div (-2)^2 = 9 \div 36 \div 4$$

$$= 9 \times \frac{1}{36} \times \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{16}$$

$\boxed{12}$ (1) 分配法則 $(a+b) \times c = a \times c + b \times c$ を利用する。

(2) 分配法則 $a \times c + b \times c = (a+b) \times c$ を利用する。

$\boxed{13}$ イ…自然数 $\times$ 自然数の答えは自然数であるから、正しくない。

エ… $3-7=-4$ のように、自然数 $-$ 自然数の答えはいつも自然数になるとは限らないので、正しくない。

$\boxed{14}$ 素数の積の中に、 $6 = 2 \times 3$ 、 $18 = 2 \times 3^2$ をふくむものを見つければよい。

$$\text{ア } 2^2 \times 3^2 \times 7 = 2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 7 = 2 \times 3^2 \times 2 \times 7$$

$$\text{ウ } 2 \times 3^3 \times 5 = 2 \times 3 \times 3^2 \times 5 = 2 \times 3^2 \times 3 \times 5$$

$$\text{オ } 2 \times 3 \times 5^2$$

$$\text{カ } 2^3 \times 3 \times 13 = 2 \times 3 \times 2^2 \times 13$$

$$\boxed{15} (1) 83 - 16 = 67(\text{点})$$

$$(2) (3 + 0 - 16 - 9 + 2) \div 5 = (-20) \div 5 = -4(\text{点})$$

$$90 - 4 = 86(\text{点})$$

p.40~p.41

$\boxed{1}$ まちがっている理由…

例 3つの数の大小を順に表していない。不等号が同じ向きになっていない。など

正しい大小関係… $-5 < -3 < 2$

$\boxed{2}$ (1) -15 (2) -6

$\boxed{3}$ (1) もっとも大きい数… $a-b$
もっとも小さい数… $b-a$

(2) 3

$\boxed{4}$ (1) -32 (2) 正

$\boxed{5}$ (1) 例 $6 \div 6 \div 6 \div 6 \div 6 = 2$

(2) 例 $(6 \times 6 \div 6 \div 6) \div 6 = 7$

$\boxed{6}$ (1) 3 (2) 42

$\boxed{7}$ (1) -3cm (2) C

(3) 142cm

$\boxed{8}$ -3 と 5

$$\boxed{9}$$

-7	7	6	-4
4	-2	-1	1
0	2	3	-3
5	-5	-6	8

解説

$\boxed{2}$ (1) 絶対値が等しい正の数と負の数の和は0になることに目をつける。 -6 から -1 までの和と1から6までの和を合わせると0になるから、 -8 から6までの整数の和は、

$$(-8) + (-7) + 0 = -(8+7) = -15$$

(2) 絶対値が等しく、差が12である2つの整数は、 $12 \div 2 = 6$ より、絶対値が6であり、一方が正の整数で他方が負の整数である。負の整数は正の整数より小さいから、小さい方の整数は -6 である。

$\boxed{3}$ (1) a と b を基準にして大小関係を考える。
 $a+b$ は(正)+(負)なので、 b より大きく、 a より小さい。

$$b < a+b < a$$

$a-b$ は(正)-(負)=(正)+(正)なので、 a より大きい。

$$a < a-b$$

$b-a$ は(負)-(正)=(負)+(負)なので、 b より小さい。

$$b-a < b$$

よって、もっとも大きい数は、 a より大きい

$$a-b$$

もっとも小さい数は、 b より小さい

$$b-a$$


別解 具体的な数をあてはめて考えるとよい。

$a=5$, $b=-7$ とすると, $a+b=-2$, $a-b=12$, $b-a=-12$ となることがわかる。

(2) アより, a は 2。

イより, 「 a は c より 5 大きい」

→ 「2 は c より 5 大きい」



→ 「 c は 2 より 5 小さい」

よって, c は, $2-5=-3$

ウより, 「 b と c の和は 0 である」

→ 「 b と -3 の和は 0 である」

→ 「 b は -3 と絶対値が等しく符号が逆である」

よって, b は 3

別解 $a=2$ で, $a=c+5$ より, $2=c+5$, $c=-3$
 b と c の和が 0 なので, $b+c=0$, $b+(-3)=0$,
 $b=0+3=3$

- 4** (1) ある数を a とすると, $a \div (-8) = -0.5$ より,
 $a = (-0.5) \times (-8) = 4$
 正しい計算をしたときの答えは,
 $4 \times (-8) = -32$

(2) c は 3 乗すると負になるから, $c < 0$

また, $b \times c > 0$ より, $b < 0$

さらに, $a \times b < 0$ より, $a > 0$

- 5** (1) $6 \div 6 = 1$ より, $6 \div 6$ と $6 \div 6$ の和が 2 になることがわかる。
- (2) $(6 \square 6 \square 6) \square 6 = 7$ で, 3 番目の $\square$ に $+$, $-$, $\times$, $\div$ をあてはめてみると, () の中の数は, それぞれ 1, 13, $\frac{7}{6}$, 42 になる。 $(6 \square 6 \square 6)$ が 1, 13, $\frac{7}{6}$ にはならないので, 42 になる場合を考える。

$$(6 \times 6 \div 6) = 42 \rightarrow (6 \times 6 \div 6) \div 6 = 7$$

- 6** (1) 168 を素因数分解すると, $168 = 2^3 \times 3 \times 7$
 $9 = 3^2$ だから, 168 に 3 をかけると 9 の倍数になる。

(2) 126 を素因数分解すると, $126 = 2 \times 3^2 \times 7$

よって, 126 に $2 \times 7 = 14$ をかけると, その積は, ある自然数の 2 乗になる。

$$\begin{aligned} \text{このとき, } 126 \times 14 &= (2 \times 3^2 \times 7) \times (2 \times 7) \\ &= 2^2 \times 3^2 \times 7^2 = (2 \times 3 \times 7)^2 = 42^2 \end{aligned}$$

- 7** (1) B は A よりも +5cm 高く跳び, C は B よりも -8cm 高く跳んだ。よって, C は A よりも $(+5)-8 = -3(\text{cm})$ 高く跳んだことがわかる。

(2) A の記録を基準にすると, B は +5, C は (1) より -3, D は $(-3)+9 = +6$, E は $(+6)-4 = +2$ と表せるので, もっとも記録が低かったのは C。

A を基準にすると, 次の表のようになる。

	A	B	C	D	E
前の人との違い (cm)	—	+5	-8	+9	-4
A との違い (cm)	0	+5	-3	+6	+2

(3) A との違いを使った平均は,

$$(0+5-3+6+2) \div 5 = +2$$

A の記録は, $138-2 = 136(\text{cm})$

したがって, D の記録は, $136+6 = 142(\text{cm})$

- 8** 2 つの整数の積が -15 になる 2 数の組は,

1 と -15, 3 と -5, -1 と 15, -3 と 5

この 4 組の中で, 2 数の和が 2 になるのは, -3 と 5 である。

- 9** 斜めの 4 つの数の和は,

$$(-7) + (-2) + 3 + 8 = 2$$

$$\textcircled{1} \cdots 2 - (-7 + 6 - 4) = 7$$

$$\textcircled{2} \cdots 2 - (6 + 3 - 6) = -1$$

$$\textcircled{3} \cdots 2 - (7 - 2 - 5) = 2$$

$$\textcircled{4} \cdots 2 - (-5 - 6 + 8) = 5$$

$$\textcircled{5} \cdots 2 - (-7 + 0 + 5) = 4$$

$$\textcircled{6} \cdots 2 - (4 - 2 - 1) = 1$$



$$\textcircled{7} \cdots 2 - (-4 + 1 + 8) = -3$$

-7	①	6	-4
⑤	-2	②	⑥
0	③	3	⑦
④	-5	-6	8

p.42~p.43

- 1 (1) $-0.3, -5$ (2) $+4, 7$
 2 (1) -2 (2) -5 (3) -450
 3 (1) $-0.15 < -0.1$ (2) $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3} < -\frac{1}{5}$
 4 (1) $-2, -1$ (2) 0
 5 (1) -5 (2) 4 (3) -1.1
 (4) $-\frac{1}{12}$ (5) 2 (6) 0
 6 7
 7 (1) -3 (2) 8 (3) -0.6
 (4) -12 (5) $-\frac{4}{7}$ (6) $-\frac{5}{2}$
 (7) -27 (8) -2 (9) -24
 (10) -12
 8 (1) ㉞ $\frac{7}{2}$ ㉟ -5 (2) $(-5)^4$
 (3) $(2, -2), (1, -4), (4, -1), (-2, 2), (-1, 4), (-4, 1)$
 9 $(\frac{5}{6} - \frac{3}{4}) \times (-24) = \frac{5}{6} \times (-24) + (-\frac{3}{4}) \times (-24)$
 $= -20 + 18$
 $= -2$

解説

- 1 (2) 正の整数 $1, 2, 3, \dots$ を自然数という。
 この中で正の整数は $+4, 7$
 2 数直線を使って考えるとよい。
 (1)  (2) 
 (2)は「3より5大きい数は8」を「3より-5小さい数」と言い換えることができる。
 3 負の数では、絶対値が大きいほど小さい数になる。
 (2) $\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{5}$ だから、 $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3} < -\frac{1}{5}$
 4 (2) $(-9) + (-8) + \dots + 0 + \dots + (+8) + (+9) = 0$
 5 (2) $(-2) - (-6) = (-2) + (+6) = +(6-2) = 4$
 (4) $(-\frac{1}{4}) - (-\frac{1}{6}) = (-\frac{1}{4}) + (+\frac{1}{6})$
 $= \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = \frac{2}{12} - \frac{3}{12} = -\frac{1}{12}$


$$(5) -3 + 8 - 9 - (-6) = -3 + 8 - 9 + 6$$

$$= 8 + 6 - 3 - 9$$

$$= 14 - 12$$

$$= 2$$

- 6 「 b が -2 」で、「 b は c より5大きい」から、
 「 -2 は c より5大きい」



→ 「 c は -2 より5小さい」

よって、 c は $-2-5=-7$

a と c は異なる整数で、絶対値が等しいから、 a は7

別解 $b=c+5, b=-2$ のとき、 $-2=c+5$ より、
 $c=-7$

a と c は異なる数で、絶対値が等しいから、 $a=7$

- 7 (2) $(-24) \div (-3) = +(24 \div 3) = 8$
 (4) $9 \div (-\frac{3}{4}) = 9 \times (-\frac{4}{3}) = -(9 \times \frac{4}{3}) = -12$
 (6) $2 + 6 \times (-\frac{3}{4}) = 2 - (6 \times \frac{3}{4})$
 $= 2 - \frac{9}{2}$
 $= \frac{4}{2} - \frac{9}{2}$
 $= -\frac{5}{2}$

$$(8) (-4)^2 \div (-2^3) = 16 \div (-8)$$

$$= -(16 \div 8) = -2$$

$$(10) (5-29) \div (-4) - 2 \times 3^2$$

$$= (-24) \div (-4) - 2 \times 9$$

$$= 24 \div 4 - 2 \times 9$$

$$= 6 - 18$$

$$= -12$$

- 8 (1) ㉞ $\frac{2}{7} \times \frac{7}{2} = 1$ だから、 $\frac{2}{7}$ の逆数は $\frac{7}{2}$
 ㉟ $-0.2 = -\frac{1}{5}$ $(-\frac{1}{5}) \times (-5) = 1$ だから、
 -0.2 の逆数は -5

- (2) 負の数の累乗の大小関係は、指数が偶数か奇数かに注目する。

$(-4)^5$ は、指数が奇数なので負の数。

$(-5)^4$ は、指数が偶数なので正の数。

よって、 $(-4)^5 < (-5)^4$

- (3) 4を素因数分解すると $4=2^2$

また、2つの数の積が負のとき、どちらか一方は負の数なので、2つの整数の組み合わせは、 $(2, -2), (1, -4), (4, -1), (-2, 2), (-1, 4), (-4, 1)$ の6つ。

p.44~p.45

1 ア, ウ

2 (1) 2×7^2 (2) $2^3 \times 3^2 \times 5$

3 (1) ア, エ (2) 6

(3) 15

4 (1) 15 点 (2) 80 点

5 (1) 150 個 (2) 156 個

6 (1) 3 点 (2) 8 点 (3) A, B, D

7 S さん, E さん

8 -6, 2

9 右の表

0	1	-4
-5	-1	3
2	-3	-2

解 説

1 自然数は正の整数。整数は負の数も含んでいる。
自然数×整数の整数が負の数のとき、自然数×整数は負の整数。よって、イは正しくない。 $3-5=-2$ のよう
に自然数-自然数が負の数になることがあるので、
エも正しくない。

2 (1) $2 \overline{)98}$ (2) $2 \overline{)360}$
 $7 \overline{)49}$
 7
 $2 \overline{)180}$
 $2 \overline{)90}$
 $3 \overline{)45}$
 $3 \overline{)15}$
 5

3 (1) ア…3以上12以下の自然数のうち、素数は3, 5, 7, 11で、この4個の素数の積は $3 \times 5 \times 7 \times 11$ だから、15の倍数である。

イ…24の約数のうち、2の倍数であるものは、2, 4, 6, 8, 12, 24の6個ある。

ウ…素数と自然数の積は自然数である。

エ… $396 = 2^2 \times 3^2 \times 11$ だから、396は6の倍数であり、33の倍数でもある。

(3) $315 = 3^2 \times 5 \times 7$, $480 = 2^5 \times 3 \times 5$,
 $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$ であるから、この3つの数の最大公約数は、 $3 \times 5 = 15$ である。

4 (1) $6 - (-9) = 15$ (点)

(2) 基準との差の平均は、

$$\{6+5+(-16)+(-9)+4\} \div 5$$

$$= \{15+(-25)\} \div 5 = (-10) \div 5 = -2 \text{ (点)}$$

5人の得点の平均が78点だから、

$$(\text{基準にした得点}) + (-2) = 78 \text{ より、}$$

$$(\text{基準にした得点}) = 78 - (-2) = 80 \text{ (点)}$$

5 (1) 土曜日は、生産数と基準にした生産数との差が

示されているので、基準にした生産数は、

$$139 - (-11) = 150 \text{ (個)}$$

(2) 表の空欄をうめると、下のようになる。

	月	火	水	木	金	土
生産数(個)	127	158	162	178	172	139
基準との差(個)	-23	+8	+12	+28	+22	-11

6日間の生産数の平均は、

$$150 + \{-23+8+12+28+22+(-11)\} \div 6$$

$$= 150 + 36 \div 6 = 150 + 6 = 156 \text{ (個)}$$

6 (1) BはAより-3点、CはBより+6点高いので、
CはAよりも $(-3) + (+6) = +3$ (点)高い。

(2) (1)と同様にして、Aの記録との差を考えると、
下の表のようになる。

	A	B	C	D	E
前との差	-	-3	+6	-5	+7
Aとの差	0	-3	+3	-2	+5

$$\text{最大値}-\text{最小値} = (+5) - (-3) = 8 \text{ (点)}$$

(3) Aとの差の平均を求めると、

$$(0-3+3-2+5) \div 5 = +0.6$$

Aとの差が+0.6より小さいA, B, Dが答えとなる。

7 Nさんの身長を基準として、表にまとめて考える。

	Nさん	Wさん	Sさん	Eさん
基準との差(cm)	-	-8	-12	-14

WさんはNさんより-8cm高い。SさんはNさんより-12cm高い。EさんはWさんより6cm低いので、
EさんはNさんより $-8-6 = 14$ (cm)低い。

WさんとSさんの差は、 $-8 - (-12) = 4$ (cm)

SさんとEさんの差は、 $-12 - (-14) = 2$ (cm)

よって、身長の差がもっとも少ない2人はSさんとEさん。

8 2つの整数を a, b とすると、

$$a+b=-4, a \times b=-12$$

乗法の答えが負の数なので a と b のどちらか一方が負の数になる。

$-12 = -(2^2 \times 3)$ なので、積が-12になる2つの整数 $a,$

b の組み合わせは、 $(a, b) = (-1, 12), (-2, 6),$

$(-3, 4), (-4, 3), (-6, 2), (-12, 1)$

この中で、 $a+b=-4$ になるのは、 $(-6, 2)$ の組み合わせ。

9 使うのは、-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3の9つの数。表には横に3行ある。横1行の3つの数の和は3行とも同じであるから、9つの数の和を3等分すれば、横1行の3つの数の和が求められる。

$$\{(-5)+(-4)+(-3)+(-2)+(-1)+0+1+2+3\} \div 3 = -3$$

縦、横、斜めの合計がそれぞれ-3になればよい。

5 文字を使った式

p.46~p.49

① (1) $3 \div n(L)$ (2) $m \times 7 + 3(\text{枚})$

② (1) $2 \times a + 3 \times b(g)$ (2) $10 \times a + b$

③ (1) $14x$ (2) $-1.8n$ (3) $-2xy$

(4) $2(a-b)$ (5) $-4(x-y)$

④ (1) x^2y (2) $4x^2$ (3) $-b^3$

⑤ (1) $9 \times x$ (2) $-2 \times (m+n)$

(3) $7 \times m \times m \times n$

⑥ (1) $-\frac{x}{5}$ $\left[-\frac{1}{5}x\right]$ (2) $\frac{b}{cd}$

(3) $\frac{m-n}{2}$ $\left[\frac{1}{2}(m-n)\right]$

⑦ (1) $-x \div 4$ $[x \div (-4)]$ (2) $x \div 3 \div y$

(3) $(m-n) \div 5$

⑧ (1) $-a+b$ (2) $7b + \frac{5}{a}$

⑨ (1) $6 \times x \div y - 8 \times x \times y$

(2) $6 \times m \times m + 3 \div 8 \div n$

(3) $5 \times (a-b) - (c+2) \div 4$

⑩ (1) $5000 - 140a(\text{円})$ (2) $8x + 6y(\text{円})$

⑪ (1) $80x(\text{m})$ (2) $\frac{a}{3}(\text{km/h})$

(3) $\frac{900}{p}(\text{分})$

⑫ (1) $\frac{1}{4}a(\text{人})$ $(0.25a(\text{人}))$

(2) $\frac{4}{5}b(\text{円})$ $(0.8b(\text{円}))$

⑬ (1) 数量…3年生の人数 単位…人

(2) 数量…正方形の周の長さ
単位…cm

⑭ (1) 17 (2) -6 (3) 50

⑮ (1) 12 (2) 3 (3) $-\frac{13}{3}$

解説

① (2) (色紙の枚数) = (配った枚数) + (余った枚数) で、
配った枚数は、 $m \times 7(\text{枚})$ だから、

色紙の枚数は、 $m \times 7 + 3(\text{枚})$

② (1) 2g のおもり a 個の重さ… $2 \times a(g)$

3g のおもり b 個の重さ… $3 \times b(g)$

重さの合計は、 $2 \times a + 3 \times b(g)$

(2) 十の位の数が a 、一の位の数 b である 2 けたの
自然数は、10 が a 個と、1 が b 個の和になるから、
 $10 \times a + b$

③ (3) $y \times (-2) \times x = (-2) \times x \times y = -2xy$

④ (3) $b \times b \times (-1) \times b = (-1) \times b \times b \times b = -b^3$

⑤ (2) 省かれている記号 $\times$ は、 -2 と $(m+n)$ の間にあ
るから、 $-2(m+n) = -2 \times (m+n)$

⑥ (3) わり算を分数の形で表すとき、 $m-n$ 全体を 2
でわっていることがわかるので、かっこをはずす。

$$(m-n) \div 2 = \frac{m-n}{2} \quad \leftarrow \text{かっこをはずす。}$$

別解 $(m-n) \div 2 = (m-n) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(m-n)$

この場合はかっこをはずさない。

⑨ (3) 分数の形からわり算にすると、 $c+2$ 全体を 4
でわっていることがわかるように、かっこをつける。

$$5(a-b) - \frac{c+2}{4} = 5 \times (a-b) - (c+2) \div 4$$

かっこをつける。

⑪ (1) (道のり) = (速さ) $\times$ (時間) だから、

$$80 \times x = 80x(\text{m})$$

(2) (速さ) = $\frac{(\text{道のり})}{(\text{時間})}$ だから、 $a \div 3 = \frac{a}{3}(\text{km/h})$

(3) (時間) = $\frac{(\text{道のり})}{(\text{速さ})}$ だから、 $900 \div p = \frac{900}{p}(\text{分})$

⑫ (1) $a \times \frac{25}{100} = a \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}a(\text{人})$

別解 $a \times 0.25 = 0.25a(\text{人})$

(2) (割引後の代金) = (定価) $\times$ (1 - 割引きの割合)

だから、 $b \times \left(1 - \frac{2}{10}\right) = b \times \frac{8}{10} = \frac{4}{5}b(\text{円})$

別解 $b \times (1 - 0.2) = b \times 0.8 = 0.8b(\text{円})$

⑬ (1) $1 - \frac{a}{100}$ は、全体から 1 年生と 2 年生の割合を
ひいているから、3 年生の割合を表すので、

$400 \left(1 - \frac{a}{100}\right)$ は、(生徒数) $\times$ (3 年生の割合) となり、

3 年生の人数を表す。よって、単位は、「人」になる。

(2) $4 \times x = 4x$ より、辺の長さ 4 つ分を表す。

⑭ (1) $7 - 2x = 7 - 2 \times (-5)$

$$= 7 + 10$$

$$= 17$$

⑮ (3) $-\frac{1}{3}x + 2y = -\frac{1}{3} \times 1 + 2 \times (-2)$

$$= -\frac{1}{3} - 4$$

$$= -\left(\frac{1}{3} + 4\right)$$

$$= -\frac{13}{3}$$

1 (1) $a \div 7(\text{m})$ (2) $x \times 7 + 120 \times y(\text{円})$
 (3) $50 - b \times 4(\text{cm})$
 (4) $100 \times m + 10 \times n + 2$

2 (1) $-20mn$ (2) $8abcd$
 (3) $-x^3$ (4) x^2y^3
 (5) $9(m+n)$ (6) $(a+b)(a-b)$

3 (1) $-5 \times x \times y$
 (2) $8 \times a \times a \times b \times b \times b \times c$
 (3) $4 \times m \times n + 3 \times m \times m$

4 (1) $-\frac{8}{a}$ (2) $\frac{xy}{z}$
 (3) $\frac{prt}{4qs}$ (4) $4m - \frac{n}{3}$
 (5) $\frac{x+y}{5} - 7z$ (6) $\frac{8-a}{b} - \frac{c}{d-4}$

5 (1) $y \times z \div 2 \div x$
 (2) $(a+b) \div c$
 (3) $2 \times m \times n - 6 \div (m+n)$

6 (1) $1000 - (6a + 2b)(\text{円})$
 (2) $20x(\text{分}) \left[\frac{x}{3}(\text{時間}) \right]$
 (3) $\frac{7}{10}y(\text{L})$ $[0.7y(\text{L})]$
 (4) $3000 \left(1 - \frac{m}{10} \right)(\text{円})$ $[3000 - 300m(\text{円})]$
 (5) $12a(\text{cm})$

7 (1) 例 家から郵便局を通り、公園へ行くまでの道のり
 (2) 例 家から郵便局を通り、公園へ行くまでにかかった時間

8 (1) 25 (2) -10 (3) -4

9 (1) 0 (2) 7 (3) $-\frac{7}{6}$

解説

- 1 (2) 1本 x 円のペン 7本の代金 $\cdots x \times 7(\text{円})$
 1個 120 円の消しゴム y 個の代金 $\cdots 120 \times y(\text{円})$
 代金の合計は、 $x \times 7 + 120 \times y(\text{円})$
 (3) (残りの長さ) = (もとの長さ) - (切り取った長さ)
 で、切り取った長さは $b \times 4(\text{cm})$ なので、残りの長さは、 $50 - b \times 4(\text{cm})$
 (4) 百の位の数が m 、十の位の数 n 、一の位の数 2 である 3けたの自然数は、100 が m 個、10 が n 個、1 が 2 個の和になるから、 $100 \times m + 10 \times n + 2$

2 (3) $x \times (-1) \times x \times x = (-1) \times x \times x \times x = -x^3$

(4) $y \times y \times x \times x \times y = x \times x \times y \times y \times y = x^2y^3$

(6) かつこと +、- の符号は省略できないので、
 $(a+b) \times (a-b) = (a+b)(a-b)$

3 (1) 記号 $\times$ がはいるのは、-5 と x の間と、 x と y の間の 2 か所ある。(- と 5 の間にははまらない。)

$-5xy = -5 \times x \times y$

(2) a^2 は a を 2 回かけあわせたもの、 b^3 は b を 3 回かけあわせたものなので、

$8a^2b^3c = 8 \times a \times a \times b \times b \times b \times c$

(3) m^2 は m を 2 回かけあわせたものなので、

$4mn + 3m^2 = 4 \times m \times n + 3 \times m \times m$

4 (3) $p \div q \times r \div s \div 4 \times t = p \times \frac{1}{q} \times r \times \frac{1}{s} \times \frac{1}{4} \times t$
 $= \frac{prt}{4qs}$

(5) わり算を分数の形で表すと、 $x+y$ 全体を 5 でわっていることがわかるので、かっこをはずす。

$(x+y) \div 5 - z \times 7 = \frac{x+y}{5} - 7z$

(6) $(8-a) \div b - c \div (d-4) = \frac{8-a}{b} - \frac{c}{d-4}$

5 (1) $y \times z$ を 2 と x でわっているので、

$\frac{yz}{2x} = y \times z \div 2 \div x$

(2) $\frac{a+b}{c} = (a+b) \div c$

(3) $2mn - \frac{6}{m+n} = 2 \times m \times n - 6 \div (m+n)$

6 (1) 代金の合計は、 $6a + 2b(\text{円})$ となる。
 よって、おつりは、 $1000 - (6a + 2b)(\text{円})$

(2) $x\text{km} = 1000xm$ で、(時間) = $\frac{(\text{道のり})}{(\text{速さ})}$ だから、

$\frac{1000x}{50} = 20x(\text{分})$

別解 分速を時速になおすと、

$50 \times 60 = 3000$ $3000\text{m} = 3\text{km}$ より、

分速 50m = 時速 3km となるから、かかった時間

は、 $\frac{x}{3}(\text{時間})$

(3) (残りの量) = (もとの量) $\times$ (1 - 飲んだ割合)


だから、 $y \times \left(1 - \frac{30}{100} \right) = y \times \frac{70}{100} = \frac{7}{10}y(\text{L})$

別解 $y \times (1 - 0.3) = y \times 0.7 = 0.7y(\text{L})$

(4) m 割は $\frac{m}{10}$ と表すので、 m 割引きは、 $1 - \frac{m}{10}$

- (5) 立方体の辺の数は、縦、横、高さにあたる辺がそれぞれ4本ずつあるから、 $4 \times 3 = 12$ (本)

- 7 (1) 家から郵便局までは am 、郵便局から公園までは bm あるので、 $a+b(m)$ は、家から郵便局を通り、公園へ行くまでの道のりを表す。



- (2) (時間) = $\frac{(\text{道のり})}{(\text{速さ})}$ より、 $\frac{a}{60}$ は家から郵便局まで

にかかった時間を表し、 $\frac{b}{50}$ は郵便局から公園までにかかった時間を表す。

したがって、 $\frac{a}{60} + \frac{b}{50}$ (分) は、家から郵便局を通り、公園へ行くまでにかかった時間を表す。

- 8 (2) $\frac{20}{x} = 20 \div x = 20 \div (-2) = -(20 \div 2) = -10$

(3) $-x^2 = -(-2)^2 = -4$

- 9 $x = -3$, $y = -4$ のとき、

$$\begin{aligned} (1) \quad -4x + 3y &= -4 \times (-3) + 3 \times (-4) \\ &= 12 - 12 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{1}{3}x - 2y &= \frac{1}{3} \times (-3) - 2 \times (-4) \\ &= -1 + 8 \\ &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad -\frac{1}{2}x + \frac{2}{3}y &= -\frac{1}{2} \times (-3) + \frac{2}{3} \times (-4) \\ &= \frac{3}{2} - \frac{8}{3} \\ &= \frac{9}{6} - \frac{16}{6} \\ &= -\frac{7}{6} \end{aligned}$$

6 文字式の計算

p.52~p.55

- 1 (1) 項... $-3x$, y
 x の係数... -3 , y の係数... 1

- (2) 項... $-\frac{3x}{2}$, $\frac{3y}{4}$, 6
 x の係数... $-\frac{3}{2}$, y の係数... $\frac{3}{4}$

- 2 イ, ウ, エ

- 3 (1) $-2a$ (2) $-2m-1$ (3) $-y+3$
(4) $-\frac{1}{2}m$ (5) $\frac{4}{21}a+6$ (6) $-\frac{7}{10}b+6$

- 4 (1) $6x-3$ (2) $-a+4$ (3) $5x-4$

- 5 (1) $2y-9$ (2) $-4x+8$ (3) $3n+2$

- 6 (1) 和... $5x-7$ 差... $-x+9$
(2) 和... $-3y+2$ 差... $-5y+4$

- 7 (1) $54x$ (2) $7x$ (3) $-27x$

- 8 (1) $-8x+14$ (2) $12x-3$
(3) $5x-1$ (4) $3x+5$
(5) $6x+9$ (6) $20x+12$

- 9 (1) $4x+10$ (2) $6a+9$
(3) $-14a+8$

- 10 (1) $14x+38$ (2) $-4a-23$
(3) $7x-18$ (4) $6x+3$
(5) $\frac{13}{6}x+14$ (6) $-x-13$

- (7) $-\frac{7}{5}x-\frac{2}{3}$ (8) $13x-6$
(9) $3x+8$

解説

- 1 (1) $-3x+y = (-3) \times x + 1 \times y$ なので、
項は、 $-3x$, y で、 x の係数は -3 , y の係数は 1
(2) $-\frac{3x}{2} + \frac{3y}{4} + 6 = \left(-\frac{3}{2}\right) \times x + \frac{3}{4} \times y + 6$ なので、

項は、 $-\frac{3x}{2}$, $\frac{3y}{4}$, 6 で、

x の係数は $-\frac{3}{2}$, y の係数は $\frac{3}{4}$

- 2 ア... $-ab$ は、1つの項に a , b の2つの文字があるので、一次式ではない。

エ...文字が2種類あっても、1つの項に文字が1つなので一次式。

- 3 (3) $y-6-2y+9 = y-2y-6+9 = -y+3$

(4) $-2m + \frac{3}{2}m = \left(-\frac{4}{2} + \frac{3}{2}\right)m = -\frac{1}{2}m$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad \frac{1}{3}a + 6 - \frac{1}{7}a &= \frac{1}{3}a - \frac{1}{7}a + 6 \\
 &= \left(\frac{7}{21} - \frac{3}{21}\right)a + 6 \\
 &= \frac{4}{21}a + 6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \quad -\frac{1}{2}b - 5 - \frac{1}{5}b + 11 &= -\frac{1}{2}b - \frac{1}{5}b - 5 + 11 \\
 &= \left(-\frac{5}{10} - \frac{2}{10}\right)b - 5 + 11 \\
 &= -\frac{7}{10}b + 6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{4} \quad (2) \quad 2a - (3a - 4) &= 2a - 3a + 4 \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{かつこの前が} \\ \text{－のときは、} \\ \text{かつこをはず} \\ \text{すときの符号} \\ \text{に注意。} \end{array} \\
 &= -a + 4 \\
 (3) \quad 7x - 3 - (2x + 1) &= 7x - 3 - 2x - 1 \\
 &= 7x - 2x - 3 - 1 \\
 &= 5x - 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{5} \quad (2) \quad (-3x + 6) - (x - 2) &= -3x + 6 - x + 2 \\
 &= -3x - x + 6 + 2 \\
 &= -4x + 8 \\
 (3) \quad (-4 - 5n) - (-6 - 8n) &= -4 - 5n + 6 + 8n \\
 &= -5n + 8n - 4 + 6 \\
 &= 3n + 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{6} \quad (1) \quad \text{差} \quad (2x + 1) - (3x - 8) &= 2x + 1 - 3x + 8 \\
 &= -x + 9 \\
 (2) \quad \text{差} \quad (-4y + 3) - (y - 1) &= -4y + 3 - y + 1 \\
 &= -5y + 4
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{7} \quad (3) \quad 18x \div \left(-\frac{2}{3}\right) = 18x \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -27x$$

$$\textcircled{8} \quad (2) \quad (8x - 2) \times \frac{3}{2} = 8x \times \frac{3}{2} - 2 \times \frac{3}{2} = 12x - 3$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad (15x - 3) \div 3 &= \frac{15x}{3} - \frac{3}{3} \quad \leftarrow \begin{array}{l} (15x - 3) \div 3 \\ = \frac{15x - 3}{3} \\ = \frac{15x}{3} - \frac{3}{3} \\ = 5x - 1 \\ \text{と計算してもよい。} \end{array} \\
 &= 5x - 1
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{9} \quad (1) \quad \frac{2x + 5}{3} \times 6 = (2x + 5) \times 2 = 4x + 10$$

$$(2) \quad -15 \times \frac{-2a - 3}{5} = -3 \times (-2a - 3) = 6a + 9$$

$$(3) \quad \frac{7a - 4}{6} \times (-12) = (7a - 4) \times (-2) = -14a + 8$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{10} \quad (5) \quad \frac{3}{4}(2x + 8) + \frac{2}{3}(x + 12) &= \frac{3}{2}x + 6 + \frac{2}{3}x + 8 \\
 &= \frac{9}{6}x + \frac{4}{6}x + 6 + 8 \\
 &= \frac{13}{6}x + 14
 \end{aligned}$$

$$(6) \quad \frac{1}{3}(3x - 9) - 2(x + 5) = x - 3 - 2x - 10 = -x - 13$$

$$(7) \quad \frac{2}{3}(6x - 10) - \frac{3}{5}(9x - 10)$$

$$\begin{aligned}
 &= 4x - \frac{20}{3} - \frac{27}{5}x + 6 \\
 &= \frac{20}{5}x - \frac{27}{5}x - \frac{20}{3} + \frac{18}{3} \\
 &= -\frac{7}{5}x - \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (9) \quad 8\left(\frac{3}{4}x + \frac{1}{2}\right) - 6\left(\frac{1}{2}x - \frac{2}{3}\right) \\
 &= 6x + 4 - 3x + 4 \\
 &= 3x + 8
 \end{aligned}$$

p.56~p.57

確認問題

- 1** (1) 項… $6x$, 5 , $-5y$
 x の係数… 6 , y の係数… -5
 (2) 項… -2 , $5y$, 7 , $-3x$
 y の係数… 5 , x の係数… -3
 (3) 項… $\frac{a}{9}$, -4 , $-9b$
 a の係数… $\frac{1}{9}$, b の係数… -9
 (4) 項… $\frac{8}{5}c$, $\frac{3}{7}$, $-a$, $-5b$
 c の係数… $\frac{8}{5}$, a の係数… -1 ,
 b の係数… -5

2 (1) $-a$ (2) $\frac{5}{3}b$ $\left[\frac{5b}{3}\right]$

(3) $-5x + 1$

3 (1) $-2y + 3$ (2) $-11a + 1$

(3) $8b + 7$

4 (1) $6x + 4$ (2) $y + 8$

(3) $-8m + 5$

5 (1) 和… $-3x + 1$ 差… $13x - 5$

(2) 和… $2x - 5$ 差… $4x - 3$

6 (1) $-42x$ (2) $-6x$ (3) $12a$

(4) $-4x$ (5) $-24x$ (6) $\frac{1}{2}x$ $\left[\frac{x}{2}\right]$

7 (1) $-12x + 18$ (2) $2y - 7$

(3) $-18b + 45$ (4) $-3x + 7$

(5) $-3y + \frac{2}{7}$ (6) $\frac{7}{4}b - \frac{1}{2}$

8 (1) $-15x + 9$

(2) $\frac{7}{3}a - \frac{49}{3}$ $\left[\frac{7a - 49}{3}\right]$

(3) $10x + 6$

9 (1) $-22x + 62$ (2) $6a + 4$

(3) $-x + 2$

解説

$$\begin{aligned} \text{1 (2)} \quad & -2+5y+7-3x=(-2)+5y+7+(-3x) \\ & =(-2)+5\times y+7+(-3)\times x \end{aligned}$$

なので、項は $-2, 5y, 7, -3x$

y の係数は 5 , x の係数は -3

$$\begin{aligned} \text{(3)} \quad & \frac{a}{9}-4-9b=\frac{a}{9}+(-4)+(-9b) \\ & =\frac{1}{9}\times a+(-4)+(-9)\times b \end{aligned}$$

なので、項は $\frac{a}{9}, -4, -9b$

a の係数は $\frac{1}{9}$, b の係数は -9

$$\begin{aligned} \text{(4)} \quad & \frac{8}{5}c+\frac{3}{7}-a-5b \\ & =\frac{8}{5}c+\frac{3}{7}+(-a)+(-5b) \\ & =\frac{8}{5}\times c+\frac{3}{7}+(-1)\times a+(-5)\times b \end{aligned}$$

なので、項は $\frac{8}{5}c, \frac{3}{7}, -a, -5b$

c の係数は $\frac{8}{5}$, a の係数は -1 , b の係数は -5

$$\begin{aligned} \text{2 (1)} \quad & -7a+6a=(-7+6)a \\ & =-1a \quad \leftarrow \text{この場合の1は省く。} \\ & =-a \end{aligned}$$

$$\text{(2)} \quad 2b-\frac{b}{3}=\left(\frac{6}{3}-\frac{1}{3}\right)b=\frac{5}{3}b$$

$$\text{別解} \quad 2b-\frac{b}{3}=\frac{6b}{3}-\frac{b}{3}=\frac{5b}{3}$$

$$\text{(3)} \quad -8x+5+3x-4=-8x+3x+5-4=-5x+1$$

$$\text{3 (1)} \quad 4y-(6y-3)=4y-6y+3=-2y+3$$

$$\begin{aligned} \text{(2)} \quad & -7a-3+(-4a+4)=-7a-3-4a+4 \\ & =-7a-4a-3+4 \\ & =-11a+1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(3)} \quad & 5b+2-(-3b-5)=5b+2+3b+5 \\ & =5b+3b+2+5 \\ & =8b+7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{4 (1)} \quad & (x+11)+(5x-7)=x+11+5x-7 \\ & =x+5x+11-7 \\ & =6x+4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2)} \quad & (2y-3)-(y-11)=2y-3-y+11 \\ & =2y-y-3+11 \\ & =y+8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(3)} \quad & (-5m+3)-(3m-2)=-5m+3-3m+2 \\ & =-5m-3m+3+2 \\ & =-8m+5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{5 (1)} \quad & \text{和} \quad (5x-2)+(-8x+3)=5x-2-8x+3 \\ & =-3x+1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{差} \quad (5x-2)-(-8x+3)=5x-2+8x-3 \\ & =13x-5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2)} \quad & \text{和} \quad (3x-4)+(-1-x)=3x-4-1-x \\ & =2x-5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{差} \quad (3x-4)-(-1-x)=3x-4+1+x \\ & =4x-3 \end{aligned}$$

$$\text{6 (5)} \quad 15x\div\left(-\frac{5}{8}\right)=15x\times\left(-\frac{8}{5}\right)=-24x$$

$$\text{(6)} \quad -\frac{3}{4}x\div\left(-\frac{3}{2}\right)=-\frac{3}{4}x\times\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{2}x \quad \left[\frac{x}{2}\right]$$

$$\begin{aligned} \text{7 (2)} \quad & (12y-42)\times\frac{1}{6}=12y\times\frac{1}{6}-42\times\frac{1}{6} \\ & =2y-7 \end{aligned}$$

$$\text{(4)} \quad (24x-56)\div(-8)=(24x-56)\times\left(-\frac{1}{8}\right)=-3x+7$$

$$\text{別解} \quad (24x-56)\div(-8)=\frac{24x-56}{-8}=-3x+7$$

$$\begin{aligned} \text{(5)} \quad & \left(15y-\frac{10}{7}\right)\div(-5)=\left(15y-\frac{10}{7}\right)\times\left(-\frac{1}{5}\right) \\ & =-3y+\frac{2}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(6)} \quad & \left(-b+\frac{2}{7}\right)\div\left(-\frac{4}{7}\right)=\left(-b+\frac{2}{7}\right)\times\left(-\frac{7}{4}\right) \\ & =\frac{7}{4}b-\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{8 (1)} \quad & -24\times\frac{5x-3}{8}=-3\times(5x-3) \\ & =-15x+9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2)} \quad & \frac{-a+7}{6}\times(-14)=\frac{-a+7}{3}\times(-7) \\ & =-\frac{a}{3}\times(-7)+\frac{7}{3}\times(-7) \\ & =\frac{7}{3}a-\frac{49}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{別解} \quad & \frac{-a+7}{6}\times(-14)=\frac{-a+7}{3}\times(-7) \\ & =\frac{(-a+7)\times(-7)}{3} \\ & =\frac{7a-49}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(3)} \quad & \frac{-5x-3}{4}\times(-8)=(-5x-3)\times(-2) \\ & =10x+6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{9 (1)} \quad & 7(2x+5)-9(4x-3)=14x+35-36x+27 \\ & =-22x+62 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2)} \quad & -2(a-4)+\frac{1}{2}(16a-8)=-2a+8+8a-4 \\ & =6a+4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(3)} \quad & 12\left(\frac{2x-1}{3}-\frac{3x-2}{4}\right)=12\times\frac{2x-1}{3}-12\times\frac{3x-2}{4} \\ & =4(2x-1)-3(3x-2) \\ & =8x-4-9x+6 \\ & =-x+2 \end{aligned}$$

7 関係を表す式 / 文字式の利用

p.58~p.59

- ① (1) $8x = 960$ (2) $8x - 13 = y$
 (3) $70a = b$
 (4) $100 - 3a = b$ [$3a + b = 100$ など]
 (5) $\frac{13x + 17y}{30} = 720$
- ② (1) $50x > 120y$ (2) $170a + 50 \leq 900$
 (3) $3x + 7 \geq 40$ (4) $a > 4b$
 (5) $\frac{x+y}{2} \leq 45$
- ③ (1) 例 1本 ag の鉛筆 5本の重さと、1個 bg の消しゴム 3個の重さは等しい。
 (2) 例 1本 ag の鉛筆 5本と、1個 bg の消しゴム 3個の重さの合計は、80gより重い。
- ④ (1) 例 三角形の底辺の長さは、高さより短い。
 (2) 例 三角形の面積は、 20cm^2 以下である。

解説

- ① (1) 1本 x 円のジュース 8本の代金は、 $x \times 8$ (円)で、それが960円なので、 $8x = 960$
 (2) ある数 x を8倍した数は $8x$ 、そこから13をひくと y になるので、 $8x - 13 = y$
 (3) 分速70mとは「1分に70m進んだ」ということなので、2分では 70×2 (m)、3分では 70×3 (m)したがって、 a 分では $70 \times a$ (m)である。
 a 分歩いた道のりが bm なので、 $70a = b$
 (4) (もとのテープの長さ) - (切り取るテープの長さ) = (残りのテープの長さ)
 だから、切り取るテープの長さは、 $a \times 3$ (cm)で、
 $100 - 3a = b$
 別解 (切り取るテープの長さ) + (残りのテープの長さ) = (もとのテープの長さ)
 より、 $3a + b = 100$ などとしてもよい。
- (5) (重さの合計) = $13x + 17y$
 (冊数の合計) = $13 + 17 = 30$
 (重さの平均) = $\frac{13x + 17y}{30}$
 したがって、 $\frac{13x + 17y}{30} = 720$
- ② (1) 1本50円の鉛筆 x 本の代金は、 $50 \times x$ (円)で、1個120円の消しゴム y 個の代金は、 $120 \times y$ (円)で、(鉛筆の代金) > (消しゴムの代金)なので、
 $50x > 120y$
 (2) 1個170円のケーキ a 個の代金は、 $170 \times a$ (円)で、これに箱代50円を加えると代金の合計になる。こ

れが900円以下なので、 $170a + 50 \leq 900$

- (3) ある数 x を3倍した数は $3x$ 、そこに7を加えると、40以上となるので、 $3x + 7 \geq 40$
 (4) 1辺の長さが $b\text{cm}$ の正方形の周りの長さは、
 $b \times 4 = 4b$ (cm)
 それが $a\text{cm}$ 未満($a\text{cm}$ より小さい)なので、
 $a \geq 4b$ または、 $4b < a$
 (5) 兄と弟の体重の平均は、
 $\frac{x+y}{2}$ (kg)
 それが45kg以下なので、
 $\frac{x+y}{2} \leq 45$

2つの数量 x, y の平均
 $\frac{x+y}{2}$
 [たして、2でわる]

- ③ (1) 左辺の $5a$ は1本 ag の鉛筆 5本の重さを表し、右辺の $3b$ は1個 bg の消しゴム 3個の重さを表すので、この2つが等しいことを式は表している。
 (2) 左辺の $5a + 3b$ は、(1)より、この2つの合計の重さを表し、それが80gより重いことを式は表している。
- ④ (1) 左辺の a は底辺の長さ、右辺の b は高さだから、この2つの大小関係を式は表している。
 (2) 三角形の面積は $\frac{1}{2} \times (\text{底辺}) \times (\text{高さ})$ なので、左辺の $\frac{1}{2}ab$ はこの三角形の面積を表し、それが 20cm^2 以下であることを式は表している。

- 1 (1) $70-6x=y$ [$6x+y=70$ など]
 (2) $2(x+y)=50$ [$2x+2y=50$]
 (3) $b=4a-c$ [$b+c=4a$ など]

2 (1) $8a-7<5b$

(2) $\frac{y}{100} + \frac{x-y}{50} \leq 20$

(3) $\frac{9}{10}ab \geq 4500$ [$0.9ab \geq 4500$]

3 (1) $2(x-5)=y$

(2) $x>6y$ [$x-6y>0$]

(3) $10a+350=b$

(4) $80x+yz \leq 900$

(5) $\frac{x}{15}=y$

(6) $\frac{6}{5}x=y$ [$1.2x=y$]

- 4 (1) 例 1m あたり 180 円のリボン b m の代金は 720 円である。

- (2) 例 1m あたり 120 円のリボン a m と 1m あたり 180 円のリボン b m の代金の合計は 1000 円より高い。

- 5 (1) 例 1本 200mL 入りのジュース x 本の量は、1本 250mL 入りのジュース y 本の量より 40mL 多い。

- (2) 例 1本 200mL 入りのジュース x 本の量と、1本 250mL 入りのジュース y 本の量の合計は 1000mL 未満である。

- 6 (1) 例 上底と下底の長さの和は高さより長い。

- (2) 例 台形の面積は 25cm^2 以下である。

解 説

- 1 (1) (全体の個数)-(配った個数)=(余り)


70 個が全体の個数で、配った個数は $6x$ 個したがって、 $70-6x=y$

別解 (配った個数)+(余り)=(全体の個数)より、 $6x+y=70$ などとしてもよい。

- (2) (長方形の周の長さ)= $2 \times (\text{縦} + \text{横})$ より、 $2(x+y)=50$

別解 (長方形の周の長さ)= $x+y+x+y=2x+2y$ より、 $2x+2y=50$ としてもよい。


- (3) いまある本数が b 本で、配ろうとする本数は $4a$ 本なので、下の図のようになる。



したがって、 $b=4a-c$

別解 図より、 $b+c=4a$ などとしてもよい。

- 2 (1) a の 8 倍から 7 をひいた数は $8a-7$
 b の 5 倍は $5b$ また、「より小さい」はその数をふくまないで、 $8a-7<5b$



はじめの ym にかかった時間は、 $\frac{y}{100}$ 分

残りの $x-y(m)$ にかかった時間は、 $\frac{x-y}{50}$ 分

かかった時間の合計が 20 分以下であったので、

$$\frac{y}{100} + \frac{x-y}{50} \leq 20$$

- (3) a 円の 1 割引きで売った値段は、

$$a \times \left(1 - \frac{1}{10}\right) = \frac{9}{10}a (\text{円})$$

この値段で b 個売れたので、売上は、

$$\frac{9}{10}a \times b = \frac{9}{10}ab (\text{円})$$

これが 4500 円以上であったので、

$$\frac{9}{10}ab \geq 4500$$

別解 割合を $1-0.1=0.9$ として、 $0.9ab \geq 4500$ としてもよい。

- 3 (2) 切り取ったひもの長さは、 $y \times 6 = 6y(m)$
 ひもが余ったので、切り取った長さはひもの長さより短い。

よって、 $x>6y$

- (3) 1 個 ag のかんづめ 10 個の重さは、 $10ag$
 これに 350g の箱の重さをたすので、全体の重さは、 $10a+350(g)$ これが bg と等しいので、 $10a+350=b$

- (4) 1 個 80g のみかん x 個の重さは、 $80xg$
 1 個 yg のりんご z 個の重さは、 yzg
 これらの重さの合計が 900g 以下なので、 $80x+yz \leq 900$

- (6) 定価は、(原価) $\times(1+\text{利益率})$ で求められるので、

$$x \times \left(1 + \frac{20}{100}\right) = \frac{6}{5}x (\text{円})$$

これが y 円と等しいので、

$$\frac{6}{5}x = y \quad [1.2x = y]$$

- 4 (1) 左辺の $180b$ は、1m あたり 180 円のリボン b m の代金を表している。それと 720 が等しいから、この式が表していることは、「1m あたり 180 円のリボン b m の代金は 720 円である。」となる。
- (2) 左辺の $120a$ は、1m あたり 120 円のリボン a m の代金で、 $180b$ は(1)と同じ代金を表している。

したがって、左辺は2種類のリボンの代金の合計で、これが右辺の1000円より高いから、この式が表していることは、「1mあたり120円のリボン am と1mあたり180円のリボン bm の代金の合計は1000円より高い。」となる。

- 5 (1) 左辺の $200x$ は、1本200mL入りのジュース x 本の量を表している。 $250y$ は、1本250mL入りのジュース y 本の量を表している。よって、左辺は2種類のジュースの量の差を表している。これが右辺の40mLと等しくなっている。
- (2) 左辺は(1)と同じように考えて、1本200mL入りのジュース x 本の量と1本250mL入りのジュース y 本の量の和を表している。これが右辺の1000mL未満であることを表している。
- 6 (1) 左辺は上底の長さ acm と下底の長さ bcm の和を表している。これが高さ ccm より長いことを表している。
- (2) (台形の面積) $=\{(上底)+(下底)\} \times (高さ) \div 2$ より、左辺は、上底 acm 、下底 bcm 、高さ ccm の台形の面積を表している。これが $25cm^2$ 以下であることを表している。

p.62~p.65

- 1 (1) ㉞ 時間 ㉟ 速さ
(2) ㉡ $\frac{x}{100}$ [0.01 x] ㉢ $\frac{y}{10}$ [0.1 y]
(3) ㉠ 項
(4) ㉣ 積 ㉥ 係数
(5) ㉦ 等式 ㉧ 不等式
- 2 (1) $-14bc$ (2) $-5x(y-1)$
(3) ab^2 (4) $-y^3$
(5) $-\frac{7}{a}$ (6) $11y - \frac{x+8}{3}$
(7) $\frac{byz}{ax}$ (8) $-\frac{a-b}{x}$
(9) $b(x+y) - cx$
- 3 (1) $\frac{ah}{2}(cm^2)$ $\left[\frac{1}{2}ah(cm^2)\right]$
(2) $3(x+y)(円)$
(3) $\frac{97}{100}x(g)$ [0.97 $x(g)$]
- 4 (1) -27 (2) 19
(3) $-\frac{7}{2}$ [-3.5] (4) $\frac{9}{4}$ [2.25]
(5) 36 (6) -144
- 5 (1) 9 (2) -27 (3) -38
(4) -26 (5) -18 (6) $\frac{41}{3}$
- 6 (1) 項 $\cdots -7c$ c の係数 $\cdots -7$
(2) 項 $\cdots -5, 6x, -2y$
 x の係数 $\cdots 6, y$ の係数 $\cdots -2$
(3) 項 $\cdots -\frac{2}{9}b, 4$ b の係数 $\cdots -\frac{2}{9}$
(4) 項 $\cdots \frac{a}{11}, \frac{3}{7}, -c$
 a の係数 $\cdots \frac{1}{11}, c$ の係数 $\cdots -1$
- 7 イ, ウ, エ
- 8 (1) $4x$ (2) $-2y+9$
(3) $a+1$ (4) $x+1$
(5) $-3a+3$ (6) $3a+1$
- 9 (1) $-\frac{7}{2}a-4$ (2) $\frac{13}{4}x-2$
(3) $-a-2$
- 10 (1) 和 $\cdots 7x+2$ 差 $\cdots -x-16$
(2) 和 $\cdots 6y-14$ 差 $\cdots 4y-2$
(3) 和 $\cdots 17x-5$ 差 $\cdots 5x-1$
(4) 和 $\cdots \frac{5}{6}x - \frac{7}{12}$ 差 $\cdots \frac{1}{6}x - \frac{1}{12}$
- 11 (1) $15a$ (2) $6x$ (3) $-50b$

12 (1) $6x+9$ (2) $-6c+24$

(3) $-\frac{3}{25}x-3$ (4) $10x-60$

(5) $20x-4$ (6) $-12b+6$

13 (1) $-2x-7$ (2) $16a-43$

(3) $7b-24$ (4) $a+12$

(5) $-a+3$ (6) $3x$

14 (1) $xy > 0$

(2) $a-bc=2$ [$a=bc+2$ など]

(3) $\frac{a}{b}+\frac{a}{4}<2$

15 (1) 例 鉛筆1本と消しゴム1個の値段の差が20円である。(鉛筆1本の値段のほうが、消しゴム1個の値段より20円高い。)

(2) 例 鉛筆3本と消しゴム2個の代金の合計は450円より安い。

解 説

3 (1) 三角形の面積は $\frac{1}{2} \times (\text{底辺}) \times (\text{高さ})$ なので、

$$\frac{1}{2} \times a \times h = \frac{ah}{2} (\text{cm}^2)$$

4 $a=-6$ をそれぞれ代入して計算する。

(1) $4a-3=4 \times (-6)-3=-24-3=-27$

(2) $-3a+1=-3 \times (-6)+1=18+1=19$

(3) $\frac{21}{a}=\frac{21}{-6}=-\frac{7}{2}$ $[-3.5]$

(4) $-\frac{3}{8}a=-\frac{3}{8} \times (-6)=\frac{9}{4}$ $[2.25]$

(5) $(-a)^2=\{ -(-6) \}^2=6^2=36$

(6) $-(2a)^2=-\{ 2 \times (-6) \}^2=-(-12)^2=-144$

5 $x=-2$, $y=7$ をそれぞれ代入して計算する。

(1) $-x+y=-(-2)+7=9$

(2) $3x-3y=3 \times (-2)-3 \times 7$
 $=-6-21$
 $=-27$

(3) $5x-4y=5 \times (-2)-4 \times 7$
 $=-10-28$
 $=-38$

(4) $2xy-x=2 \times (-2) \times 7 - (-2)$
 $=-28+2$
 $=-26$

(5) $-3y-\frac{3}{2}x=-3 \times 7-\frac{3}{2} \times (-2)$
 $=-21+3$
 $=-18$

(6) $\frac{1}{6}x+2y=\frac{1}{6} \times (-2)+2 \times 7$
 $=-\frac{1}{3}+14$

$$=-\frac{1}{3}+\frac{42}{3}$$

$$=\frac{41}{3}$$

6 (4) $\frac{a}{11}+\frac{3}{7}-c=\frac{a}{11}+\frac{3}{7}+(-c)$
 $=\frac{1}{11} \times a+\frac{3}{7}+(-1) \times c$

なので、項は $\frac{a}{11}$, $\frac{3}{7}$, $-c$

a の係数は $\frac{1}{11}$, c の係数は -1

7 文字が1つだけの項を1次の項、1次の項だけの式、または、1次の項と数の項の和で表される式を一次式という。

A の $-3xy$ は文字が2つあるので、一次式ではない。

8 (4) $3x-(2x-1)=3x-2x+1=x+1$

(5) $-a+2+(-2a+1)=-a+2-2a+1$
 $=-a-2a+2+1$
 $=-3a+3$

(6) $(4a+2)-(a+1)=4a+2-a-1$
 $=4a-a+2-1$
 $=3a+1$

9 (1) $-\frac{3}{2}a+4-2a-8=-\frac{3}{2}a-2a+4-8$
 $=\left(-\frac{3}{2}a-\frac{4}{2}a\right)+(4-8)$
 $=-\frac{7}{2}a-4$

(2) $\frac{5}{2}x-\frac{17}{3}+\frac{3}{4}x+\frac{11}{3}=\frac{5}{2}x+\frac{3}{4}x-\frac{17}{3}+\frac{11}{3}$
 $=\left(\frac{10}{4}x+\frac{3}{4}x\right)+\left(-\frac{17}{3}+\frac{11}{3}\right)$
 $=\frac{13}{4}x-2$

(3) $-0.2a+3-(0.8a+5)=-0.2a+3-0.8a-5$
 $=-0.2a-0.8a+3-5$
 $=-a-2$

10 (1) 和 $(3x-7)+(4x+9)=3x-7+4x+9$
 $=3x+4x-7+9$
 $=7x+2$

差 $(3x-7)-(4x+9)=3x-7-4x-9$
 $=3x-4x-7-9$
 $=-x-16$

(2) 和 $(5y-8)+(-6+y)=5y-8-6+y$
 $=5y+y-8-6$
 $=6y-14$

差 $(5y-8)-(-6+y)=5y-8+6-y$
 $=5y-y-8+6$
 $=4y-2$

$$(3) \text{ 和 } (11x-3)+(-2+6x)=11x-3-2+6x \\ =17x-5$$

$$\text{差 } (11x-3)-(-2+6x)=11x-3+2-6x \\ =5x-1$$

$$(4) \text{ 和 } \left(\frac{x}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{x}{3}-\frac{1}{4}\right)$$

$$=\frac{x}{2}-\frac{1}{3}+\frac{x}{3}-\frac{1}{4}$$

$$=\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$$

$$=\left(\frac{3}{6}+\frac{2}{6}\right)x+\left(-\frac{4}{12}-\frac{3}{12}\right)$$

$$=\frac{5}{6}x-\frac{7}{12}$$

$$\text{差 } \left(\frac{x}{2}-\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{x}{3}-\frac{1}{4}\right)$$

$$=\frac{x}{2}-\frac{1}{3}-\frac{x}{3}+\frac{1}{4}$$

$$=\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$$

$$=\left(\frac{3}{6}-\frac{2}{6}\right)x+\left(-\frac{4}{12}+\frac{3}{12}\right)$$

$$=\frac{1}{6}x-\frac{1}{12}$$

$$\boxed{11} (3) -40b \div \frac{4}{5} = -40b \times \frac{5}{4} = -50b$$

$$\boxed{12} (1) \frac{3}{4}(8x+12) = \frac{3}{4} \times 8x + \frac{3}{4} \times 12 \\ = 6x+9$$

$$(2) -\frac{3}{7}(14c-56) = -\frac{3}{7} \times 14c - \frac{3}{7} \times (-56) \\ = -6c+24$$

$$(3) \left(-\frac{3}{5}x-15\right) \div 5 = \left(-\frac{3}{5}x-15\right) \times \frac{1}{5} \\ = -\frac{3}{5}x \times \frac{1}{5} - 15 \times \frac{1}{5} \\ = -\frac{3}{25}x-3$$

$$(4) (8x-48) \div \frac{4}{5} = (8x-48) \times \frac{5}{4} \\ = 8x \times \frac{5}{4} - 48 \times \frac{5}{4} \\ = 10x-60$$

$$(6) -90 \times \frac{2b-1}{15} = -6 \times (2b-1) = -12b+6$$

$$\boxed{13} (1) 3(x-2)-(5x+1) = 3x-6-5x-1 \\ = 3x-5x-6-1 \\ = -2x-7$$

$$(2) 2(3a-4)+5(2a-7) = 6a-8+10a-35 \\ = 6a+10a-8-35 \\ = 16a-43$$

$$(3) 4(4b-3)-3(3b+4) = 16b-12-9b-12$$

$$= 16b-9b-12-12 \\ = 7b-24$$

$$(4) -5(a-3)+\frac{1}{3}(18a-9) \\ = -5 \times a - 5 \times (-3) + \frac{1}{3} \times 18a + \frac{1}{3} \times (-9) \\ = -5a+15+6a-3 \\ = a+12$$

$$(5) \frac{1}{3}(12a-15)-\frac{1}{4}(20a-32) \\ = \frac{1}{3} \times 12a + \frac{1}{3} \times (-15) - \frac{1}{4} \times 20a - \frac{1}{4} \times (-32) \\ = 4a-5-5a+8 \\ = -a+3$$

$$\boxed{14} (3) \text{ 行きにかかった時間は, } \frac{a}{b} \text{ 時間}$$

$$\text{帰りにかかった時間は, } \frac{a}{4} \text{ 時間}$$

$$\text{したがって, } \frac{a}{b} + \frac{a}{4} < 2$$

$$\boxed{15} (2) \text{ 左辺の } 3a \text{ は鉛筆 } 3 \text{ 本の代金, } 2b \text{ は消しゴム } 2 \\ \text{ 個の代金を表し, この代金の合計が } 450 \text{ 円より安い} \\ \text{ ことを表している。}$$

p.66~p.67

1 (1) $\frac{4}{5}mn$ (円) [0.8mn(円)]

(2) $\frac{a+b+c}{3}$ (cm)


2 (1) 秒速 344m

(2) 1059m

3 $-19a+13$

4 (1) $-16x-6$

(2) $\frac{5}{2}x + \frac{3}{2} \left[\frac{5x+3}{2} \right]$



5 (1) $2x+2(x-2)$ (個)

(2) $4(x-1)$ (個)

(3) 例 1 辺に x 個で、4 辺あるから $4x$ 個。
影をつけた 4 すみの 4 個が重複している
ので、これをひいて、 $4x-4$ (個)

6 (1) 49 個

(2) $11x+5$ (個)

(3) 115 個

7 はじめに思いうかべた整数を x とする。

$$(4x-6) \div 2 + 3 - x = (2x-3) + 3 - x$$

$$= 2x-3+3-x = x$$

したがって、計算の結果はかならずはじめに決めた整数になる。

解説

1 (1) 定価の 2 割引きは、 $1 - \frac{2}{10} = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

よって、代金は $m \times \frac{4}{5} \times n = \frac{4}{5}mn$ (円)

2 (1) 式 $332+0.6t$ の t に 20 を代入すると、
 $332+0.6 \times 20 = 332+12 = 344$ (m/s)

(2) 気温が 35°C のときの音速は、
 $332+0.6 \times 35 = 332+21 = 353$ (m/s)
このとき、3 秒間に音が進む距離は、
 $353 \times 3 = 1059$ (m)

よって、雷が発生した場所までは 1059m

3 ある式を $\square$ とおくと、 $\square + (14a-6) = 9a+1$

$\square$ を求めるには、 $9a+1$ から $14a-6$ をひく。

$$(9a+1) - (14a-6) = 9a+1-14a+6$$

$$= -5a+7$$

したがって、正しい答えは、

$$\square - (14a-6) = (-5a+7) - (14a-6)$$

$$= -5a+7-14a+6$$

$$= -19a+13$$

4 与えられた式を簡単にしてから、 $A = 4x+2$ 、

$B = -3x-1$ を代入して求める。

(1) $2A+B-3(A-B) = 2A+B-3A+3B$

$$= -A+4B$$

$$-A+4B = -(4x+2)+4(-3x-1)$$

$$= -4x-2-12x-4$$

$$= -16x-6$$

(2) $-(A-B) + \frac{1}{2}(4A-B) = -A+B+2A-\frac{1}{2}B$

$$= A + \frac{1}{2}B$$

$$A + \frac{1}{2}B = (4x+2) + \frac{1}{2}(-3x-1)$$

$$= 4x+2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$$

$$= 4x - \frac{3}{2}x + 2 - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{5}{2}x + \frac{3}{2}$$

5 (1) 横の 2 辺には x 個ずつ、縦の 2 辺には $x-2$ (個) ずつ並んでいる。よって、

$$x \times 2 + (x-2) \times 2 = 2x+2(x-2)$$
(個)


と考えたことがわかる。

(2) B さんの考え方は、図 3 より、1 辺に $x-1$ (個) で、それが 4 辺あるから、全部で $(x-1) \times 4$ 個になる。よって、式を整理すると、 $4(x-1)$ (個)

(3) 重複することを考えて式を立て、最後に重複した分をひくという考え方で立式している。

6 (1) 右の図のように区

切る。11 個のくりかえしが 4 個でき、はじめの 5 個をたす。



$$11 \times 4 + 5 = 49$$
(個)

(2) $11 \times x + 5 = 11x+5$ (個)

(3) $11 \times 10 + 5 = 115$ (個)

7 先生の話から、次の順で計算すればよいことがわかる。

① 決めた整数を x などの文字で表す。

② 先生が述べた順で計算する。先生が述べたことを順にまとめると、

㊦ 決めた整数を 4 倍する $\rightarrow 4 \times x$

㊧ ㊦の答えから 6 をひく $\rightarrow 4 \times x - 6$

㊨ ㊧の答えを 2 でわる $\rightarrow (4 \times x - 6) \div 2$

㊩ ㊨の答えに 3 をたす $\rightarrow (4 \times x - 6) \div 2 + 3$

㊪ ㊩の答えからはじめに決めた整数をひく

$$\rightarrow (4 \times x - 6) \div 2 + 3 - x$$

③ 計算結果は、最初に決めた整数 x になるので、りんさんの予想が正しいことが説明できる。

p.68~p.69

- 1** (1) abc (2) $x^2y^2z^2$
 (3) $\frac{(a+2)(7-y)}{4-x}$
- 2** (1) $(-1) \times x \times x \times x \times y$ (2) $2 \times x \times x + 3 \times y$
 (3) $z \div (x+y)$ (4) $2 \times x - a \times b \times b \div 3$
- 3** (1) $7x - 80y$ (円)
 (2) $\frac{a+b+c+d}{4}$ (点)
 (3) $100a + 10b + c$ (4) $\frac{60a}{b}$ (km/h)
- 4** 数量…残りのジュースの量 単位…mL
- 5** (1) $\frac{9}{10}x$ (人) [$0.9x$ (人)]
 (2) $\left(1 + \frac{a}{100}\right)x$ (人)
- 6** (1) 数量…この直方体の体積 単位… cm^3
 (2) 数量…この直方体のすべての辺の長さの和 単位…cm
- 7** (1) -5 (2) 6 (3) 9
 (4) -1

解説

- 1** (3) $(7-y) \div (4-x) \times (a+2)$

$$= \frac{(7-y) \times (a+2)}{(4-x)}$$

$$= \frac{(a+2)(7-y)}{4-x}$$
- 2** (3) 分数の形からわり算にすると、 $x+y$ 全体で z をわっていることがわかるように、かっこをつける。

$$\frac{z}{x+y} = z \div (x+y)$$

↑ かっこをつける。

- 3** (2) **別解** $(a+b+c+d) \div 4 = (a+b+c+d) \times \frac{1}{4}$

$$= \frac{1}{4}(a+b+c+d) \text{ (点)}$$

としてもよい。

- (3) 例えば、 $365 = 300 + 60 + 5$

$$= 100 \times 3 + 10 \times 6 + 1 \times 5 \text{ となる。}$$

 この場合、3 が百の位、6 が十の位、5 が一の位の
 数であるから、 a, b, c を使って 3 けたの整数を表
 すと、 $100a + 10b + c$ となる。

- (4) b 分 $= \frac{b}{60}$ 時間だから、

$$a \div \frac{b}{60} = \frac{60a}{b} \text{ (km/h)}$$

- 5** (1) (今年の生徒数) = (去年の生徒数) $\times$ (1 - 減った割合)
 だから、 $x \times \left(1 - \frac{1}{10}\right) = x \times \frac{9}{10} = \frac{9}{10}x$ (人)

別解 $x \times (1 - 0.1) = x \times 0.9 = 0.9x$ (人)

- (2) (今年の生徒数) = (去年の生徒数) $\times$ (1 + 増えた割合)
 だから、 $x \times \left(1 + \frac{a}{100}\right) = \left(1 + \frac{a}{100}\right)x$ (人)

- 6** (1) $a^2b = a \times a \times b$ だから、(縦) $\times$ (高さ) $\times$ (横) にそ
 れぞれの値が対応しており、体積を表している。
 (2) $4(2a+b) = 8a+4b$ すなわち、 a が 8 つで b が 4
 つであるものを考える。図より、 a cm の辺が 8 本、
 b cm の辺が 4 本あるので、この数量 $4(2a+b)$ は、
 この直方体のすべての辺の長さの和を表している。

- 7** (2) $a = -6$ を代入すると、

$$-\frac{36}{a} = -\frac{36}{-6} = 6$$
- (3) $x = 5, y = -\frac{2}{3}$ を代入すると、

$$3x + 9y = 3 \times 5 + 9 \times \left(-\frac{2}{3}\right) = 15 - 6 = 9$$
- (4) $a = -4, b = 6$ を代入すると、

$$-\frac{5}{2}a - 3b + 7 = -\frac{5}{2} \times (-4) - 3 \times 6 + 7$$

$$= 10 - 18 + 7$$

$$= -1$$

p.70~p.71

- 1** (1) $7x-2$ (2) $-\frac{7}{2}a-4$
 (3) $\frac{13}{4}x-2$ (4) $0.4y-1$
 (5) $-y+11$ (6) $1.1a-1.4$
 (7) $-4a+3$ (8) $-x+6$
- 2** (1) $-30a$ (2) $-6x$
 (3) $-8x+10$ (4) $-5x+8$
 (5) $-3a+9$ (6) $-4x-1$
 (7) $-5x+15$ (8) $-\frac{1}{6}x \left[-\frac{x}{6} \right]$
- 3** (1) $xy < 0$ (2) $\frac{b(a-15)}{100} = 15$
 (3) $\frac{17x+23y}{40} = z$ (4) $ab+c=45$
- 4** 例 家から駅を通り、学校へ行くまでにかかる時間は1時間以下である。
- 5** (1) $7x-3$ (2) 102
- 6** (1) 19本 (2) $3n+1$ (本)

解説

- 1** (2) $-5a-6+\frac{3}{2}a+2=-5a+\frac{3}{2}a-6+2$
 $=\left(-\frac{10}{2}+\frac{3}{2}\right)a+(-6+2)$
 $=-\frac{7}{2}a-4$
- (3) $\frac{x}{4}+(3x-2)=\frac{x}{4}+3x-2$
 $=\left(\frac{1}{4}+\frac{12}{4}\right)x-2$
 $=\frac{13}{4}x-2$
- (4) $0.5y-(0.1y+1)=0.5y-0.1y-1$
 $=0.4y-1$
- (6) $(0.1a-0.6)-(0.8-a)=0.1a-0.6-0.8+a$
 $=0.1a+a-0.6-0.8$
 $=1.1a-1.4$
- (8) 縦に計算をする。
 $4x-5x=-x$
 $-3-(-9)=6$
 よって、 $-x+6$
- 2** (4) $\left(\frac{x}{2}-\frac{4}{5}\right)\div\left(-\frac{1}{10}\right)=\left(\frac{x}{2}-\frac{4}{5}\right)\times(-10)$
 $=-5x+8$
- (5) $\frac{2a-6}{3}\times\left(-\frac{9}{2}\right)=(2a-6)\times\left(-\frac{3}{2}\right)=-3a+9$

$$(7) \frac{2}{7}(14x-21)-\frac{3}{4}(12x-28)=4x-6-9x+21$$


$$=-5x+15$$

$$(8) \frac{3x-4}{2}-\frac{5x-6}{3}=\frac{3}{2}x-2-\left(\frac{5}{3}x-2\right)$$

$$=\frac{3}{2}x-2-\frac{5}{3}x+2$$

$$=\left(\frac{9}{6}-\frac{10}{6}\right)x=-\frac{1}{6}x$$

3 (2)



昨年の生徒数は、 $a-15$ (人)

昨年の生徒数の $b\%$ が 15 人なので、

$$(a-15)\times\frac{b}{100}=15$$

整理すると、 $\frac{b(a-15)}{100}=15$ となる。

(3) 野球部の身長合計は、 $x\times 17=17x$ (cm)

サッカー部の身長合計は、 $y\times 23=23y$ (cm)

野球部とサッカー部全員の身長の平均は、身長合計を人数でわればよいので、

$$\frac{17x+23y}{17+23}=z \quad \text{すなわち、} \quad \frac{17x+23y}{40}=z$$

4 左辺の $\frac{a}{5}$ は家から駅までにかかった時間、 $\frac{b}{4}$ は駅から学校までにかかった時間を表す。不等号と右辺で、この合計が1時間以下であることを表している。

5 (1) 2 番目の数は、 $4+7=11$

3 番目の数は、 $4+7+7=18$
 2 個

4 番目の数は、 $4+7+7+7=25$
 3 個

5 番目の数は、 $4+7+7+7+7=32$
 4 個

このように考えていくと、 x 番目の数は 4 に 7 を $x-1$ (個) 加えたものになるので、

$$4+\underbrace{7+7+\cdots+7}_{x-1(\text{個})}=4+7\times(x-1)$$


$$=4+7x-7$$

$$=7x-3$$

(2) (1)で求めた式 $7x-3$ に $x=15$ を代入して、

$$7\times 15-3=102$$

6 右の図のように区切り、1 個のひし形で 3 本ずつ使い、はじめの 1 本をたす。



(1) $3\times 6+1=19$ (本)

(2) $3\times n+1=3n+1$ (本)

8 方程式とその解

p.72~p.73

- ① (1) ア 2 イ 3 ウ 4
 ㊦ 6 ㊧ 3 ㊨ 0
 ㊩ < ㊪ = ㊫ >

(2) -1

- ② (1) ウ (2) イ, エ

- ③ (1) $x = 15$ (2) $x = 3$ (3) $x = \frac{2}{3}$
 (4) $x = 6$ (5) $x = -6$ (6) $x = -2.1$
 (7) $x = 21$ (8) $x = -40$ (9) $x = 36$
 (10) $x = 5$ (11) $x = -4$ (12) $x = \frac{2}{3}$

解 説

- ① (1) ア $\cdots -2 + 4 = 2$ ㊦ $\cdots -3 \times (-2) = 6$
 イ $\cdots -1 + 4 = 3$ ㊧ $\cdots -3 \times (-1) = 3$
 ウ $\cdots 0 + 4 = 4$ ㊨ $\cdots -3 \times 0 = 0$

(2) x に -1 を代入したとき、左辺と右辺の値が等しくなるので、この方程式の解は -1

- ② (2) それぞれの方程式の x に -1 を代入して、左辺と右辺が等しくなるものを選ぶ。

ア $\cdots$ 左辺 $= 8 + (-1) = 7$

右辺 $= 9$

イ $\cdots$ 左辺 $= 3 \times (-1) - 4 = -7$

右辺 $= -7$

ウ $\cdots$ 左辺 $= 2 \times (-1) + 3 = 1$

右辺 $= -4 \times (-1) + 2 = 6$

エ $\cdots$ 左辺 $= 5 \times (-1) - 4 = -9$

右辺 $= -9$

よって、イとエの方程式の解が -1 になる。

- ③ (1) $x - 4 + 4 = 11 + 4$ $x = 15$
 (2) $x - 6 + 6 = -3 + 6$ $x = 3$
 (3) $x - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ $x = \frac{2}{3}$
 (4) $x + 7 - 7 = 13 - 7$ $x = 6$
 (5) $x + 2 - 2 = -4 - 2$ $x = -6$
 (6) $x + 2.1 - 2.1 = 0 - 2.1$ $x = -2.1$
 (7) $\frac{1}{3}x \times 3 = 7 \times 3$ $x = 21$

(8) $\frac{x}{5} \times 5 = -8 \times 5$ $x = -40$

(9) $-\frac{1}{4}x \times (-4) = -9 \times (-4)$ $x = 36$

(10) $7x \div 7 = 35 \div 7$ $x = 5$

別解 $7x \times \frac{1}{7} = 35 \times \frac{1}{7}$ でもよい。

(11) $-2x \div (-2) = 8 \div (-2)$ $x = -4$

別解 $-2x \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 8 \times \left(-\frac{1}{2}\right)$ でもよい。

(12) $-\frac{9}{2}x \div \left(-\frac{9}{2}\right) = -3 \div \left(-\frac{9}{2}\right)$ $x = \frac{2}{3}$

別解 $-\frac{9}{2}x \times \left(-\frac{2}{9}\right) = -3 \times \left(-\frac{2}{9}\right)$ でもよい。

p.74~p.75

確認問題

- ① (1) ア -10 イ -6 ウ -2
 ㊦ 2 ㊧ 0 ㊨ -2
 ㊩ < ㊪ < ㊫ =

(2) 1

- ② (1) 1 (2) -1
 (3) 3 (4) -2

- ③ イ, エ

- ④ ア, ウ, オ

- ⑤ (1) 両辺に 9 をたす
 (2) 両辺を 4 でわる
 (3) 両辺に $\frac{4}{5}$ をかける
 (4) 両辺に 10 をかける

⑥ (1) $x + 3 - 3 = 8 - 3$
 $x = 5$

(2) $4x \div 4 = 12 \div 4$

$x = 3$

⑦ (1) $x = -2$ (2) $x = -15$
 (3) $x = -36$ (4) $x = 160$

(5) $x = 3$ (6) $x = -\frac{1}{2}$ [-0.5]

⑧ (1) $x = -\frac{1}{3}$ (2) $x = 2.6$ (3) $x = 9.7$
 (4) $x = -12$ (5) $x = -20$ (6) $x = \frac{7}{3}$

解 説

- ① (1) ア $\cdots 4 \times (-1) - 6 = -10$
 イ $\cdots 4 \times 0 - 6 = -6$
 ウ $\cdots 4 \times 1 - 6 = -2$
 ㊦ $\cdots -2 \times (-1) = 2$
 ㊧ $\cdots -2 \times 0 = 0$
 ㊨ $\cdots -2 \times 1 = -2$

(2) x に 1 を代入したとき、左辺と右辺の値が等しくなるので、この方程式の解は 1

- ② それぞれの数を x に代入する。

- (1) $x = 0$ のとき、
 左辺 $= -2 \times 0 + 3 = 3$
 右辺 $= 5 \times 0 - 4 = -4$
 $x = 1$ のとき、

$$\text{左辺} = -2 \times 1 + 3 = 1$$

$$\text{右辺} = 5 \times 1 - 4 = 1$$

$x = 2$ のとき,

$$\text{左辺} = -2 \times 2 + 3 = -1$$

$$\text{右辺} = 5 \times 2 - 4 = 6$$

したがって、この方程式の解は、 $x = 1$ である。

(2) $x = -1$ のとき,

$$\text{左辺} = -15 - 12 \times (-1) = -3$$

$$\text{右辺} = 11 + 14 \times (-1) = -3$$

したがって、この方程式の解は、 $x = -1$ である。

(3) $x = 1$ のとき,

$$\text{右辺} = 5 \times 1 + 2 = 7$$

$x = 2$ のとき,

$$\text{右辺} = 5 \times 2 + 2 = 12$$

$x = 3$ のとき,

$$\text{右辺} = 5 \times 3 + 2 = 17$$

したがって、この方程式の解は、 $x = 3$ である。

(4) $x = -2$ のとき,

$$\text{左辺} = 3 \times (-2) + 8 = 2$$

$$\text{右辺} = -4 \times (-2) - 6 = 2$$

したがって、この方程式の解は、 $x = -2$ である。

3 それぞれの方程式の x に 4 を代入する。

ア 左辺 $= 4 \times 4 - 2 = 14$

イ 左辺 $= 3 \times 4 - 6 = 6$

ウ 左辺 $= 5 \times 4 - 5 = 15$

エ 左辺 $= -4 + 9 = 5$

右辺 $= 2 \times 4 - 3 = 5$

したがって、4 が解である方程式はイ、エである。

4 それぞれの方程式の x に -3 を代入する。

ア 左辺 $= 7 + (-3) = 4$

イ 左辺 $= -2 \times (-3) + 3 = 9$

ウ 左辺 $= 9 + 3 \times (-3) = 0$

エ 左辺 $= 4 \times (-3 - 4) = -28$

オ 左辺 $= -(-3) + 2 = 5$

右辺 $= -5 \times (-3) - 10 = 5$

したがって、 -3 が解である方程式はア、ウ、オである。

5 等式の性質を使って、方程式を $x = \bigcirc$ の形にする。

7 (1) $x - 3 + 3 = -5 + 3 \quad x = -2$

(2) $x + 9 - 9 = -6 - 9 \quad x = -15$

(3) $\frac{x}{9} \times 9 = -4 \times 9 \quad x = -36$

(4) $-\frac{5}{4}x \div \left(-\frac{5}{4}\right) = -200 \div \left(-\frac{5}{4}\right) \quad x = 160$

別解 $-\frac{5}{4}x \times \left(-\frac{4}{5}\right) = -200 \times \left(-\frac{4}{5}\right)$ でもよい。

(5) $-3x \div (-3) = -9 \div (-3) \quad x = 3$

別解 $-3x \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -9 \times \left(-\frac{1}{3}\right)$ でもよい。

(6) $-10x \div (-10) = 5 \div (-10) \quad x = -\frac{1}{2} \quad [-0.5]$

別解 $-10x \times \left(-\frac{1}{10}\right) = 5 \times \left(-\frac{1}{10}\right)$ でもよい。

8 (1) $\frac{2}{3} + x - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \quad x = -\frac{1}{3}$

(2) $-0.2 + x + 0.2 = 2.4 + 0.2 \quad x = 2.6$

(3) $4.1 - x - 4.1 = -5.6 - 4.1$

$$-x = -9.7$$

$$x = 9.7$$

(4) $-0.4x \div (-0.4) = 4.8 \div (-0.4)$

$$x = -12$$

(5) $\frac{x}{8} \div \frac{1}{8} = -\frac{5}{2} \div \frac{1}{8} \quad x = -20$

別解 $\frac{x}{8} \times 8 = -\frac{5}{2} \times 8$ でもよい。

(6) $-\frac{5}{6}x \div \left(-\frac{5}{6}\right) = -\frac{35}{18} \div \left(-\frac{5}{6}\right) \quad x = \frac{7}{3}$

別解 $-\frac{5}{6}x \times \left(-\frac{6}{5}\right) = -\frac{35}{18} \times \left(-\frac{6}{5}\right)$ でもよい。

9 方程式の解き方 / 比と比例式

p.76~p.79

- ① ㊦ 11 ㊩ -24 ㊫ 3
- ② (1) $x=2$ (2) $x=-9$ (3) $x=7$
 (4) $x=-1$ (5) $x=-6$ (6) $x=2$
 (7) $x=6$ (8) $x=-5$ (9) $x=9$
 (10) $x=-12$ (11) $x=-8$ (12) $x=-\frac{7}{2}$
- ③ (1) $x=1$ (2) $x=4$ (3) $x=5$
 (4) $x=-14$ (5) $x=5$ (6) $x=3$
 (7) $x=3$ (8) $x=1$ (9) $x=\frac{13}{12}$
 (10) $x=-6$ (11) $x=-1$ (12) $x=2$
- ④ (1) $x=5$ (2) $x=4$ (3) $x=\frac{11}{8}$
- ⑤ (1) $x=-3$ (2) $x=-18$ (3) $x=-2$
- ⑥ (1) $x=7$ (2) $x=10$ (3) $x=8$
- ⑦ (1) $\frac{4}{13}$ (2) $\frac{3}{7}$ (3) $\frac{3}{4}$
 (4) $\frac{1}{4}$ (5) 2 (6) 7
- ⑧ (1) $x=4$ (2) $x=21$ (3) $x=\frac{24}{5}$
 (4) $x=\frac{3}{10}$ (5) $x=8$

解説

- ② (2) $-2x+9=27$ (4) $13-8x=21$
 $-2x=27-9$ $-8x=21-13$
 $-2x=18$ $-8x=8$
 $x=-9$ $x=-1$
- (5) $-x=8x+54$ (6) $-9x-8=-13x$
 $-x-8x=54$ $-9x+13x=8$
 $-9x=54$ $4x=8$
 $x=-6$ $x=2$
- (7) $2x+5=6x-19$ (9) $12-x=57-6x$
 $2x-6x=-19-5$ $-x+6x=57-12$
 $-4x=-24$ $5x=45$
 $x=6$ $x=9$
- (11) $-6x-5=-61-13x$ (12) $4x+7=-2x-14$
 $-6x+13x=-61+5$ $4x+2x=-14-7$
 $7x=-56$ $6x=-21$
 $x=-8$ $x=-\frac{21}{6}$
 $=-\frac{7}{2}$

- ③ (4) $-6x+5(x-1)=9$ 分配法則でかっこをはずす
 $-6x+5x-5=9$ 移項する
 $-6x+5x=9+5$
 $-x=14$
 $x=-14$
- (5) $8-3(2x-5)=-7$ 分配法則で
 $8-6x+15=-7$ かっこをはずす
 $-6x=-7-15-8$ 移項する
 $-6x=-30$
 $x=5$
- (6) $-5(4x-7)+16=-3x$ 分配法則で
 $-20x+35+16=-3x$ かっこをはずす
 $-20x+3x=-35-16$ 移項する
 $-17x=-51$
 $x=3$
- (9) $4(5x-6)=7(8x-9)$ 分配法則でかっこをはずす
 $20x-24=56x-63$ 移項する
 $20x-56x=-63+24$
 $-36x=-39$
 $x=\frac{13}{12}$
- ④ (1) $\frac{x}{6}-\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$ 2と3と6の
 $x-2=3$ 最小公倍数6を
 $x=5$ 両辺にかける
- (2) $-\frac{1}{8}x-\frac{2}{3}=\frac{1}{6}-\frac{1}{3}x$ 3と6と8の
 $(-\frac{1}{8}x-\frac{2}{3})\times 24=(\frac{1}{6}-\frac{1}{3}x)\times 24$ 最小公倍数24を
 $-3x-16=4-8x$ 両辺にかける
 $5x=20$
 $x=4$
- (3) $\frac{2x+1}{5}=\frac{4x-1}{6}$ 5と6の
 $(\frac{2x+1}{5})\times 30=(\frac{4x-1}{6})\times 30$ 最小公倍数30を
 $12x+6=20x-5$ 両辺にかける
 $-8x=-11$
 $x=\frac{11}{8}$
- ⑤ (1) $3.2x=2.8x-1.2$ 両辺に10をかける
 $3.2x\times 10=(2.8x-1.2)\times 10$
 $32x=28x-12$
 $4x=-12$
 $x=-3$
- (2) $-0.3x+4=-0.8x-5$ 両辺に10をかける
 $-3x+40=-8x-50$
 $-3x+8x=-50-40$
 $5x=-90$
 $x=-18$

$$\begin{aligned} (3) \quad & 1.1 - 0.47x = 0.04 - x \\ & 110 - 47x = 4 - 100x \quad \text{両辺に 100 をかける} \\ & -47x + 100x = 4 - 110 \\ & 53x = -106 \\ & x = -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{6} (1) \quad & 10x = 70(x-6) \\ & 10x \div 10 = 70(x-6) \div 10 \quad \text{両辺を 10 でわる} \\ & x = 7(x-6) \\ & x = 7x - 42 \\ & -6x = -42 \\ & x = 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & 120(x+7) = 340(x-4) \\ & 120(x+7) \div 20 = 340(x-4) \div 20 \quad \begin{array}{l} \text{両辺を} \\ 120 \text{ と } 340 \text{ の} \\ \text{最大公約数 } 20 \\ \text{でわる} \end{array} \\ & 6(x+7) = 17(x-4) \\ & 6x + 42 = 17x - 68 \\ & -11x = -110 \\ & x = 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{8} (2) \quad & x : 6 = 7 : 2 \quad (3) \quad 6 : 5 = x : 4 \\ & 2x = 42 \quad 5x = 24 \\ & x = 21 \quad x = \frac{24}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad & 6 : 4 = x : \frac{1}{5} \quad (5) \quad x : (x-2) = 4 : 3 \\ & 4x = \frac{6}{5} \quad 3x = 4(x-2) \\ & x = \frac{6}{5} \times \frac{1}{4} \quad 3x = 4x - 8 \\ & x = \frac{3}{10} \quad 3x - 4x = -8 \\ & \quad \quad \quad -x = -8 \\ & \quad \quad \quad x = 8 \end{aligned}$$

p.80~p.81

確認問題

$$\begin{aligned} \text{1} (1) \quad & x = 4 \quad (2) \quad x = -3 \quad (3) \quad x = 5 \\ (4) \quad & x = 1 \quad (5) \quad x = 2 \quad (6) \quad x = 4 \\ (7) \quad & x = 2 \quad (8) \quad x = -2 \quad (9) \quad x = -\frac{15}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2} (1) \quad & x = -4 \quad (2) \quad x = 7 \quad (3) \quad x = 2 \\ (4) \quad & x = -16 \quad (5) \quad x = -1 \quad (6) \quad x = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{3} (1) \quad & x = 4 \quad (2) \quad x = 24 \quad (3) \quad x = 3 \\ (4) \quad & x = \frac{7}{2} \quad (5) \quad x = \frac{16}{17} \quad (6) \quad x = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{4} (1) \quad & x = -6 \quad (2) \quad x = 1 \quad (3) \quad x = -7 \\ (4) \quad & x = 10 \quad (5) \quad x = -9 \quad (6) \quad x = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{5} (1) \quad & \frac{7}{2} \quad (2) \quad \frac{1}{6} \quad (3) \quad \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{6} (1) \quad & x = 8 \quad (2) \quad x = 18 \quad (3) \quad x = 5 \\ (4) \quad & x = \frac{1}{2} \quad (5) \quad x = 2 \quad (6) \quad x = 3 \end{aligned}$$

解説

$$\begin{aligned} \text{1} (1) \quad & x + 7 = 11 \quad (2) \quad -3x - 15 = 2x \\ & x = 11 - 7 \quad -3x - 2x = 15 \\ & x = 4 \quad -5x = 15 \\ & \quad \quad \quad x = -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & 4x - 3 = 2x + 7 \quad (4) \quad 6x - 4 = 7x - 5 \\ & 4x - 2x = 7 + 3 \quad 6x - 7x = -5 + 4 \\ & 2x = 10 \quad -x = -1 \\ & x = 5 \quad x = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad & 10x - 13 = -6x + 19 \quad (6) \quad -7x - 3 = -5x - 11 \\ & 10x + 6x = 19 + 13 \quad -7x + 5x = -11 + 3 \\ & 16x = 32 \quad -2x = -8 \\ & x = 2 \quad x = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \quad & 13x - 6 = 10 + 5x \quad (8) \quad 2 - 8x = 5x + 28 \\ & 13x - 5x = 10 + 6 \quad -8x - 5x = 28 - 2 \\ & 8x = 16 \quad -13x = 26 \\ & x = 2 \quad x = -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (9) \quad & 2x + 16 = 9x + 31 \\ & 2x - 9x = 31 - 16 \\ & -7x = 15 \\ & x = -\frac{15}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2} (1) \quad & 5x - 8 = 4(x-3) \\ & 5x - 8 = 4x - 12 \\ & x = -4 \\ (4) \quad & -4(2x+5) = 6(2-x) \\ & -8x - 20 = 12 - 6x \\ & -2x = 32 \\ & x = -16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad & 3(x-1) - 2(2x-5) = 8 \\ & 3x - 3 - 4x + 10 = 8 \\ & -x + 7 = 8 \\ & -x = 1 \\ & x = -1 \\ (6) \quad & -8(x-2) + 3(3x-8) = -8 \\ & -8x + 16 + 9x - 24 = -8 \\ & x - 8 = -8 \\ & x = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{3} (2) \quad & \frac{1}{8}x + 3 = \frac{1}{2}x - 6 \quad \text{両辺に 8 をかける} \\ & x + 24 = 4x - 48 \\ & x - 4x = -48 - 24 \\ & -3x = -72 \\ & x = 24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad & \frac{2x+1}{7} = \frac{3-x}{5} \quad \text{両辺に 35 をかける} \\ & 5(2x+1) = 7(3-x) \\ & 10x + 5 = 21 - 7x \\ & 10x + 7x = 21 - 5 \end{aligned}$$

$$17x = 16$$

$$x = \frac{16}{17}$$

4 (2) $1.6x + 0.8 = 5x - 2.6$ 両辺に 10 をかける

$$16x + 8 = 50x - 26$$

$$16x - 50x = -26 - 8$$

$$-34x = -34$$

$$x = 1$$

(3) $1.2x + 0.5 = 0.95x - 1.25$ 両辺に 100 をかける

$$120x + 50 = 95x - 125$$

$$120x - 95x = -125 - 50$$

$$25x = -175$$

$$x = -7$$

(4) $\frac{x}{100} + 0.9 = \frac{x}{10}$ 両辺に 100 をかける

$$x + 90 = 10x$$

$$-9x = -90$$

$$x = 10$$

(6) $270x = 450(x-1) - 630$ 両辺を 90 でわる

$$3x = 5(x-1) - 7$$

$$3x = 5x - 5 - 7$$

$$-2x = -12$$

$$x = 6$$

6 (3) $6 : x = 9 : \frac{15}{2}$ (4) $x : \frac{1}{3} = 7 : \frac{14}{3}$

$$9x = 6 \times \frac{15}{2}$$

$$9x = 45$$

$$x = 5$$

$$\frac{14}{3}x = \frac{7}{3}$$

$$x = \frac{7}{3} \times \frac{3}{14}$$

$$x = \frac{1}{2}$$

(5) $(10-x) : 6 = 4 : 3$ (6) $3 : 2x = 4 : (x+5)$

$$3(10-x) = 24$$

$$30 - 3x = 24$$

$$-3x = 24 - 30$$

$$-3x = -6$$

$$x = 2$$

$$3(x+5) = 8x$$

$$3x + 15 = 8x$$

$$3x - 8x = -15$$

$$-5x = -15$$

$$x = 3$$

10 方程式の利用

p.82~p.85

1 (1) $4x + 70$ (円)

(2) $1000 - (4x + 70) = 490$

(3) 110 円

2 120 円

3 60 円

4 (1) $3x + 51$ (個), $5x - 15$ (個)

(2) 子ども…33 人, あめ…150 個

5 子ども…15 人, りんご…35 個

6 長いす…19 脚, 生徒…92 人

7 (1) $50(4+x) = 90x$ (2) 5 分後

(3) 9 時 9 分

8 (1) 8 時間後 (2) できない。

9 (1) $8 : 120 = x : 210$ (2) 14g

10 (1) $391 - x$ (枚)

(2) $x : (391 - x) = 8 : 9$

(3) 184 枚

11 (1) $(80+x) : (140+x) = 2 : 3$

(2) 40mL

解説

1 (1) ノート 4 冊と 70 円の鉛筆 1 本の代金は,
 $4x + 70$ (円)

(2) 1000 円出したときのおつりを表す式は,
 $1000 - (4x + 70)$ …①

①の式が 490 円になるから,

$$1000 - (4x + 70) = 490$$

(3) (2)の方程式を解くと, $x = 110$

これを①の式に代入すると,

$$1000 - (4 \times 110 + 70) = 1000 - 510 = 490$$

よって, この解は問題にあっている。

2 みかん 1 個の値段を x 円とする。

みかん 6 個と 200 円のなし 1 個の代金は,

$$6x + 200$$
(円) …①

みかん 1 個と 110 円のレモン 1 個の代金は,

$$x + 110$$
(円) …②

①が②の 4 倍に等しいので,

$$6x + 200 = 4(x + 110) \quad x = 120$$


$x = 120$ を①, ②に代入すると,

$$\text{①} \cdots 6 \times 120 + 200 = 920$$

$$\text{②} \cdots 120 + 110 = 230$$

$230 \times 4 = 920$ より, ①が②の 4 倍になっているので,
この解は問題にあっている。

- 5 子どもの人数を x 人として、りんごの個数を 2 通りの式で表す。



1 人に 2 個ずつ分けるとき、 $2x+5$ (個) …①

1 人に 3 個ずつ分けるとき、 $3x-10$ (個) …②

①と②は等しいので、

$$2x+5=3x-10 \quad x=15$$

$x=15$ を①、②に代入すると、

$$\text{①} \cdots 2 \times 15 + 5 = 35 \quad \text{②} \cdots 3 \times 15 - 10 = 35$$

よって、りんごの数は 35 個であり、①と②が等しいので、この解は問題にあっている。

- 6 長いすの数を x 脚として、生徒の人数を、 x を使って 2 通りの式で表して方程式をつくる。

長いす 1 脚に 4 人ずつすわると 16 人がすわれないので、生徒の人数は、 $4x+16$ (人) …①

「5 人ずつすわると 2 人だけすわった長いすが 1 脚できる」というのは、3 席分余ることだから、生徒数は、(座席数) -3 となり、 $5x-3$ (人) …②

①と②は等しいので、

$$4x+16=5x-3 \quad x=19$$

$x=19$ を①、②に代入すると、

$$\text{①} \cdots 4 \times 19 + 16 = 92 \quad \text{②} \cdots 5 \times 19 - 3 = 92$$

よって、この解は問題にあっている。

別解 ②の式は、 $(x-1)$ 脚に 5 人ずつすわり、最後の 1 脚に 2 人すわると考えて、 $5 \times (x-1) + 2$ (人) としてもよい。

- 8 (1) 自動車が出発して x 時間後にバイクに追いつくとすると、自動車とバイクの進んだ道のりが等しいことから、 $40(5+x)=65x \quad x=8$

このとき、バイクが進んだ道のりは、

$$40(5+8)=520 \quad \text{より、} 520\text{km}$$

A 地点と B 地点の道のりは 600km なので、B 地点に着くまでに追いついている。

よって、この解は問題にあっている。

- (2) (1)より、自動車がバイクに追いつくのは、A 地点から 520km のところである。

A 地点と B 地点の道のりが 400km である場合、バイクが B 地点に着いたとき、自動車はまだバイクに追いついていない。

よって、自動車はバイクに追いつくことができない。

- 11 (1) コーヒーと牛乳を x mL ずつ増やしたとすると、
増やした後のコーヒーの量は、 $80+x$ (mL) …①
増やした後の牛乳の量は、 $140+x$ (mL) …②

①と②は 2 : 3 なので、 $(80+x) : (140+x) = 2 : 3$

- (2) (1)の比例式を解くと、 $x=40$

$x=40$ を①、②に代入すると、

$$\text{①} \cdots 80 + 40 = 120 \quad \text{②} \cdots 140 + 40 = 180$$

$120 : 180 = 2 : 3$ より、この解は問題にあっている。

p.86~p.87

確認問題

- | | | |
|---|-----------------------|---------------|
| 1 | (1) 110 円 | (2) 360 円 |
| 2 | (1) $17-x$ (個) | |
| | (2) りんご…11 個、なし…6 個 | |
| 3 | (1) 生徒…15 人、みかん…81 個 | |
| | (2) 子ども…13 人、鉛筆…120 本 | |
| 4 | (1) 8 分後 | (2) 10 時 28 分 |
| | (3) 4km | |
| 5 | (1) 4000 円 | (2) 800 円 |

解説

- 1 (1) ノート 1 冊の値段を x 円とする。1000 円で、ノート 4 冊と 240 円の下じきを買うと、おつりが 320 円なので、 $1000-(4x+240)=320 \quad x=110$

$x=110$ を左辺に代入すると、

$$1000-(4 \times 110 + 240) = 1000 - 680 = 320$$

よって、この解は問題にあっている。

- (2) 三角定規の値段を x 円とする。

A さんの残りの所持金は、 $900-x$ (円) …①

B さんの残りの所持金は、 $540-x$ (円) …②

①が②の 3 倍に等しいので、

$$900-x=3(540-x) \quad x=360$$

$x=360$ を①、②に代入すると、

$$\text{①} \cdots 900 - 360 = 540 \quad \text{②} \cdots 540 - 360 = 180$$

$180 \times 3 = 540$ より、①が②の 3 倍になっているので、この解は問題にあっている。

- 3 (1) 生徒の人数を x 人として、みかんの個数を 2 通りの式で表す。

1 人に 5 個ずつ配るとき、 $5x+6$ (個) …①

1 人に 6 個ずつ配るとき、 $6x-9$ (個) …②

①と②は等しいので、 $5x+6=6x-9 \quad x=15$

$x=15$ を①、②に代入すると、

$$\text{①} \cdots 5 \times 15 + 6 = 81 \quad \text{②} \cdots 6 \times 15 - 9 = 81$$

よって、みかんの数は 81 個であり、①と②が等しいので、この解は問題にあっている。

- (2) 子どもの人数を x 人とする、

$$9x+3=10x-10 \quad x=13$$

$x = 13$ を左辺と右辺に代入すると、

$$\text{左辺} = 9 \times 13 + 3 = 120$$

$$\text{右辺} = 10 \times 13 - 10 = 120$$

よって、この解は問題にあっている。

- 4 (1) 母が出発してから x 分後に追いつくとなると、
母と弟が進んだ道のりが等しいことから、

$$40(18+x) = 130x \quad x = 8$$

よって、8 分後に追いつく。

- (2) 兄が出発してから x 分後に追いつくとなると、
兄と祖父が進んだ道のりが等しいことから、

$$30(22+x) = 140x \quad x = 6$$

このとき、兄が走った道のりは、

$$140 \times 6 = 840 \text{ より、} 840 \text{ m}$$

家と駅との道のりは 1km なので、祖父が駅に着く前に追いつくことができる。

よって、兄が家を出発した 10 時 22 分の 6 分後である 10 時 28 分に、兄は祖父に追いつく。

- (3) ふもとから峠までの道のりを x km とすると、ふもとから峠まで往復するのに、上りは毎時 3km、下りは毎時 6km の速さで歩き、合計で 2 時間かかったから、 $\frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 2 \quad x = 4$

$$x = 4 \text{ を左辺に代入すると、} \frac{4}{3} + \frac{4}{6} = \frac{6}{3} = 2$$

よって、この解は問題にあっている。

- 5 (1) 兄の所持金を x 円とすると、2 人あわせて 7200 円持っているから、弟の所持金は、

$$7200 - x (\text{円}) \quad \cdots \textcircled{1}$$

兄の所持金と弟の所持金の比は 5 : 4 なので、

$$x : (7200 - x) = 5 : 4 \quad x = 4000$$

$x = 4000$ を①に代入すると、 $7200 - 4000 = 3200$

$4000 : 3200 = 5 : 4$ より、この解は問題にあっている。

- (2) 兄が弟にあげた金額を x 円とすると、兄が弟に x 円あげたあとのそれぞれの所持金は、

$$\text{兄が、} 5000 - x (\text{円}) \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{弟が、} 2200 + x (\text{円}) \quad \cdots \textcircled{2}$$

① : ②が 7 : 5 になるので、

$$(5000 - x) : (2200 + x) = 7 : 5 \quad x = 800$$

$x = 800$ を①、②に代入すると、

$$\textcircled{1} \cdots 5000 - 800 = 4200 \quad \textcircled{2} \cdots 2200 + 800 = 3000$$

$4200 : 3000 = 7 : 5$ より、この解は問題にあっている。

p.88~p.91

- 1 (1) 解 (2) 移項 (3) 比の値
(4) 比例式 (5) $ad = bc$

2 -2

- 3 (1) $x = -9$ (2) $x = -31$ (3) $x = -65$
(4) $x = -140$ (5) $x = 3$ (6) $x = -\frac{1}{13}$

- 4 (1) $x = -4$ (2) $x = 16$ (3) $x = 5$
(4) $x = 3$ (5) $x = 6$ (6) $x = 8$

- 5 (1) $x = 2$ (2) $x = 4$ (3) $x = -4$
(4) $x = -4$ (5) $x = -2$ (6) $x = -5$
(7) $x = 3$ (8) $x = \frac{71}{5}$ (9) $x = -\frac{3}{4}$

- 6 (1) $x = 2$ (2) $x = -2$ (3) $x = -7$
(4) $x = -12$ (5) $x = -15$ (6) $x = 7$
(7) $x = -9$ (8) $x = 4$ (9) $x = 9$

- 7 (1) $x = 4$ (2) $x = -1$ (3) $x = -3$
(4) $x = 3$ (5) $x = -8$ (6) $x = -4$
(7) $x = -9$ (8) $x = 11$ (9) $x = -5$

- 8 (1) $\frac{4}{9}$ (2) $\frac{1}{4}$ (3) 6
(4) 42 (5) $\frac{4}{3}$ (6) $\frac{27}{20}$

- 9 (1) $x = 10$ (2) $x = \frac{40}{3}$ (3) $x = 6$
(4) $x = 9$ (5) $x = \frac{5}{4}$ (6) $x = 52$

- 10 (1) 400 円
(2) 生徒...9 人 色紙...97 枚
(3) 追いつけない。
(4) 13km
(5) 5 個

解 説

3 (4) $-\frac{9}{2}x = 630$

$$-\frac{9}{2}x \times \left(-\frac{2}{9}\right) = 630 \times \left(-\frac{2}{9}\right)$$

$$x = -140$$

(6) $-104x = 8$

$$-104x \div (-104) = 8 \div (-104)$$

$$x = -\frac{1}{13}$$

別解

$$-104x = 8$$

$$-104x \times \left(-\frac{1}{104}\right) = 8 \times \left(-\frac{1}{104}\right)$$

$$x = -\frac{1}{13}$$

$$\begin{aligned} \boxed{4} \quad (5) \quad & -7x+72=5x \\ & -7x-5x=-72 \\ & -12x=-72 \\ & x=6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \boxed{5} \quad (2) \quad & 8x-3=6x+5 \\ & 8x-6x=5+3 \\ & 2x=8 \\ & x=4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \quad & -14x+1=-17x+10 \\ & -14x+17x=10-1 \\ & 3x=9 \\ & x=3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (8) \quad & -26x+33=-21x-38 \\ & -26x+21x=-38-33 \\ & -5x=-71 \\ & x=\frac{71}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \boxed{6} \quad (2) \quad & 8(1-3x)=-9x+38 \\ & 8-24x=-9x+38 \\ & -24x+9x=38-8 \\ & -15x=30 \\ & x=-2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & 3(x-9)-1=7x \\ & 3x-27-1=7x \\ & 3x-7x=27+1 \\ & -4x=28 \\ & x=-7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad & \frac{2}{3}x-7=\frac{3}{5}x-8 \quad \rightarrow \text{両辺に 15 をかける} \\ & 10x-105=9x-120 \\ & 10x-9x=-120+105 \\ & x=-15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \quad & \frac{1}{4}(3x+1)=x-\frac{3}{2} \quad \rightarrow \text{両辺に 4 をかける} \\ & 3x+1=4x-6 \\ & 3x-4x=-6-1 \\ & -x=-7 \\ & x=7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (8) \quad & x-\frac{4x-1}{5}=1 \quad \rightarrow \text{両辺に 5 をかける} \\ & 5x-(4x-1)=5 \\ & 5x-4x+1=5 \\ & x=5-1 \\ & x=4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (9) \quad & \frac{4x-9}{3}=\frac{6x+9}{7} \quad \rightarrow \text{両辺に 21 をかける} \\ & 7(4x-9)=3(6x+9) \\ & 28x-63=18x+27 \\ & 28x-18x=27+63 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10x &= 90 \\ x &= 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \boxed{7} \quad (2) \quad & 3.6x-1.6=0.8+6x \quad \rightarrow \text{両辺に 10 をかける} \\ & 36x-16=8+60x \\ & 36x-60x=8+16 \\ & -24x=24 \\ & x=-1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & 3.5x+1.5=x-6 \quad \rightarrow \text{両辺に 10 をかける} \\ & 35x+15=10x-60 \\ & 35x-10x=-60-15 \\ & 25x=-75 \\ & x=-3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad & 0.3(x-4)=0.7x+2 \quad \rightarrow \text{両辺に 10 をかける} \\ & 3(x-4)=7x+20 \\ & 3x-12=7x+20 \\ & 3x-7x=20+12 \\ & -4x=32 \\ & x=-8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (8) \quad & 210(x-1)=150(x+3) \quad \rightarrow \text{両辺を 30 でわる} \\ & 7(x-1)=5(x+3) \\ & 7x-7=5x+15 \\ & 7x-5x=15+7 \\ & 2x=22 \\ & x=11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \boxed{9} \quad (2) \quad & 4:x=3:10 & (3) \quad 7:(x+8)=3:x \\ & 3x=40 & 7x=3(x+8) \\ & x=\frac{40}{3} & 7x=3x+24 \\ & & 7x-3x=24 \\ & & 4x=24 \\ & & x=6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad & \frac{1}{3}:x=4:15 & (6) \quad x:5=13:\frac{5}{4} \\ & 4x=\frac{1}{3}\times 15 & \frac{5}{4}x=5\times 13 \\ & 4x=\frac{15}{3} & x=5\times 13\times \frac{4}{5} \\ & 4x=5 & x=13\times 4 \\ & x=\frac{5}{4} & x=52 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \boxed{10} \quad (1) \quad & \text{本 1 冊の値段を } x \text{ 円とする。} \\ & \text{兄の残金は、} 1400-2x \text{ (円)} \quad \cdots \textcircled{1} \\ & \text{弟の残金は、} 500-x \text{ (円)} \quad \cdots \textcircled{2} \\ & \textcircled{1} \text{ が } \textcircled{2} \text{ の 6 倍に等しいので、} \\ & 1400-2x=6(500-x) \quad x=400 \\ & x=400 \text{ を } \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ に代入すると、} \\ & \textcircled{1} \cdots 1400-800=600 \quad \textcircled{2} \cdots 500-400=100 \\ & 100\times 6=600 \text{ より、} \textcircled{1} \text{ が } \textcircled{2} \text{ の 6 倍になっているの} \\ & \text{で、この解は問題にあっている。} \end{aligned}$$

- (2) 生徒の人数を x 人として、色紙の枚数を 2 通りの式で表す。

$$1 \text{ 人に } 10 \text{ 枚ずつ配るとき, } 10x+7 \text{ (枚)} \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$1 \text{ 人に } 12 \text{ 枚ずつ配るとき, } 12x-11 \text{ (枚)} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ と $\textcircled{2}$ は等しいので, $10x+7=12x-11 \quad x=9$
 $x=9$ を $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ に代入すると,

$$\textcircled{1} \cdots 10 \times 9 + 7 = 97 \quad \textcircled{2} \cdots 12 \times 9 - 11 = 97$$

よって、色紙の枚数は 97 枚であり、 $\textcircled{1}$ と $\textcircled{2}$ が等しいので、この解は問題にあっている。

- (3) 兄が出発してから x 分後に追いつくとすると、兄と妹が進んだ道のりが等しいことから、

$$80(4+x) = 120x \quad x = 8$$

このとき、兄が走った道のりは、

$$120 \times 8 = 960 \text{ より, } 960\text{m}$$

家と公園との道のりは 800m なので、妹が公園に着く前に追いつくことができない。

- (4) A 地点から x km の地点で故障したとする。かかった時間の関係から、

$$\frac{x}{10} + \frac{14-x}{5} = \frac{3}{2} \quad x = 13$$

$x = 13$ を左辺に代入すると、

$$\frac{13}{10} + \frac{14-13}{5} = \frac{13}{10} + \frac{2}{10} = \frac{3}{2}$$

よって、A 地点から故障した地点までの道のり 13km は、問題にあっている。

- (5) A さんが B さんに渡したあめ玉の個数を x 個とする。渡したあとの、

$$A \text{ さんのあめ玉の個数は, } 75-x \text{ (個)} \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$B \text{ さんのあめ玉の個数は, } 100+x \text{ (個)} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1} : \textcircled{2}$ が 2 : 3 になるので、

$$(75-x) : (100+x) = 2 : 3 \quad x = 5$$

$x = 5$ を $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ に代入すると、

$$\textcircled{1} \cdots 75-5 = 70 \text{ (個)} \quad \textcircled{2} \cdots 100+5 = 105 \text{ (個)}$$

$70 : 105 = 2 : 3$ より、この解は問題にあっている。

差がつく! 活用問題

p.92~p.93

1 (1) $a = 21$ (2) $a = \frac{7}{3}$

- 2** **例** 1 個 80 円のオレンジと 1 個 100 円のりんごをあわせて 15 個買い、120 円のかごに入れてもらったところ、代金は 1500 円でした。オレンジは何個買いましたか。

3 $\frac{x-10}{4} = \frac{x+2}{6} + 3$

4 17 分後

5 50 分後

6 71

7 6 歳

8 16 人

9 (1) $\frac{5}{100}x\text{g}$ $[0.05x\text{g}]$,
 $\frac{4}{100}(x+80)\text{g}$ $[0.04(x+80)\text{g}]$

(2) 320g

10 5 秒後

解説

- 1** (1) $x = 11$ を $4x+5 = 6a-7x$ に代入すると、

$$4 \times 11 + 5 = 6a - 7 \times 11$$

$$44 + 5 = 6a - 77$$

$$-6a = -77 - 44 - 5$$

$$-6a = -126$$

$$a = 21$$

別解 x の項をまとめてから代入してもよい。

$$4x+5 = 6a-7x$$

$$6a-7x = 4x+5$$

$$6a = 11x+5$$

$$x = 11 \text{ を代入して, } 6a = 11 \times 11 + 5$$

$$6a = 126$$

$$a = 21$$

- (2) $x = -6$ を $2 - \frac{1}{3}x = 3a + \frac{1}{2}x$ に代入すると、

$$2 - \frac{1}{3} \times (-6) = 3a + \frac{1}{2} \times (-6)$$

$$2 + 2 = 3a - 3$$

$$-3a = -3 - 2 - 2$$

$$-3a = -7$$

$$a = \frac{7}{3}$$

- 3 長いす1脚に4人ずつすわる時、10人がすわれないので、長いすにすわった人の人数は $x-10$ (人) である。よって、長いすの数は、 $\frac{x-10}{4}$ 脚と表せる。

また、長いす1脚に6人ずつすわる時、集まった人の人数が x 人より2人多ければ、人がすわっている長いすすべてに6人ずつすわることができる。よって、長いすの数は、 $\frac{x+2}{6}+3$ (脚) と表せる。

どちらの場合も、長いすの数は変わらないので、

$$\frac{x-10}{4} = \frac{x+2}{6} + 3$$

- 4 x 分後に2人がはじめて出会ったとする。

	分速(m)	かかった時間(分)	進んだ道のり(m)
A	80	x	$80x$
B	60	x	$60x$

2人の進んだ道のりの和が2380mなので、

$$80x + 60x = 2380 \quad x = 17$$

$x = 17$ を左辺に代入すると、 $80 \times 17 + 60 \times 17 = 2380$

よって、この解は問題にあっている。

- 5 x 分後に姉が妹にはじめて追いつくとすると、2人の進んだ道のりの差が1kmなので、

$$75x - 55x = 1000 \quad x = 50$$

$x = 50$ を左辺に代入すると、 $75 \times 50 - 55 \times 50 = 1000$

よって、この解は問題にあっている。

- 6 真ん中の奇数を x とすると、連続する3つの奇数は、 $x-2$, x , $x+2$ と表せる。これらの和が207なので、

$$(x-2) + x + (x+2) = 207 \quad x = 69$$

$x = 69$ を左辺に代入すると、 $67 + 69 + 71 = 207$

よって、この解は問題にあっている。したがって、最大の奇数は71。

- 7 現在の子の年齢を x 歳とすると、父は $8x$ 歳と表せる。

8年後に父の年齢が子の年齢の4倍になるので、

$$8x + 8 = 4(x + 8) \quad x = 6$$

$x = 6$ を左辺に代入すると、 $8 \times 6 + 8 = 56$

8年後の子の年齢は、 $6 + 8 = 14$ (歳)

$56 \div 14 = 4$ より、8年後に父の年齢が子の年齢の4倍になっているので、この解は問題にあっている。

- 8 1組の人数を x 人とする。

(1組の点数の合計)+(2組の点数の合計)

= (1組と2組の全員の点数の合計) より、

$$65x + 70(40 - x) = 68 \times 40 \quad x = 16$$

$x = 16$ を代入すると、左辺 = $65 \times 16 + 70 \times 24 = 2720$

$$\text{右辺} = 68 \times 40 = 2720$$

よって、この解は問題にあっている。

- 9 (1) (食塩の量) = (食塩水の量) $\times$ $\frac{(\text{濃度})}{100}$ と表される。

濃度が5%の食塩水 x g にとけている食塩の量は、

$$x \times \frac{5}{100} = \frac{5}{100} x \text{ (g)}$$

濃度が4%の食塩水 $x+80$ (g) にとけている食塩の

$$\text{量は、} (x+80) \times \frac{4}{100} = \frac{4}{100} (x+80) \text{ (g)}$$

- (2) とけている食塩の量は変化せず同じなので、

$$\frac{5}{100} x = \frac{4}{100} (x+80)$$

両辺を100倍して方程式を解くと、 $x = 320$

$x = 320$ を左辺と右辺に代入すると、

$$\text{左辺} = \frac{5}{100} \times 320 = 16$$

$$\text{右辺} = \frac{4}{100} \times (320+80) = 16$$

よって、この解は問題にあっている。

- 10 点Pは、辺ADを頂点Aから頂点Dまで毎秒2cm

の速さで動くから、APの長さは $2 \times x = 2x$ (cm)

よって、PDの長さは $16 - 2x$ (cm)

三角形PBDの面積について、底辺をPDの長さ、高さをABの長さだと考えると、三角形PBDの面積は、

$$(16 - 2x) \times 8 \div 2 \text{ (cm}^2\text{)}$$

よって、 $(16 - 2x) \times 8 \div 2 = 24 \quad x = 5$

$x = 5$ を左辺に代入すると、 $(16 - 2 \times 5) \times 8 \div 2 = 24$

よって、この解は問題にあっている。

p.94~p.95

1 ア, イ, エ

2 例 $2x-1=3x+2$

3 ① イ, 7 [ア, -7] ② エ, 3 $\left[ウ, \frac{1}{3}\right]$

4 (1) $x=3$ (2) $x=27$ (3) $x=-16$

(4) $x=-9$ (5) $x=-16$ (6) $x=4$

5 (1) $x=2$ (2) $x=1$ (3) $x=3$

(4) $x=15$ (5) $x=2$ (6) $x=12$

(7) $x=-5$ (8) $x=4$ (9) $x=15$

(10) $x=-9$

6 (1) $\frac{8}{11}$ (2) ① $x=5$ ② $x=4$

7 (1) $a=-5$ (2) $a=1$

解説

1 ア 左辺 $\cdots 7-8=-1$, 右辺 $\cdots -1$
等しいので解である。

イ 左辺 $\cdots -\frac{7}{7}=-1$, 右辺 $\cdots -1$

等しいので解である。

ウ 左辺 $\cdots 7 \times 7 + 5 = 54$, 右辺 $\cdots -16$ 等しくない。

エ 左辺 $\cdots 3 \times 7 + 3 = 24$, 右辺 $\cdots 4 \times 7 - 4 = 24$
等しいので解である。

オ 左辺 $\cdots 4 \times 7 - 5 = 23$, 右辺 $\cdots -3 \times 7 + 2 = -19$
等しくない。

2 答えはいくつもある。 $x=-3$ を代入して成り立てば正解である。

3 ① $3x+7-7=-2-7$ より, 記号 $\cdots$ イ, $C=7$

② $3x \div 3 = -9 \div 3$ より, 記号 $\cdots$ エ, $C=3$

4 (4) $-\frac{2}{15}x \times \left(-\frac{15}{2}\right) = \frac{6}{5} \times \left(-\frac{15}{2}\right)$ $x=-9$

(6) $-13x \div (-13) = -52 \div (-13)$ $x=4$

5 (3) $9x-16=2x+5$

$$7x=21$$

$$x=3$$

(5) $3(x-2)-6(x+1)=-18$

$$3x-6-6x-6=-18$$

$$3x-6x=-18+6+6$$

$$-3x=-6$$

$$x=2$$

$$(6) \quad \frac{2}{3}x = \frac{x}{4} + 5$$

$$\frac{2}{3}x \times 12 = \left(\frac{x}{4} + 5\right) \times 12$$

$$8x = 3x + 60$$

$$8x - 3x = 60$$

$$5x = 60$$

$$x = 12$$

$$(7) \quad \frac{x-3}{2} = \frac{3x-1}{4}$$

$$\frac{x-3}{2} \times 4 = \frac{3x-1}{4} \times 4$$

$$2(x-3) = 3x-1$$

$$2x-6 = 3x-1$$

$$2x-3x = -1+6$$

$$-x = 5$$

$$x = -5$$

$$(8) \quad \frac{1}{3}(x+1) = \frac{5}{9}(2x-5)$$

$$\frac{1}{3}(x+1) \times 9 = \frac{5}{9}(2x-5) \times 9$$

両辺に9をかける

$$3(x+1) = 5(2x-5)$$

$$3x+3 = 10x-25$$

$$3x-10x = -25-3$$

$$-7x = -28$$

$$x = 4$$

$$(9) \quad 0.99x - 5.4 = 1.23x - 9$$

$$(0.99x - 5.4) \times 100 = (1.23x - 9) \times 100$$

両辺に100をかける

$$99x - 540 = 123x - 900$$

$$99x - 123x = -900 + 540$$

$$-24x = -360$$

$$x = 15$$

$$(10) \quad 70(x+3) = 30(x-5)$$

$$70(x+3) \div 10 = 30(x-5) \div 10$$

両辺を10でわる

$$7(x+3) = 3(x-5)$$

$$7x+21 = 3x-15$$

$$7x-3x = -15-21$$

$$4x = -36$$

$$x = -9$$

$$6 (2) \quad \textcircled{1} \quad x:8=15:24$$

$$24x=8 \times 15$$

$$24x=120$$

$$x=5$$

$$\textcircled{2} \quad 3:1=(x+5):(x-1)$$

$$3(x-1)=x+5$$

$$3x-3=x+5$$

$$3x-x=5+3$$

$$2x=8$$

$$x=4$$

$$7 (1) \quad x=2 \text{ を } 3x+4a=ax-4 \text{ に代入すると,}$$

$$6+4a=2a-4$$

$$2a=-10$$

$$a=-5$$

(2) $5x-1=4x+3$ を解くと, $x=4$

$x=4$ を $3x-5a=2x-1$ に代入すると,

$$3 \times 4 - 5a = 2 \times 4 - 1$$

$$12 - 5a = 8 - 1$$

$$-5a = 8 - 1 - 12$$

$$-5a = -5$$

$$a = 1$$

別解 x の項をまとめてから代入してもよい。

$$3x - 5a = 2x - 1$$

$$-5a = -x - 1$$

$x=4$ を代入して, $-5a = -4 - 1$

$$-5a = -5$$

$$a = 1$$

p.96~p.97

1 280 円

2 クリップ…82 個, 箱…6 箱

3 675m

4 **例** 1 本 150 円のペンを何本か買い, 2000 円出すとおつりが 200 円でした。ペンを何本買いましたか。

5 12 年後

6 320 人

7 6%…200g, 3%…100g

8 26

9 (1) $x:(x+12)=5:9$

(2) 赤玉…15 個, 白玉…27 個

10 24 枚

11 (1) 10 分後

(2) 45 分後

12 90 歳

解 説

1 ショートケーキ 1 個の値段を x 円とすると, 方程式 $10x+200=3(3x+160)$ が成り立つ。

これを解いて, $x=280$

$x=280$ を左辺と右辺に代入すると,

$$\text{左辺} = 10 \times 280 + 200 = 3000$$

$$\text{右辺} = 3 \times (3 \times 280 + 160) = 3000$$

よって, この解は問題にあっている。

2 箱の数を x 箱とする。

1 つの箱に 12 個ずつ入れると 10 個余るから, クリップの数は, $12x+10$ (個) …①

1 つの箱に 14 個ずつ入れると, 2 個たりないから, クリップの数は, $14x-2$ (個) …②

①と②が等しいから, $12x+10=14x-2$

これを解いて, $x=6$

$x=6$ を①と②に代入すると,

$$\text{①} \cdots 12 \times 6 + 10 = 82 \quad \text{②} \cdots 14 \times 6 - 2 = 82$$

よって, この解は問題にあっている。

3 A 公園と B 公園の間の道のりを x m とする。

行きにかかった時間は, $\frac{x}{50}$ 分

帰りにかかった時間は, $\frac{x}{90}$ 分

したがって, $\frac{x}{50} + \frac{x}{90} = 21$

これを解いて, $x=675$

$x=675$ を左辺に代入すると, $\frac{675}{50} + \frac{675}{90} = 21$

よって, この解は問題にあっている。

- 5** x 年後に父の年齢が A さんの年齢の 2 倍になるとすると、 x 年後の A さんの年齢は、 $(13+x)$ 歳 …①
 x 年後の父の年齢は、 $(38+x)$ 歳 …②

①の 2 倍が②になるから、 $2(13+x)=38+x$

これを解いて、 $x=12$

$x=12$ を①と②に代入すると、

$$\text{①} \cdots 13+12=25 \quad \text{②} \cdots 38+12=50$$

$25 \times 2 = 50$ より、この解は問題にあっている。

- 6** 自転車で通学している生徒数を x 人とする。

徒歩で通学している生徒数は、 $x \times \left(1 + \frac{1}{10}\right) = \frac{11}{10}x$ (人)

徒歩と自転車で通学している生徒数の和が 672 人なので、

$$x + \frac{11}{10}x = 672$$

これを解いて、 $x=320$

$x=320$ を左辺に代入すると、 $320 + \frac{11}{10} \times 320 = 672$

よって、この解は問題にあっている。

- 7** 6%の食塩水を x g とすると、

3%の食塩水は $300-x$ (g)

食塩の量について、次の方程式が成り立つ。

$$\frac{6}{100}x + \frac{3}{100}(300-x) = \frac{5}{100} \times 300$$

これを解いて、 $x=200$

左辺に $x=200$ を代入すると、 $12+3=15$

よって、この解は問題にあっている。

- 8** 求めるある数を x とすると、ある数の真上の数は $x-7$ 、ある数の右どなりの数は $x+1$ である。3 つの数の和が 72 だから、

$$x + (x-7) + (x+1) = 72 \quad x=26$$

左辺に $x=26$ を代入すると、

$$26 + (26-7) + (26+1) = 72$$

よって、右辺と同じ値になるので、この解は問題にあっている。

- 10** はじめに A さんが持っていたカードの枚数を $5x$ 枚とすると、はじめに B さんが持っていたカードの枚数は $3x$ 枚。A さんが B さんに 4 枚渡したので、

A さんは、 $5x-4$ (枚) …①

B さんは、 $3x+4$ (枚) …②

①：②が 9：7 になったので、

$$(5x-4) : (3x+4) = 9 : 7$$

これを解いて、 $x=8$

$x=8$ を①と②に代入すると、

$$\text{①} \cdots 5 \times 8 - 4 = 36$$

$$\text{②} \cdots 3 \times 8 + 4 = 28$$

①：② = $36 : 28 = 9 : 7$ より、この解は問題にあっている。

このとき、はじめに B さんが持っていたカードの枚数は、 $3 \times 8 = 24$ (枚)

- 11** (1) 2 人がはじめて出会うまでにかかる時間を x 分とする。反対方向に走るの、2 人の走った道のりの和が 1800m だから、次の方程式が成り立つ。

$$110x + 70x = 1800$$

これを解いて、 $x=10$

兄は 1100m、弟は 700m 走ったところなので、この解は問題にあっている。

- (2) はじめて追いつくまでにかかる時間を y 分とする。

同じ方向に走るの、2 人の走った道のりの差が 1800m だから、次の方程式が成り立つ。

$$110y - 70y = 1800$$

これを解いて、 $y=45$

兄は 4950m、弟は 3150m 走ったところなので、この解は問題にあっている。

- 12** A さんが x 歳まで生きたとすると、

$$\frac{1}{9}x + \frac{1}{10}x + \frac{1}{5}x + \frac{2}{15}x + 11 + \frac{1}{3}x = x$$

これを解いて、 $x=90$

$x=90$ を左辺に代入すると、


$$10 + 9 + 18 + 12 + 11 + 30 = 90$$

この解は問題にあっている。

11 関数 / 比例


p.98~p.103

- ① (1) いえる。 (2) いえない。
 (3) いえる。 (4) いえない。
 (5) いえる。
- ② (1) $-1 \leq x \leq 4$ (2) $7 < x < 12$
 (3) $x < \frac{3}{2}$
- ③ (1) 式 $\cdots y = 30x$ 比例定数 $\cdots 30$
 (2) 式 $\cdots y = 4x$ 比例定数 $\cdots 4$
 (3) 式 $\cdots y = 21x$ 比例定数 $\cdots 21$
 (4) 式 $\cdots y = 3.5x$ $\left[y = \frac{7}{2}x \right]$
 比例定数 $\cdots 3.5$ $\left[\frac{7}{2} \right]$
- ④ (1) 式 $\cdots y = -4x$ 比例定数 $\cdots -4$
 (2) 式 $\cdots y = \frac{1}{3}x$ 比例定数 $\cdots \frac{1}{3}$
- ⑤ (1) $y = -2x$ (2) -2
 (3) $y = -14$ (4) $x = 4$
- ⑥ (1) 式 $\cdots y = -6x$ $x = -4$ のとき $\cdots y = 24$
 (2) 式 $\cdots y = \frac{15}{4}x$ $x = 16$ のとき $\cdots y = 60$
- ⑦ A(4, 5) B(-4, 1) C(-3, -4)
 D(3, -2) E(2, 0) F(0, 3)




- (2) ア 3 イ 2 ウ 5 エ 2


- ⑨ (1) 表の左から順に,
 $y = 4x \cdots -8, -4, 4, 8$
 $y = -4x \cdots 8, 4, -4, -8$



- ⑩ (1) $y = \frac{1}{2}x \cdots y = 2$ $y = -\frac{1}{2}x \cdots y = -2$



- ⑪ (1) $y = 1.25x \cdots y = 5$ $y = -1.25x \cdots y = -5$



- ⑫ (1) ウ (2) ア (3) イ


- ⑬ (1) $y = 3x$ (2) $y = -2x$ (3) $y = \frac{1}{2}x$

- ⑭ (1) $y = -3x$ (2) $y = \frac{3}{4}x$ (3) $y = -\frac{2}{5}x$

解説

- ① (1) $x \times 12 = y$ x の値を決めると、それに対応して y の値がただ1つに決まるので、関数といえる。
 (2) 身長 x cm を決めても体重の y kg は決まらないので、関数とはいえない。
 (3) $xy = 1000$ x の値を決めると、それに対応して y の値がただ1つに決まるので、関数といえる。
 (4) 底辺の長さがわからないので、面積 y が決まらないので、関数とはいえない。
 (5) 5cm のリボン x 本の長さは $5x$ cm だから、
 $120 - 5x = y$ x の値を決めると、それに対応して y の値がただ1つに決まるので、関数といえる。


- ② (1) $-1 \leq x \leq 4$



- (2) $7 < x < 12$



- (3) $x < \frac{3}{2}$



「～より小さい」と「～未満」は同じ意味である。

- ③ (1) (1個の値段) $\times$ (個数) = (代金) なので、 $30 \times x = y$ によって、 $y = 30x$ 比例定数は 30

- (2) 正方形には1辺が x cmの辺が4つあるので、
 $y = 4x$ 比例定数は4
- (3) まず、1Lあたりの走行距離を考える。
 30Lで630km走るの、
 1Lでは $630 \div 30 = 21$ (km)走る。
 x Lでは、 $21 \times x = 21x$ (km)
 よって、 $y = 21x$ 比例定数は21
- (4) 100gあたり350円なので、
 1gあたりは、 $350 \div 100 = 3.5$ (円)
 x gでは、 $3.5 \times x = 3.5x$ (円)
 よって、 $y = 3.5x$ 比例定数は3.5
- ④ $\frac{y}{x}$ の値が比例定数になる。
- ⑤ (1) 比例定数を a とすると、 $y = ax$
 $x = 15$ のとき、 $y = -30$ だから、
 $-30 = 15a$
 これを解くと、 $a = -2$ だから、 $y = -2x$
- (3) $y = -2x$ に $x = 7$ を代入して、
 $y = -2 \times 7 = -14$
- (4) $y = -2x$ に $y = -8$ を代入して、
 $-8 = -2x$ $x = 4$
- ⑥ (1) 比例定数を a とすると、 $y = ax$
 $x = 3$ のとき $y = -18$ だから、
 $-18 = a \times 3$
 これを解くと、 $a = -6$ だから、 $y = -6x$
 $x = -4$ のときの y の値は、 $y = -6 \times (-4) = 24$
- (2) 比例定数を a とすると、 $y = ax$
 $x = -4$ のとき $y = -15$ だから、
 $-15 = a \times (-4)$
 これを解くと、 $a = \frac{15}{4}$ だから、 $y = \frac{15}{4}x$
 $x = 16$ のときの y の値は、 $y = \frac{15}{4} \times 16 = 60$
- ⑦ 点Aの座標は、原点Oから右へ4、上へ5進んだ点だから、(4, 5)
 点Eの座標は、原点Oから右へ2進んだ点だから、(2, 0)
- ⑧ (1) C(-5, -2)は、原点Oから左へ5、下へ2進んだ点。
- ⑨ (2) $y = 4x$ …原点(0, 0)と点(2, 8)を直線で結んでかいてもよい。 $y = -4x$ …原点(0, 0)と点(2, -8)を直線で結んでかいてもよい。
- ⑩ (1) $y = \frac{1}{2}x$ に $x = 4$ を代入すると、 $y = \frac{1}{2} \times 4 = 2$
 $y = -\frac{1}{2}x$ に $x = 4$ を代入すると、 $y = -\frac{1}{2} \times 4 = -2$
- (2) (1)を利用してグラフをかく。
 $y = \frac{1}{2}x$ …原点(0, 0)と点(4, 2)を直線で結ぶ。

$$y = -\frac{1}{2}x \cdots \text{原点}(0, 0) \text{と点}(4, -2) \text{を直線で結ぶ。}$$

- ⑪ (1) $y = 1.25x$ に $x = 4$ を代入すると、 $y = 1.25 \times 4 = 5$
 $y = -1.25x$ に $x = 4$ を代入すると、 $y = -1.25 \times 4 = -5$
 (2) (1)を利用してグラフをかく。

$$y = 1.25x \cdots \text{原点}(0, 0) \text{と点}(4, 5) \text{を直線で結ぶ。}$$

$$y = -1.25x \cdots \text{原点}(0, 0) \text{と点}(4, -5) \text{を直線で結ぶ。}$$

- ⑫ (1) $y = \frac{1}{3}x$ の式は、 $x = 3$ のとき $y = 1$ を通る。
 (2) $y = -\frac{1}{5}x$ の式は、 $x = 5$ のとき $y = -1$ を通る。
 (3) $y = -5x$ の式は、 $x = 1$ のとき $y = -5$ を通る。

- ⑬ (1) グラフは点(1, 3)を通るから、

$$y = ax \text{ に}$$

$$x = 1, y = 3 \text{ を代入して、}$$

$$3 = a \times 1 \quad a = 3$$

$$\text{よって、} y = 3x$$

グラフは点(2, 6)や点(-1, -3)なども通るので、 $y = ax$ にこれらの値を代入しても a の値は同じ。

- (2) グラフは点(1, -2)を通るから、
 $y = ax$ に $x = 1, y = -2$ を代入して、
 $-2 = a \times 1 \quad a = -2$ よって、 $y = -2x$
- (3) グラフは点(2, 1)を通るから、
 $y = ax$ に $x = 2, y = 1$ を代入して、
 $1 = a \times 2 \quad a = \frac{1}{2}$ よって、 $y = \frac{1}{2}x$

- ⑭ (1) グラフは点(1, -3)を通るから、

$$y = ax \text{ に}$$

$$x = 1, y = -3 \text{ を代入して、}$$

$$-3 = a \times 1 \quad a = -3$$

$$\text{よって、} y = -3x$$

グラフは点(2, -6)や点(-1, 3)なども通るので、 $y = ax$ にこれらの値を代入しても a の値は同じ。

- (2) グラフは点(4, 3)を通るから、
 $y = ax$ に $x = 4, y = 3$ を代入して、
 $3 = a \times 4 \quad a = \frac{3}{4}$ よって、 $y = \frac{3}{4}x$
- (3) グラフは点(5, -2)を通るから、
 $y = ax$ に $x = 5, y = -2$ を代入して、
 $-2 = a \times 5 \quad a = -\frac{2}{5}$ よって、 $y = -\frac{2}{5}x$

p.104~p.105

▶ 確認問題

- ① (1) いえる。 (2) いえない。
 (3) いえる。
- ② (1) $2 \leq x \leq 9$ (2) $x < -4$
 (3) $-8 \leq x < 0$
- ③ (1) 式… $y = 270x$, 比例定数…270
 (2) 式… $y = -x + 160$, 比例定数…比例しない。
- ④ ア, 比例定数…-7 ウ, 比例定数… $-\frac{2}{3}$
 オ, 比例定数…50 カ, 比例定数…-2.4

5 (1) 式… $y = -3x$ $x = -3$ のとき… $y = 9$

(2) 式… $y = 7x$

$x = -3$ のとき… $y = -21$

6 (1) A(-3, 3)

B(4, -2)


C(-3, -5)

D(2, 4)


E(3, 0)

F(0, -5)

(2) 右の図



7 (1)~(4)



8 (1) イ (2) ウ (3) ア

9 (1) $y = -3x$ (2) $y = -\frac{1}{2}x$

(3) $y = \frac{5}{4}x$

解説

1 (1) 1日 = 24 時間なので、 $y = 24 - x$ で、 x の値を決めると y の値もただ 1 つに決まる。

したがって、 y は x の関数であるといえる。

(2) 例えば、周の長さが 10cm のとき、

(縦の長さ)+(横の長さ) = 5cm

縦と横の長さの和が 5cm になるのは、

(縦 1cm, 横 4cm), (縦 2cm, 横 3cm) など何通りもあり、それぞれの面積は異なる。

このように、周の長さ x だけでは、縦と横の長さが決まらず、面積 y が 1 つに決まらないので関数であるといえない。

(3) 代金の合計 y の式は、

$y = 75x + 150 \times 2 = 75x + 300$

鉛筆を 1 本, 2 本, 3 本と増やすと代金は, 375 円, 450 円, 525 円となり, x の値を決めると, それに対応して y の値がただ 1 つに決まる。


2 (1) $2 \leq x \leq 9$



(2) $x < -4$



(3) $-8 \leq x < 0$



4 イとエは、 $y = ax$ の形になっていないから比例の

式ではない。イとエは、 x の値が 2 倍, 3 倍, …になっても、 y の値は 2 倍, 3 倍, …とはならない。

5 (1) 比例定数を a とすると、 $y = ax$

$x = 4$ のとき $y = -12$ だから、 $-12 = a \times 4$

これを解くと、 $a = -3$ であるから、 $y = -3x$

$x = -3$ のときの y の値は、 $y = -3 \times (-3) = 9$

(2) 比例定数を a とすると、 $y = ax$

$x = -12$ のとき $y = -84$ だから、

$-84 = a \times (-12)$

これを解くと、 $a = 7$ であるから、 $y = 7x$

$x = -3$ のときの y の値は、 $y = 7 \times (-3) = -21$

y が x に比例しているときの比例定数 a の求め方

x の値が 1 のときの y の値が比例定数である。

比例定数 a は、 $(y \text{ の値}) \div (x \text{ の値})$ で求められる。

6 x 座標は原点から右へ進むと正の数, 左へ進むと負の数になり、 y 座標は原点から上へ進むと正の数, 下へ進むと負の数になる。

(1) 点 E は原点から右へ 3 進むので x 座標は 3, 上にも下にも進まないのだから y 座標は 0 となる。

点 F は原点から右にも左にも進まないのだから x 座標は 0, 下へ 5 進むので y 座標は -5 となる。

7 (1) グラフは原点と点 (1, -5) を通る直線である。

(2) グラフは原点と点 (1, 6) を通る直線である。

(3) $y = -\frac{5}{6}x$ に $x = 6$ を代入して、

$y = -\frac{5}{6} \times 6 = -5$

したがって、グラフは原点と点 (6, -5) を通る直線である。

(4) $y = 0.8x$ に $x = 5$ を代入して、 $y = 0.8 \times 5 = 4$

したがって、グラフは原点と点 (5, 4) を通る直線である。

8 (1) $y = -\frac{4}{5}x$ のグラフは、 $x = 5$ のとき $y = -4$ を通る。

(2) $y = -\frac{1}{4}x$ のグラフは、 $x = 4$ のとき $y = -1$ を通る。

(3) $y = -6x$ のグラフは、 $x = 1$ のとき $y = -6$ を通る。

9 (1) グラフは点 (1, -3) を通るから、

$y = ax$ に $x = 1$, $y = -3$ を代入して、

$-3 = a \times 1$ $a = -3$ よって、 $y = -3x$

(2) グラフは点 (2, -1) を通るから、

$y = ax$ に $x = 2$, $y = -1$ を代入して、

$-1 = a \times 2$ $a = -\frac{1}{2}$ よって、 $y = -\frac{1}{2}x$

(3) グラフは点 (4, 5) を通るから、

$y = ax$ に $x = 4$, $y = 5$ を代入して、

$5 = a \times 4$ $a = \frac{5}{4}$ よって、 $y = \frac{5}{4}x$

p.106~p.107

① (1) 式… $y = \frac{100}{x}$

反比例…いえる。


(2) 式… $y = 60x$

反比例…いえない。

② 式… $y = -\frac{12}{x}$ $x = 6$ のとき… $y = -2$

③ (1) $y = -\frac{24}{x}$ (2) $y = 3x$

- ④ (1) 表の左から順に,
1, 2, 4, -4, -2, -1
(2)



解説

① (1) $\frac{1}{2}xy = 50$ $xy = 100$ よって, $y = \frac{100}{x}$

y は x に反比例するといえる。

(2) (道のり) = (速さ) × (時間) より, $y = 60x$

これは比例の関係になるから, y は x に反比例するといえない。

② 比例定数を a とすると, $y = \frac{a}{x}$

$x = 3$ のとき $y = -4$ だから,

$-4 = \frac{a}{3}$ $a = -12$ よって, $y = -\frac{12}{x}$

$y = -\frac{12}{x}$ に $x = 6$ を代入して, $y = -\frac{12}{6} = -2$

- ③ (1) x の値が 2 倍, 3 倍, 4 倍, ……になると, y の値は $\frac{1}{2}$ 倍, $\frac{1}{3}$ 倍, $\frac{1}{4}$ 倍, ……になっているので,

反比例の式。比例定数を a とすると, $y = \frac{a}{x}$

$x = 1$ のとき $y = -24$ なので, x と y の関係を表す

式は, $y = -\frac{24}{x}$

④ (1) $y = -\frac{4}{x}$ に x の値をそれぞれ代入して計算する。

- (2) (1)で求めた表より, グラフが通る点をとって, それらの点をなめらかな曲線でつなぐ。

p.108~p.109

確認問題

① (1) 式… $y = \frac{80}{x}$

反比例…いえる。

(2) 式… $y = \frac{600}{x}$

反比例…いえる。

(3) 式… $y = 20x$

反比例…いえない。

(4) 式… $y = \frac{30}{x}$

反比例…いえる。

② (1) 式… $y = -\frac{18}{x}$

$x = -2$ のとき… $y = 9$

(2) 式… $y = \frac{36}{x}$

$y = -12$ のとき… $x = -3$

③ (1) $y = \frac{6}{x}$


(2) $y = -\frac{24}{x}$

④ (1) $y = -\frac{10}{x}$


(2) $y = \frac{18}{x}$

⑤

- (1) 表の左から順に,
-1, -2, -4,
4, 2, 1



- ⑥ (1), (2)



- (3) (1)…減少する。 (2)…増加する。

⑦ (1) $y = \frac{24}{x}$

(2) $y = -\frac{9}{x}$

解説

1 (1) $80 \div x = y$ より, $y = \frac{80}{x}$

式が, $y = \frac{a}{x}$ の形になるので, y は x に反比例するといえる。

(3) $x \times 20 = y$ より, $y = 20x$

これは比例の関係になるから, y は x に反比例するといえない。

(4) $30 = x \times y$ より, $y = \frac{30}{x}$

式が, $y = \frac{a}{x}$ の形になるので, y は x に反比例するといえる。

2 (1) y は x に反比例しているから, 式は, $y = \frac{a}{x}$

とおける。これに, $x = -6$, $y = 3$ を代入して,

$$3 = \frac{a}{-6} \quad a = -18 \quad \text{よって, } y = -\frac{18}{x}$$

$$y = -\frac{18}{x} \text{ に } x = -2 \text{ を代入して, } y = -\frac{18}{-2} = 9$$

3 (1) 比例定数を a とすると, $y = \frac{a}{x}$

この式に $x = 2$, $y = 3$ を代入して,

$$3 = \frac{a}{2} \quad a = 6 \quad \text{よって, } y = \frac{6}{x}$$

4 (1) 比例定数を a とすると, $y = \frac{a}{x}$

この式に $x = -10$, $y = 1$ を代入して,

$$1 = \frac{a}{-10} \quad a = -10 \quad \text{よって, } y = -\frac{10}{x}$$

5 (1) $y = \frac{4}{x}$ に x の値をそれぞれ代入して計算する。

(2) (1)で求めた表より, グラフが通る点をとって, それらの点をなめらかな曲線でつなぐ。

6 (1) 点(2, 6), (3, 4), (4, 3), (6, 2)を通るなめらかな曲線と, 点(-2, -6), (-3, -4), (-4, -3), (-6, -2)を通るなめらかな曲線の2つをかく。

(2) 点(1, -10), (2, -5), (5, -2), (10, -1)を通るなめらかな曲線と, 点(-1, 10), (-2, 5), (-5, 2), (-10, 1)を通るなめらかな曲線の2つをかく。

(3) (1)のグラフは, $x > 0$ の範囲で x の値が増加すると, y の値は減少している。

(2)のグラフは, $x > 0$ の範囲で x の値が増加すると, y の値も増加している。

13 比例, 反比例の利用

p.110~p.111

1 (1) $y = \frac{11}{10}x$ (2) 792g (3) 1200本

2 (1) 200m (2) 5分後

3 (1) 2分後 (2) 400m (3) 4分後

4 (1) $y = \frac{480}{x}$ (2) 20cm (3) 40g

解説

1 (1) クリップの重さ yg は, 本数 x 本に比例する。

$y = ax$ に $x = 30$, $y = 33$ を代入して,

$$33 = a \times 30 \quad a = \frac{11}{10} \quad \text{よって, } y = \frac{11}{10}x$$

(2) $y = \frac{11}{10}x$ に $x = 720$ を代入して,

$$y = \frac{11}{10} \times 720 = 792 \quad \text{よって, } 792g$$

(3) $y = \frac{11}{10}x$ に $y = 1320$ を代入して,

$$1320 = \frac{11}{10}x \quad x = 1200 \quad \text{よって, } 1200 \text{ 本}$$

2 (1) グラフより, A が駅に着くのは10分後。このとき, B はデパートから400mの地点にいたので, 駅までの距離は, $600 - 400 = 200(m)$

(2) グラフ上で y 座標の差が100になるところの x 座標は5

よって, 2人が100m離れるのは, 2人が出発してから5分後である。

3 (1) グラフ上で, y 座標の差が100になるところの x 座標は2

よって, 父と子が100m離れるのは2分後である。

(2) グラフより, 父が1200m離れた駅に着いたのは, 8分後である。

このとき, 子は家から800mの地点にいたので, 駅までの距離は, $1200 - 800 = 400(m)$

(3) グラフより, 父が駅に着くのは8分後, 子が駅に着くのは12分後である。

したがって, $12 - 8 = 4(\text{分後})$

4 (1) てんびんの支点からおもりまでの距離 ycm は, おもりの重さ xg に反比例する。

(おもりの重さ) $\times$ (支点からの距離) = (一定)

したがって, $xy = 32 \times 15 = 480$

$$\text{つまり, } y = \frac{480}{x}$$

(2) $y = \frac{480}{x}$ に $x = 24$ を代入して, $y = \frac{480}{24} = 20$

よって, 20cm

(3) $y = \frac{480}{x}$ に $y = 12$ を代入して、
 $12 = \frac{480}{x}$ $x = \frac{480}{12} = 40$ よって、40g

p.112~p.113

確認問題

- 1 225 本
 2 (1) $y = 24x$ (2) 360g (3) 20 本
 3 (1) $y = \frac{2}{3}x$ (2) $\frac{20}{3}$ cm (3) 18g
 4 24cm^2
 5 (1) 5 分後
 (2) 400m
 6 (1) $y = \frac{240}{x}$ (2) 8cm (3) 12cm

解説

- 1 くぎの重さ yg は本数 x 本に比例する。
 $y = ax$ に $x = 40$, $y = 64$ を代入して、
 $64 = a \times 40$ $a = \frac{64}{40} = \frac{8}{5}$ よって、 $y = \frac{8}{5}x$
 $y = 360$ を代入して、 $360 = \frac{8}{5}x$ $x = 225$
 よって、225 本
- 2 (1) 針金の重さ yg は、長さ $x\text{m}$ に比例する。
 $y = ax$ に $x = 4$, $y = 96$ を代入して、
 $96 = a \times 4$ $a = 96 \div 4 = 24$ よって、 $y = 24x$
 (2) $y = 24x$ に $x = 15$ を代入して、
 $y = 24 \times 15 = 360$ よって、360g
 (3) $y = 24x$ に $y = 495$ を代入して、
 $495 = 24x$ $x = 495 \div 24 = 20$ 余り 15
 したがって、20 本切り取れる。
- 3 (1) $y = ax$ に $x = 3$, $y = 2$ を代入して、
 $2 = a \times 3$ $a = \frac{2}{3}$ よって、 $y = \frac{2}{3}x$
 (2) $y = \frac{2}{3}x$ に $x = 10$ を代入して、 $y = \frac{2}{3} \times 10 = \frac{20}{3}$
 よって、 $\frac{20}{3}\text{cm}$
 (3) $y = \frac{2}{3}x$ に $y = 12$ を代入して、
 $12 = \frac{2}{3}x$ $x = 12 \times \frac{3}{2} = 18$ よって、18g
- 4 切り取った紙の面積を $x\text{cm}^2$ 、重さを yg とする。
 厚さが一定なので、 y は x に比例する。
 $y = ax$ の式に $x = 15$, $y = 3.5$ を代入して、
 $3.5 = a \times 15$ $a = \frac{3.5}{15} = \frac{7}{30}$ よって、 $y = \frac{7}{30}x$

$y = 5.6$ を代入して、 $5.6 = \frac{7}{30}x$ $x = 24$


よって、 24cm^2

別解 $15 : x = 3.5 : 5.6$

$15 \times 5.6 = 3.5x$

$x = \frac{15 \times 5.6}{3.5} = 24$

- 5 (1) グラフ上で、 y 座標の差が 200 になるところの x 座標は 5 である。



- (2) グラフから、A は 10 分後には駅から 400m の地点にいたことがわかる。
 B の 10 分後の位置は、グラフからはわからないが、B の速さは分速 80m であるから、 $y = 80x$ に $x = 10$ を代入して、 $y = 80 \times 10 = 800$
 よって、B は公園に着いていないから、2 人の距離は、 $800 - 400 = 400(\text{m})$
- 6 (1) てんびんの支点からおもりまでの距離 $y\text{cm}$ は、おもりの重さ $x\text{g}$ に反比例する。
 (おもりの重さ) $\times$ (支点からの距離) = (一定)
 したがって、 $xy = 40 \times 6 = 240$
 つまり、 $y = \frac{240}{x}$
 (2) $y = \frac{240}{x}$ に $x = 30$ を代入して、 $y = \frac{240}{30} = 8$
 よって、8cm
 (3) 重さ 40g のおもりを支点から 9cm のところにつり下げるので、 $xy = 40 \times 9 = 360$
 $y = \frac{360}{x}$ に $x = 30$ を代入して、 $y = \frac{360}{30} = 12$
 よって、12cm

p.114~p.115

- 1 (1) ㊦ 変数
 (2) ㊩ 変域
 (3) ㊵ 比例 ㊥ 比例定数
 (4) ㊱ x 軸 ㊦ y 軸
 ㊰ 座標軸 ㊧ 原点
 (5) ㊴ 座標 ㊨ x 座標
 ㊳ y 座標
 (6) ㊲ 反比例
 (7) ㊸ 双曲線


2 ア, イ

- 3 (1) $y = -7x$
 (2) 式… $y = 9x$ $x = 12$ のとき… $y = 108$

- 4 A(5, 1) B(-4, 4) C(-4, -5)
 D(2, -1) E(0, -4)

- 5 (1) $y = 4x$ (2) $y = -\frac{5}{4}x$


(3), (4)



- 6 (1) $y = -\frac{28}{x}$
 (2) 式… $y = -\frac{48}{x}$ $x = 12$ のとき $y = -4$

- 7 (1) $y = \frac{9}{x}$

(2)



- 8 (1) 300m (2) 4 分後

解 説

- 2 ア…(道のり)=(速さ)×(時間)より, $y = 5x$
 $x = 1$ のとき $y = 5$ となるように, x の値を決めると, それにともなって y の値もただ1つに決まるので, y は x の関数であるといえる。
 イ…(底辺)×(高さ)=(平行四辺形の面積)より,

 $xy = 20$ y は x の関数であるといえる。

ウ…周の長さ x を決めても, 底辺の長さと高さが1つには決まらず, 面積 y も1つには決まらない。
 したがって, y は x の関数であるといえない。

エ…出した金額がわからないので, ボールペン1本の値段 x 円を決めても, おつり y 円を1つに決めることができない。したがって, y は x の関数であるといえない。

- 3 y が x に比例するとき, x と y の関係は $y = ax$ で表される。この式に, x, y の値をそれぞれ代入すると, 比例定数 a が求められる。

(2) $x = -7, y = -63$ を代入して,
 $-63 = a \times (-7)$ $a = 9$ よって, $y = 9x$
 また, この式に, $x = 12$ を代入して,
 $y = 9 \times 12$ $y = 108$

- 4 y 軸上にある点の座標は, $(0, a)$ の形で表される。同様に, x 軸上にある点の座標は, $(b, 0)$ の形で表される。

よって, 点 E の座標は $(0, -4)$ となる。

- 5 (1) グラフは点 $(1, 4)$ を通るから,
 $y = ax$ に $x = 1, y = 4$ を代入して,
 $4 = a \times 1$ $a = 4$ よって $y = 4x$
 (2) グラフは点 $(4, -5)$ を通るから,
 $y = ax$ に $x = 4, y = -5$ を代入して,
 $-5 = a \times 4$ $a = -\frac{5}{4}$ よって $y = -\frac{5}{4}x$
 (3) グラフは原点と点 $(4, 1)$ を通る。
 (4) $y = -0.2x$ は $y = -\frac{1}{5}x$ だから, グラフは原点と $(5, -1)$ を通る。

- 6 反比例の式だから, 求める式は $y = \frac{a}{x}$ と表される。

次に, x, y の1組の値を代入して, 比例定数 a の値を求める。

- (2) $x = -8, y = 6$ より, $6 = \frac{a}{-8}$ $a = -48$

よって, $y = -\frac{48}{x}$

$y = -\frac{48}{x}$ に $x = 12$ を代入して, $y = -\frac{48}{12} = -4$

- 7 (1) 図より, グラフが通る点を読みとり, その点の座標を式 $y = \frac{a}{x}$ に代入して, 比例定数 a の値を求める。

グラフは, 点 $(1, 9)$ などを通るので, 例えば,
 $x = 1, y = 9$ を代入して,

$9 = \frac{a}{1}$ $a = 9$ よって, $y = \frac{9}{x}$

- (2) 点 $(2, -8), (4, -4), (8, -2)$ を通るなめらかな曲線と, 点 $(-2, 8), (-4, 4), (-8, 2)$ を通るなめ

らかな曲線の2つをかく。

- 8 (1) グラフより、兄が900m離れた図書館に着いたのは、12分後である。このとき、弟は家から600mの地点にいたので、図書館までの距離は、
 $900 - 600 = 300(\text{m})$
 (2) グラフより、兄が公園に着くのは8分後、弟が公園に着くのは12分後だから、弟が通過するのは、兄が公園を通過してから、 $12 - 8 = 4(\text{分後})$

差がつく! 活用問題

p.116~p.117

- 1 (1) $y = 540x$
 (2) 37L
 2 (1) $y = 12x$
 (2) x の変域 $\cdots 0 \leq x \leq 8$
 y の変域 $\cdots 0 \leq y \leq 96$
 (3) $36\text{cm}^2 \cdots 3$ 秒後 $54\text{cm}^2 \cdots \frac{9}{2}$ 秒後
 3 (1) 10 回転 (2) 15
 4 8 個
 5 ア, エ
 6 (1) $y = 2x$ (2) $y = \frac{8}{x}$
 (3) $(-2, -4)$
 7 (1) 6 個 (2) 2

解説

- 1 (1) 5Lの油の重さは4500gであり、4500gの油の値段は $60 \times (4500 \div 100) = 2700(\text{円})$ である。よって、油1Lの値段は、 $2700 \div 5 = 540(\text{円})$
 油 $x\text{L}$ の代金を y 円とするから、 $y = 540x$
 (2) $y = 540x$ に $y = 19980$ を代入して、 $19980 = 540x$
 $x = 37$


- 2 (1) 秒速2cmとは、
 1秒で2cm動くということなので、 x 秒では
 $2x\text{cm}$ 動く。

$$BC = 12\text{cm},$$

$$PC = 2x\text{cm} \text{ より,}$$

三角形BCPの面積は、

$$y = \frac{1}{2} \times 12 \times 2x = 12x$$



- (2) 16cm 動くのにかかる時間は、 $16 \div 2 = 8(\text{秒})$
 したがって、 x の変域は、 $0 \leq x \leq 8$
 また、 $x = 0$ のとき、点Pは点C上にあるから、
 $y = 0$

$$x = 8 \text{ のとき, } y = 12 \times 8 = 96$$

したがって、 y の変域は、 $0 \leq y \leq 96$

- (3) $y = 12x$ に $y = 36$ を代入して、
 $36 = 12x \quad x = 36 \div 12 = 3(\text{秒後})$
 $y = 12x$ に $y = 54$ を代入して、

$$54 = 12x \quad x = 54 \div 12 = \frac{9}{2}(\text{秒後})$$

- 3 歯車の歯数を x 、回転数を y 回転とすると、回転数 y は歯車の歯数 x に反比例する。
 (歯車の歯数) $\times$ (回転数) = (一定)

したがって、 $xy = 25 \times 36 = 900$ $y = \frac{900}{x}$

(1) $x = 90$ を代入して、 $y = \frac{900}{90} = 10$

よって、10 回転

(2) $y = 60$ を代入して、 $60 = \frac{900}{x}$ $x = \frac{900}{60} = 15$

4 比例定数が 6 なので、6 の約数 1, 2, 3, 6 を、 x に代入して、 y の値を求めればよい。

x が正の値…点 (1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)

x が負の値…点 (-1, -6), (-2, -3), (-3, -2), (-6, -1),

全部で 8 個。

5 $x < 0$ において、

$y = ax$ ($a > 0$) のグラフは、 x の値が増加すると y の値も増加する。

$y = ax$ ($a < 0$) のグラフは、 x の値が増加すると y の値は減少する。

$y = \frac{a}{x}$ ($a > 0$) のグラフは、 x の値が増加すると y の値は減少する。

$y = \frac{a}{x}$ ($a < 0$) のグラフは、 x の値が増加すると y の値も増加する。

よって、アとエである。

6 (1) 比例のグラフだから、求める式は $y = ax$ と表される。 $y = ax$ に $x = 2$, $y = 4$ を代入して、
 $4 = 2a$ $a = 2$ よって、 $y = 2x$

(2) 反比例のグラフだから、求める式は $y = \frac{a}{x}$ と表

される。 $y = \frac{a}{x}$ に $x = 2$, $y = 4$ を代入して、

$$4 = \frac{a}{2} \quad a = 8 \quad \text{よって、} y = \frac{8}{x}$$

(3) 点 B は点 A(2, 4) と原点に関して対称なので、その座標は (-2, -4)

7 反比例のグラフが点 (2, -2) を通るので、 $y = \frac{a}{x}$

に $x = 2$, $y = -2$ を代入して、

$$-2 = \frac{a}{2} \quad a = -4 \quad \text{よって、} y = -\frac{4}{x}$$

(1) $y = -\frac{4}{x}$ に代入したとき、 x の値と y の値がともに整数となる点の座標は、(1, -4), (2, -2), (4, -1), (-1, 4), (-2, 2), (-4, 1) の 6 個。

(2) $y = -\frac{4}{x}$ 上の点に

は、つねに $xy = -4$ の関係が成り立っているの、点 A の座標を (p, q) とすると、

$$pq = -4$$

三角形 OAB の面積は、

$$\frac{1}{2} \times OB \times AB$$

ここで、OB の長さは p の絶対値、AB の長さは q の絶対値である。

つまり、 $\frac{1}{2} \times OB \times AB$ は、

$$\frac{1}{2} \times (p \text{ の絶対値}) \times (q \text{ の絶対値})$$


となり、 $pq = -4$ より、

$$(p \text{ の絶対値}) \times (q \text{ の絶対値}) = 4$$

したがって、三角形 OAB の面積は、

$$\frac{1}{2} \times 4 = 2$$

つねに一定である。



p.118~p.119

- 1 (1) ○ (2) ×
- 2 (1) $-8 \leq x \leq 2$ (2) $-3 < x < 0$
- 3 (1) $y = \frac{360}{x}$, △ (2) $y = 15 - x$, ×
- (3) $y = 2.5x$ $\left[y = \frac{5}{2}x \right]$, ○
- (4) $y = \frac{240}{x}$, △
- 4 (1) 式… $y = \frac{2}{5}x$ y の値… $y = -\frac{8}{5}$
- (2) 式… $y = -7x$ x の値… $x = -5$
- 5 A(-3, 2) B(4, 1)
- C(0, -2) D(-5, -4)
- 6 (1)~(4)
-
- 7 (1) ウ (2) ア (3) エ (4) イ
- 8 (1) $y = 4x$ (2) $y = \frac{3}{5}$
- (3) $0 \leq y < 2$

解説

- 1 (1) $160 - x = y$ x の値を決めると、それに対応して y の値がただ 1 つに決まるので、関数といえる。
- (2) 体重の x kg を決めても身長 y cm は決まらないので、関数とはいえない。
- 3 (1) (1 列に並べるいすの数) × (列の数) = (全部のいすの数) である。
- したがって、 $x \times y = 360$ $xy = 360$
- よって、 $y = \frac{360}{x}$
- (2) (はじめのろうそくの長さ) = (燃えたろうそくの長さ) + (残りのろうそくの長さ)
- より、 $15 = x + y$ $y = 15 - x$
- これは、比例の関係でも、反比例の関係でもない。
- (3) (道のり) = (速さ) × (時間) より、
- $y = 2.5x$ $\left[y = \frac{5}{2}x \right]$

(4) $240 \div x = y$ より、 $y = \frac{240}{x}$

- 4 (1) $y = ax$ に $x = -5$, $y = -2$ を代入して、
- $-2 = a \times (-5)$ $a = \frac{2}{5}$ よって、 $y = \frac{2}{5}x$
- 式に $x = -4$ を代入して、 $y = \frac{2}{5} \times (-4) = -\frac{8}{5}$
- (2) $y = ax$ に $x = -3$, $y = 21$ を代入して、
- $21 = a \times (-3)$ $a = -7$
- よって、 $y = -7x$
- 式に $y = 35$ を代入して、 $35 = -7x$ より、 $x = -5$
- 6 (1) $y = 2x$ に $x = 1$ を代入して、 $y = 2 \times 1 = 2$
- したがって、グラフは原点と点 (1, 2) を通る直線である。
- (2) $y = -2.5x$ に $x = 2$ を代入して、
- $y = -2.5 \times 2 = -5$
- したがって、グラフは原点と点 (2, -5) を通る直線である。
- (3) $y = \frac{3}{4}x$ に $x = 4$ を代入して、 $y = \frac{3}{4} \times 4 = 3$
- したがって、グラフは原点と点 (4, 3) を通る直線である。
- (4) $y = -\frac{1}{3}x$ に $x = 3$ を代入して、
- $y = -\frac{1}{3} \times 3 = -1$
- したがって、グラフは原点と点 (3, -1) を通る直線である。
- 7 比例定数が正である式は(2)と(4)で、そのグラフはアとイのどちらかである。
- $x = 3$ のとき、(2)は $y = 9$, (4)は $y = 1$ となるように、 x の値を $x > 0$ の範囲で 1 つ決めると、それに対応する y の値は必ず(2)のほうが(4)より大きくなる。
- したがって、(2)がア、(4)がイとなる。
- また、比例定数が負である式は(1)と(3)で、そのグラフはウとエのどちらかである。
- $x = 6$ のとき、(1)は $y = -1$, (3)は $y = -9$ となるように、 x の値を $x > 0$ の範囲で 1 つ決めると、それに対応する y の値は必ず(1)のほうが(3)より大きくなる。
- したがって、(1)がウ、(3)がエとなる。
- 8 (1) グラフは点 (7, 28) を通るから、
- $y = ax$ に $x = 7$, $y = 28$ を代入して、
- $28 = a \times 7$ $a = 4$ よって、 $y = 4x$
- (2) $y = ax$ に $x = -5$, $y = 3$ を代入して、
- $3 = a \times (-5)$ $a = -\frac{3}{5}$
- よって、 $y = -\frac{3}{5}x$
- 式に $x = -1$ を代入して、 $y = -\frac{3}{5} \times (-1) = \frac{3}{5}$


- (3) $y = ax$ に $x = 3$, $y = -1$ を代入して,

$$-1 = a \times 3 \quad a = -\frac{1}{3}$$

よって, $y = -\frac{1}{3}x$

$y = -\frac{1}{3}x$ のグラフは, x

の値が増加すると y の値は減少する。よって, y の値は, ($x = 0$ を代入したときの値) 以上 ($x = -6$ を代入したときの値) 未満である。



$x = 0$ のとき, $y = -\frac{1}{3} \times 0 = 0$

$x = -6$ のとき, $y = -\frac{1}{3} \times (-6) = 2$


よって, y の変域は, $0 \leq y < 2$

p.120~p.121

1 (1) 式 $y = -\frac{24}{x}$ y の値 $y = 8$

(2) 式 $y = \frac{18}{x}$ x の値 $x = 6$


- 2 (1), (2)



3 (1) 12 (2) $-10 \leq y \leq -2$

4 (1) 分速 75m

- (2)



- (3) 6 分後

5 (1) $y = 2x$

(2) x の変域 $0 \leq x \leq 7$

y の変域 $0 \leq y \leq 14$

6 (1) $y = \frac{60}{x}$ (2) 20 分 (3) 毎分 12L

7 (1) $y = \frac{8}{x}$ (2) 8 個 (3) 4

解 説

1 (1) $y = \frac{a}{x}$ に $x = 4$, $y = -6$ を代入して,

$$-6 = \frac{a}{4} \quad a = -6 \times 4 = -24$$

よって, $y = -\frac{24}{x}$

$x = -3$ を代入して, $y = -\frac{24}{-3} = 8$

(2) $y = \frac{a}{x}$ に $x = -2$, $y = -9$ を代入して,

$$-9 = \frac{a}{-2} \quad a = 18 \quad \text{よって, } y = \frac{18}{x}$$

$y = 3$ を代入して, $3 = \frac{18}{x} \quad x = 6$

2 グラフが通る点を計算でいくつか求めて、それらの点をつないでグラフをかく。

- (1) 点(1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)を通るなめらかな曲線と、点(-1, -6), (-2, -3), (-3, -2), (-6, -1)を通るなめらかな曲線の2つをかく。
- (2) 点(1, -8), (2, -4), (4, -2), (8, -1)を通るなめらかな曲線と、点(-1, 8), (-2, 4), (-4, 2), (-8, 1)を通るなめらかな曲線の2つをかく。

3 (1) グラフは点P(9, -4)を通るから、

$$y = \frac{a}{x} \text{ に } x = 9, y = -4 \text{ を代入して、}$$

$$-4 = \frac{a}{9} \quad a = -36 \quad \text{よって、} y = -\frac{36}{x}$$

これに点Qの x 座標-3を代入して、


$$y = -\frac{36}{-3} = 12$$

- (2) $y = \frac{a}{x}$ に $x = -2, y = 5$ を代入して、

$$5 = -\frac{a}{2} \quad a = -10 \quad \text{よって、} y = -\frac{10}{x}$$

$y = -\frac{10}{x}$ のグラフは、

$x > 0$ の範囲で x の値が増加すると y の値も増加する。よって、 y の値は、($x=1$ を代入したときの値)以上($x=5$ を代入したときの値)以下である。




$$x = 1 \text{ のとき、} y = -\frac{10}{1} = -10$$

$$x = 5 \text{ のとき、} y = -\frac{10}{5} = -2$$

よって、 y の変域は、 $-10 \leq y \leq -2$

4 (1) グラフより、 $x=6$ のとき、 $y=450$ となる点を読みとれる。このことより、6分間で450m進むことになるから、姉の速さは、 $450 \div 6 = 75$ で、分速75mとなる。

- (2) 弟は分速50mの速さで歩くから、450m離れた学校まで歩くのにかかる時間は $450 \div 50 = 9$ (分) となる。これより、点(9, 450)を通ることがわかる。したがって、この点と原点(0, 0)とを結ぶ直線をかけばよい。



- (3) グラフ上で、2人のグラフの y 座標の差が150に

なるところの x 座標は6

よって、2人が150m離れるのは、出発してから6分後である。

- 5** (1) 点Pは秒速1cmで動くので、点PがBを出発してから x 秒後のBPの長さは x cm

平行四辺形ABCDの高さは、 $28 \div 7 = 4$ (cm)

よって、三角形ABPの面積は、

$$\frac{1}{2} \times BP \times (\text{高さ}) \text{ より、}$$

$$y = \frac{1}{2} \times x \times 4 = 2x$$

- (2) 点Pが点Cまでの7cmを動くのにかかる時間は7秒だから、 x の変域は、 $0 \leq x \leq 7$

また、 $x=0$ のとき、点Pは点B上にあるから、

$$y = 0$$

$x=7$ のとき、 $y = 2 \times 7 = 14$

したがって、 y の変域は、 $0 \leq y \leq 14$

- 6** (1) 空の水そうに水を入れるとき、水そうがいっぱいになる時間 y 分は、1分間に入れる水の量 x Lに反比例する。

(水そうがいっぱいになる時間)

$$\times (1 \text{ 分間に入れる水の量}) = (\text{一定})$$

したがって、 $xy = 15 \times 4$

$$\text{よって、} y = \frac{60}{x}$$

- (2) $y = \frac{60}{x}$ に $x=3$ を代入して、 $y = \frac{60}{3} = 20$

よって、20分

- (3) $y = \frac{60}{x}$ に $y=5$ を代入して、 $5 = \frac{60}{x}$

$$x = \frac{60}{5} = 12 \quad \text{よって、毎分12L}$$

- 7** (1) 点Aは、㊦のグラフが通る点だから、 $y = \frac{1}{2}x$

に $x=4$ を代入して、

$$y = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

よって、点Aの座標は(4, 2)

㊦のグラフは点Aを通るから、 $y = \frac{a}{x}$ に $x=4$,

$y=2$ を代入して、

$$2 = \frac{a}{4} \quad a = 8 \quad \text{よって、} y = \frac{8}{x}$$

- (2) $y = \frac{8}{x}$ に代入したとき、 x の値と y の値がともに整数となる点の座標は、(1, 8), (2, 4), (4, 2), (8, 1), (-1, -8), (-2, -4), (-4, -2), (-8, -1)の8個。

(3) $y = \frac{8}{x}$ 上の点には,

つねに $xy = 8$ の関係が成り立っている
ので、点 B の座標を

(p, q) とすると,

$$pq = 8$$

三角形 OBC の面積は,

$$\frac{1}{2} \times OC \times BC$$

ここで、OC の長さは p の絶対値、BC の長さは q の絶対値である。

つまり、 $\frac{1}{2} \times OC \times BC$ は,

$$\frac{1}{2} \times (p \text{ の絶対値}) \times (q \text{ の絶対値})$$


となり、 $pq = 8$ より、

$$(p \text{ の絶対値}) \times (q \text{ の絶対値}) = 8$$

したがって、三角形 OBC の面積は,

$$\frac{1}{2} \times 8 = 4$$


つねに一定である。



14 直線と図形 / 移動と作図 (1)

p.122~p.125


①



②

- (1) $\angle ABD$ [$\angle DBA$]
- (2) $\triangle ABD$ [$\triangle BDA$, $\triangle DAB$, $\triangle DBA$ など]
- (3) $AD \perp DC$ (4) $AD \parallel BC$
- (5) 9cm


③




位置関係… $AD \parallel BE \parallel CF$

長さの関係… $AD = BE = CF$


④




(2)




⑤



$\ell \perp AD$



4cm



(2) 辺 GH

(3) 110°

8 (1) $\triangle ABC \rightarrow \triangle DBE$ …回転移動
 $\triangle DBE \rightarrow \triangle FGH$ …対称移動
 $\triangle FGH \rightarrow \triangle IJK$ …平行移動

(2) 頂点 K (3) 5cm

9 (1) $\triangle ABC \rightarrow \triangle ADE$ …対称移動
 $\triangle ADE \rightarrow \triangle FGH$ …平行移動
 $\triangle FGH \rightarrow \triangle FIJ$ …回転移動

(2) 頂点 I (3) 辺 FJ

解説

1 直線 AB…2 点 A, B を通りまっすぐに限りなくのびている線をひく。(実際には、限りなくのびている線はかけないので、解答の図のように、ある程度の途中のところまでかけばよい。)

線分 BC…直線の一部で、両端を点 B, C とする線をひく。(点 B の左側, 点 C の右側のどちらにも線をのばさないでかく。)

半直線 CA…点 C を端として、点 A を通り、A の方にだけのびた線をひく。(点 C の右側に線をのばさないでかく。)

参考 半直線 AC の場合は、逆に、点 A を端として、点 C を通り、C の方にだけのびた線をひく。(点 A の左側に線をのばさない。)

2 (1) $\angle ABD$ と $\angle DBA$ のどちらでもよい。

(2) $\triangle ABD$, $\triangle BDA$, $\triangle DAB$, $\triangle DBA$, $\triangle ADB$, $\triangle BAD$ のどれでもよい。


(3) $AD \perp DC$, $AD \perp CD$, $DA \perp DC$, $DA \perp CD$ のどれでもよい。

(4) $AD \parallel BC$, $AD \parallel CB$, $DA \parallel BC$, $DA \parallel CB$ のどれでもよい。

(5) $BC \perp CD$ なので、頂点 B と辺 CD との距離は、


線分 BC の長さになる。よって、頂点 B と辺 CD との距離は 9cm となる。

3 下の図のように、点 A を左に 8, 下に 1 だけ移動した点が点 D である。点 B, 点 C も同様に、左に 8, 下に 1 だけ移動させる。




4 (1) 下の図で、 $\angle BOE = 90^\circ$ であるから、点 O から左に 3 のところが点 E である。

また、点 B から上に 4, 右に 4 進んだ点が点 A なので、点 E から左に 4, 上に 4 進んだ点が点 D である。同じように考えると、点 F が決まる。




(2) 下の図で、点 A から右に 7, 下に 2 進んだ点 O から、下に 2, 右に 7 進んだ点が点 A に対応する点 D である。ほかの点も同じように考える。




5 $\triangle ABC$ を、直線 ℓ を折り目として折り返したときに重なる図形が $\triangle DEF$ である。

点 A と点 D が重なるのだから、 $\ell \perp AD$ である。



参考

右の図のような場合、 ℓ を折り目として折り返したとき、点 A と点 D は重なるが、点 A と点 P は重ならない。



6 対称移動の対称の軸は、対応する2点を結んだ線分の垂直二等分線なので、 $CM = FM = 4\text{cm}$ である。

7 (3) 対称移動の前後で対応する角の大きさは等しいので、 $\angle EFG = 110^\circ$ である。

- 8 (1) $\triangle ABC \rightarrow \triangle DBE$ 回転移動
 $\triangle DBE \rightarrow \triangle FGH$ 対称移動
 $\triangle FGH \rightarrow \triangle IJK$ 平行移動

$\triangle ABC$ を、点Bを回転の中心として時計まわりに 90° 回転移動したものが $\triangle DBE$ である。

$\triangle DBE$ を、線分DF(EH)の垂直二等分線を対称の軸として対称移動したものが $\triangle FGH$ である。

$\triangle FGH$ を、矢印FI(HK, GJ)の方向へ平行移動したものが $\triangle IJK$ である。

(2) 頂点Cに対応する頂点は順に、頂点E→頂点H→頂点Kである。

(3) 辺ABに対応する辺は順に、辺DB→辺FG→辺IJであるので、 $AB = IJ = 5\text{cm}$ である。

- 9 (1) $\triangle ABC \rightarrow \triangle ADE$ 対称移動
 $\triangle ADE \rightarrow \triangle FGH$ 平行移動
 $\triangle FGH \rightarrow \triangle FIJ$ 回転移動




$\triangle ABC$ を、線分CE(BD)の垂直二等分線を対称の軸として対称移動したものが $\triangle ADE$ である。

$\triangle ADE$ を、矢印AF(DG, EH)の方向へ平行移動したものが $\triangle FGH$ である。



$\triangle FGH$ を、点Fを中心として反時計まわりに 90° 回転移動したものが $\triangle FIJ$ である。

(2) 頂点Bに対応する頂点は順に、頂点D→頂点G→頂点Iである。


(3) 辺ACに対応する辺は順に、辺AE→辺FH→辺FJである。



$\angle BOB' = 100^\circ$



- 7 (1) ㉠, ㉡ (2) ㉢, ㉣





- 8 (1) $\triangle IFG$ (2) $\triangle DHG$, $\triangle CGF$, $\triangle BFE$
(3) $\triangle DGH$

p.126~p.127

確認問題

- 1 (1) $\angle CDA$ [$\angle ADC$, $\angle CDE$, $\angle EDC$]
(2) $\angle BCA$ [$\angle ACB$, $\angle HCA$, $\angle ACH$]
(3) $\triangle ACD$ [$\triangle CDA$, $\triangle DAC$, $\triangle ADC$ など]
(4) $AB \parallel DC$ (5) $AC \perp BE$
(6) 線分 AH





(3) ㉦の台形と㉠の台形の対応する頂点を結ぶ。


㉠の台形は㉦の台形を点Oを回転の中心として 180° 回転移動(点対称移動)したものである。

- 8 (2) $\triangle AEH$ を, 点Iを回転の中心として, 時計まわりに 90° 回転移動して重なるのが $\triangle DHG$, さらに 90° 回転移動して重なるのが $\triangle CGF$, さらに 90° 回転移動して重なるのが $\triangle BFE$ となる。


15 移動と作図 (2) / 移動と作図の利用

p.128~p.131


1 (1)




(2)




2




3




4 (1)




(2)












5



6 (1)





解説

1 ① 2点 A, B をそれぞれ中心として, 等しい半径の円をかき, この2円の交点を P, Q とする。

② 直線 PQ をひく。

2 線分 AB の垂直二等分線 ℓ を作図したときの, AB と ℓ との交点が線分 AB の中点 M である。

注意 点 M を作図しなさい, という問題文のとき, かならず解答には「M」を書き入れる。

3 ② と同じように線分(辺) BC の中点 M を作図し, 頂点 A と点 M を線で結ぶ。

4 ① 点 O を中心とする円をかき, 半直線 OA, OB との交点を, それぞれ, P, Q とする。

② 2点 P, Q を, それぞれ中心として, 半径 OP の円をかき, その交点の1つを R とする。

③ 半直線 OR をひく。

6 (1) $\angle AOB = 90^\circ$ のとき, 45° の大きさの角の作図は, $90^\circ \div 2 = 45^\circ$ なので, $\angle AOB$ の二等分線を作図すればよい。


(2) $\angle AOB = 60^\circ$ のとき, 30° の大きさの角の作図は, $60^\circ \div 2 = 30^\circ$ なので, $\angle AOB$ の二等分線を作図すればよい。

9 (2) 直線 ℓ を対称の軸として, 点 B と対称な点を取り, 点 A とその点を結ぶとき, 直線 ℓ との交点が点 P である。


10 (1) 線分 AB を1辺とする正三角形の一部をかき, 60° の大きさの角をつくる。 $60^\circ \div 2 = 30^\circ$ なので, $\angle A$ の二等分線を作図すればよい。

(2) $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ を利用する。点 A の左側に直線をのびし, 点 A から左側に正三角形の一部を作図すれば, $\angle PAB = 120^\circ$ となる。


1 (1)




(2)





2 (1)





(2)




3 (1)




(3)




4 (1)




(2)




5 (1)




(2)



6 (1)



(2)



7 ウ

解説

1 (2) 2点 A, B からの距離が等しい点は、線分 AB の垂直二等分線上にある。

線分 AB の垂直二等分線上の点は、線分 AB の両端の点 A, B からの距離が等しいので、作図した垂直二等分線と、直線 ℓ との交点が P である。

2 (2) $\angle BCA$ の二等分線を作図して、その直線と辺 AB との交点を P とすればよい。

3 (1) 2点 A, B から等しい距離となる点は、線分 AB の垂直二等分線上にある。点 P は線分 AB の垂直二等分線と辺 BC の交点である。

(2) 2辺 AB, AC から等しい距離となる点は、 $\angle BAC$ の二等分線上にある。点 P は $\angle BAC$ の二等分線と辺 BC の交点である。

(3) 直線 ℓ と線分 AB の位置関係から、 $AB = PA$ や $AB = PB$ にならないので、 $\triangle ABP$ は $PA = PB$ の二等辺三角形である。よって、頂点 P は 2点 A, B から等しい距離にあるので、線分 AB の垂直二等分線と直線 ℓ の交点になる。

(4) 解答では、 $\angle BAC$ の二等分線と $\angle ACB$ の二等分線の交点を P としている。「辺 AB と辺 AC からの距離が等しい点」かつ「辺 CA と辺 CB からの距離が等しい点」ならば、「辺 AB と辺 AC と辺 CB からの距離が等しい点」といえる。すなわち、三角形の 3 辺から等しい距離にある点は、2 組の角の二等分線の交点といえる。

4 (1) 直線 m 上の点 P を通る直線 m の垂線は、 180°

の角の二等分線ともいえる。

- (2) 点 A を通る辺 BC の垂線を作図し、その垂線と辺 BC との交点を H とする。この線分 AH の長さがこの三角形の高さになる。

- 5 (2) $90^\circ \div 2 = 45^\circ$ である。点 O を通る直線 OY の垂線を作図して、さらに 90° の角の二等分線を作図する。

- 6 (1) ① 点 A を中心とした円をかき、直線 ℓ との交点をそれぞれ P, Q とする。

- ② 2 点 P, Q を中心とした半径 AP の円をそれぞれかく。

- ③ 2 つの円の交点が A' である。


$AP = AQ = A'P = A'Q$ だから、四角形 APA'Q はひし形となり、直線 ℓ は対称の軸となる。

- (2) ① (1) と同様にして、点 A と対称な点 A' を作図する。

- ② 直線 ℓ と線分 A'B との交点を P とする。

線分 A'B が最短で、 $A'B = A'P + PB = AP + PB$ だから、作図した AP + PB が最短となる。

- 7 次の図のように、川幅の距離の分だけ点 Q を移動した点を Q' とすると、線分 PQ' は 2 点 P, Q' の最短距離である。




上の図のように、橋ウの両端を R, S とすると、四角形 RSQQ' は平行四辺形であるから、

$$RQ' + Q'Q = RS + SQ$$

また、次の図のように、橋イの両端を T, U とすると、

$$PT + TQ' > PQ'$$

となり、ほかの橋でも同じことがいえるので橋ウを通るのが最短といえる。



16 円とおうぎ形

p.134~p.137

- 1 (1) 円周の P から Q まで… $\widehat{PQ}$ [弧 PQ]
線分 PQ…弦 PQ

- (2) 中心角

- (3) 直径になるとき


[PQ に対する中心角が 180° のとき]

- 2 (1) $PM = QM$


- (2) 垂直二等分線

- (3) 接線


- 3




- 4 (1)



- (2)



または、



- 5 (1) $\widehat{AB}$, $\widehat{CD}$

- (2) $CD = EF$

- 6 (1) 二等辺三角形

- (2) 140°

- 7 (1) 周… $16\pi\text{cm}$

- 面積… $64\pi\text{cm}^2$

- (2) 周… $\frac{3}{2}\pi\text{cm}$

- 面積… $\frac{9}{16}\pi\text{cm}^2$

- (3) 周… $6\pi\text{cm}$

- 面積… $9\pi\text{cm}^2$

- (4) 周… $\frac{2}{3}\pi\text{cm}$

- 面積… $\frac{1}{9}\pi\text{cm}^2$

- 8 (1) 弧… $2\pi\text{cm}$

- 面積… $3\pi\text{cm}^2$

- (2) 弧… $6\pi\text{cm}$

- 面積… $12\pi\text{cm}^2$

- 9 (1) 中心角… 45°

- 面積… $18\pi\text{cm}^2$

- (2) 中心角… 210°

- 面積… $21\pi\text{cm}^2$

- 10 周… $8 + 2\pi(\text{cm})$

- 面積… $16 - 4\pi(\text{cm}^2)$

- 11 周… $12 + 3\pi(\text{cm})$


- 面積… $9\pi\text{cm}^2$

- 12 周… $10\pi\text{cm}$

- 面積… $10\pi\text{cm}^2$

解説

- ① (3) 線分PQがもっとも長くなるのは、右の図のように直径になるときである。または、中心角が 180° のときともいえる。



- ② 直線 ℓ は対称の軸なので、 ℓ を折り目として折り返したとき、点Pは点Qに重なり、直線 ℓ は線分PQの垂直二等分線になる。


- ③ 円の接線は、その接点を通る半径に垂直であるから、点Aを通る直線OAの垂線が接線となる。

① 半直線OAをひく。

② 点Aを中心とする円をかき、半直線OAとの交点をP, Qとする。

③ 2点P, Qを、それぞれ中心として、等しい半径の円をかく。

④ その交点の1つと、点Aを通る直線が接線 ℓ である。



- ⑤ (2) 合同なおうぎ形どうしでは、弦の長さも等しい。

- ⑥ (2) $\angle BOC = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$

- ⑦ (1) 周の長さは、 $2\pi \times 8 = 16\pi(\text{cm})$
面積は、 $\pi \times 8^2 = 64\pi(\text{cm}^2)$

- (2) 周の長さは、 $2\pi \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2}\pi(\text{cm})$

$$\text{面積は、}\pi \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}\pi(\text{cm}^2)$$

- (3) 半径は、 $6 \div 2 = 3(\text{cm})$ だから、
周の長さは、 $2\pi \times 3 = 6\pi(\text{cm})$
面積は、 $\pi \times 3^2 = 9\pi(\text{cm}^2)$

- (4) 半径は、 $\frac{2}{3} \div 2 = \frac{1}{3}(\text{cm})$ だから、
周の長さは、 $2\pi \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}\pi(\text{cm})$

$$\text{面積は、}\pi \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}\pi(\text{cm}^2)$$



- ⑧ (1) 弧の長さは、 $2\pi \times 3 \times \frac{120}{360} = 2\pi(\text{cm})$

$$\text{面積は、}\pi \times 3^2 \times \frac{120}{360} = 3\pi(\text{cm}^2)$$

- (2) 弧の長さは、 $2\pi \times 4 \times \frac{270}{360} = 6\pi(\text{cm})$

$$\text{面積は、}\pi \times 4^2 \times \frac{270}{360} = 12\pi(\text{cm}^2)$$

- ⑨ (1) おうぎ形の中心角を x° とすると、次の図のようになる。



半径12cmの円の周の長さは、 $2\pi \times 12 = 24\pi(\text{cm})$ だから、

$$3\pi : 24\pi = x : 360$$

$$3\pi \times 360 = 24\pi \times x$$

$$x = 45$$

よって、中心角の大きさは 45°

$$\text{面積は、}\pi \times 12^2 \times \frac{45}{360} = 18\pi(\text{cm}^2)$$

- (2) (1)と同様に考えて、

$$7\pi : 12\pi = x : 360 \quad x = 210$$

よって、中心角の大きさは 210°

$$\text{面積は、}\pi \times 6^2 \times \frac{210}{360} = 21\pi(\text{cm}^2)$$

- ⑩ 影をつけた部分の周の長さは、正方形の2辺の長さと、半径4cm、中心角 90° のおうぎ形の弧の長さの和になるから、

$$4 \times 2 + 2\pi \times 4 \times \frac{90}{360} = 8 + 2\pi(\text{cm})$$

面積は、正方形から上で示したおうぎ形の面積をひけば求められるから、

$$4^2 - \pi \times 4^2 \times \frac{90}{360} = 16 - 4\pi(\text{cm}^2)$$

- ⑪ 影をつけた部分の周の長さは、直線部分が、 $(12-6) \times 2 = 12(\text{cm})$

弧の部分が、半径12cm、中心角 30° のおうぎ形の弧の長さ、半径6cm、中心角 30° のおうぎ形の弧の長さの和だから、

$$2\pi \times 12 \times \frac{30}{360} + 2\pi \times 6 \times \frac{30}{360} = 3\pi(\text{cm})$$

よって、周の長さは、 $12 + 3\pi(\text{cm})$

面積は、半径12cm、中心角 30° のおうぎ形の面積から、半径6cm、中心角 30° のおうぎ形の面積をひけば求められるから、

$$\pi \times 12^2 \times \frac{30}{360} - \pi \times 6^2 \times \frac{30}{360} = 9\pi(\text{cm}^2)$$

- ⑫ 影をつけた部分の周の長さは、半径5cm、3cm、2cmの3つの半円の弧の長さの和だから、

$$2\pi \times 5 \times \frac{180}{360} + 2\pi \times 3 \times \frac{180}{360} + 2\pi \times 2 \times \frac{180}{360}$$

$$= 10\pi(\text{cm})$$




面積は、半径5cmの半円の面積と半径2cmの半円の面積の和から、半径3cmの半円の面積をひけばよい

から、

$$\left(\pi \times 5^2 \times \frac{180}{360} + \pi \times 2^2 \times \frac{180}{360}\right) - \pi \times 3^2 \times \frac{180}{360} = 10\pi(\text{cm}^2)$$

p.138~p.139

確認問題



4 (1) $\widehat{AC}$ (2) おうぎ形 OAC

5 周... $\frac{5}{3}\pi\text{cm}$ 面積... $\frac{25}{36}\pi\text{cm}^2$

6 周... $5\pi\text{cm}$ 面積... $\frac{25}{4}\pi\text{cm}^2$

7 (1) 弧... $18\pi\text{cm}$ 面積... $135\pi\text{cm}^2$

(2) 弧... $7\pi\text{cm}$ 面積... $35\pi\text{cm}^2$

8 (1) 中心角... 270° 面積... $48\pi\text{cm}^2$

(2) 中心角... 330° 面積... $297\pi\text{cm}^2$

9 (1) 周... $10\pi\text{cm}$ 面積... $50\pi - 100(\text{cm}^2)$

(2) 周... $12\pi\text{cm}$ 面積... $16\pi - 32(\text{cm}^2)$

10 (1) 正三角形 (2) $10\pi + 15(\text{cm})$

解説

1 まず、半径をのばした直線 OA をひく。接線 ℓ は半径と垂直なので、直線 OA 上の点 A を通る垂線を作図すればよい。

2 円の中心 O は、3 点 A, B, C から等しい距離にある。よって、線分 AB の垂直二等分線と線分 AC の垂直二等分線をひき、それらの交点を O とし、半径 OA (または OB, OC) の円を作図すればよい。

3 円の中心は、適当な弦の垂直二等分線上にある。2 つの弦の垂直二等分線を作図し、それらの交点を O とすればよい。

4 (1) おうぎ形 OAB, おうぎ形 OBC, おうぎ形 ODE は合同なので、 $\widehat{AB}$ と $\widehat{BC}$ をあわせた $\widehat{AC}$ は、 $\widehat{ED}$ の長さの 2 倍になる。

(2) おうぎ形 OBC とおうぎ形 OAB は合同なので、その面積も等しい。

5 周の長さは、 $2\pi \times \frac{5}{6} = \frac{5}{3}\pi(\text{cm})$

面積は、 $\pi \times \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}\pi(\text{cm}^2)$

6 周の長さは、 $5 \times \pi = 5\pi(\text{cm})$

半径が $\frac{5}{2}\text{cm}$ なので、面積は、

$$\pi \times \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}\pi(\text{cm}^2)$$

7 (1) 弧の長さは、 $2\pi \times 15 \times \frac{216}{360} = 18\pi(\text{cm})$

面積は、 $\pi \times 15^2 \times \frac{216}{360} = 135\pi(\text{cm}^2)$

(2) 弧の長さは、 $2\pi \times 10 \times \frac{126}{360} = 7\pi(\text{cm})$

面積は、 $\pi \times 10^2 \times \frac{126}{360} = 35\pi(\text{cm}^2)$

8 (1) 半径 8cm の円の周の長さは、

$$2\pi \times 8 = 16\pi(\text{cm})$$

だから、おうぎ形の中心角を x° とすると、

$$12\pi : 16\pi = x : 360$$

$$12\pi \times 360 = 16\pi \times x$$

$$x = 270$$

よって、中心角の大きさは 270°

面積は、 $\pi \times 8^2 \times \frac{270}{360} = 48\pi(\text{cm}^2)$

(2) 半径 18cm の円の周の長さは、 $2\pi \times 18 = 36\pi(\text{cm})$

だから、おうぎ形の中心角を x° とすると、

$$33\pi : 36\pi = x : 360 \quad x = 330$$

よって、中心角の大きさは 330°

面積は、 $\pi \times 18^2 \times \frac{330}{360} = 297\pi(\text{cm}^2)$

9 (1) 求める周の長さは、半径 10cm, 中心角 90° のおうぎ形の弧の長さ 2 個分だから、


$$2\pi \times 10 \times \frac{90}{360} \times 2$$

$$= 10\pi(\text{cm})$$

右上の図のように分け

て考えると、求める面積は、㊦の面積 $\times 2$ である。

㊦の面積は、半径 10cm, 中心角 90° のおうぎ形から、底辺 10cm, 高さ 10cm の直角二等辺三角形の面積



をひけば求められる。

$$\textcircled{ア} = \pi \times 10^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 25\pi - 50(\text{cm}^2)$$

よって、求める面積は、

$$\begin{aligned} \textcircled{ア} \times 2 &= (25\pi - 50) \times 2 \\ &= 50\pi - 100(\text{cm}^2) \end{aligned}$$


- (2) 周の長さは、半径 4cm の半円 2 つ分と半径 8cm, 中心角 90° のおうぎ形の周の長さの和だから、

$$\begin{aligned} &\left(2\pi \times 4 \times \frac{1}{2}\right) \times 2 \\ &+ 2\pi \times 8 \times \frac{90}{360} = 12\pi(\text{cm}) \end{aligned}$$

面積は、右上の図のように一部を移動させると、半径 8cm, 中心角 90° のおうぎ形から、底辺 8cm, 高さ 8cm の直角二等辺三角形の面積をひけばよい。

$$\pi \times 8^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 8 \times 8 = 16\pi - 32(\text{cm}^2)$$

- 10** (1) 右の図のように、点 A と E, 点 D と E を結ぶと、
 $EA = AD = DE$ になるから、
 $\triangle EAD$ は正三角形である。







- (2) 影をつけた部分の周の長さは、半径 15cm, 中心角 60° のおうぎ形の弧 2 つ分と直線部分の 15cm の和だから、

$$\left(2\pi \times 15 \times \frac{60}{360}\right) \times 2 + 15 = 10\pi + 15(\text{cm})$$

p.140~p.143

- 1** (1) $\textcircled{ア}$ 直線 AB
 (2) $\textcircled{イ}$ 線分 AB $\textcircled{ウ}$ 半直線 BA
 (3) $\textcircled{エ}$ 垂線
 (4) $\textcircled{オ}$ $\triangle ABC$
 (5) $\textcircled{カ}$ 平行移動
 (6) $\textcircled{キ}$ 回転移動 $\textcircled{ク}$ 回転の中心
 $\textcircled{ケ}$ 点対称移動
 (7) $\textcircled{コ}$ 対称移動 $\textcircled{サ}$ 対称の軸
 (8) $\textcircled{シ}$ 中点 $\textcircled{ス}$ 垂直二等分線
 (9) $\textcircled{セ}$ 弧 AB $\textcircled{ソ}$ 弦 AB
 (10) $\textcircled{タ}$ 接線 $\textcircled{チ}$ 接点
 (11) $\textcircled{ツ}$ おうぎ形 $\textcircled{テ}$ 中心角


- 2** (1) $AD \perp DC$ (2) $AB \parallel DC$
 (3) $\textcircled{あ}$ $\angle BCD$ [$\angle DCB$]
 $\textcircled{い}$ $\angle BAC$ [$\angle CAB$]




- 4 (1) $\triangle OBF$ (2) $\triangle OHD$

- (3) $\triangle BOE$, $\triangle COF$, $\triangle DOG$


- 5 (1)




- (2)




- 6 (1)




- (2)





- 7 (1)



- (2)



- 8 (1)



- 9 (1) $\frac{2}{5}$ 倍 (2) $\frac{1}{9}$ 倍

- 10 (1) 弧... $4\pi\text{cm}$ 面積... $18\pi\text{cm}^2$

- (2) 中心角... 72° 面積... $5\pi\text{cm}^2$

- (3) 中心角... 150° 弧... $10\pi\text{cm}$

- (4) 半径... 3cm 面積... $6\pi\text{cm}^2$

- 11 (1) 周... $36\pi\text{cm}$ 面積... $36\pi\text{cm}^2$

- (2) 周... $12\pi + 12(\text{cm})$ 面積... $9\pi\text{cm}^2$

解説

- 3 (1) 点 A を左に 10, 上に 3 だけ移動した点が点 D である。

- (2) $\angle BOE = 90^\circ$ であるから, 点 O から右に 3, 上に 3 のところが点 E である。ほかの点も同じように考える。

- (3) 点 A から右に 8 進んだ点 O から, 右に 8 進んだ点が点 A に対応する点 D である。ほかの点も同じように考える。

- (4) 点 A から左に 7 進むと直線 ℓ だから, さらに, 左に 7 進んだ点が点 A に対応する点 D である。ほかの点も同じように考える。

- 4 (3) $\triangle AOH$ を, 点 O を回転の中心として, 反時計回りに 90° 回転移動して重なるのが $\triangle BOE$, さらに 90° 回転移動して重なるのが $\triangle COF$, さらに 90° 回転移動して重なるのが $\triangle DOG$ になる。

- 5 ① 線分の両端の点 X, Y を, それぞれ中心として, 等しい半径の円をかき, この 2 円の交点を P, Q とする。

- ② 直線 PQ をひく。

- 6 ① 点 O を中心とする円をかき, 半直線 OX, OY との交点を, それぞれ, P, Q とする。

- ② 2 点 P, Q を, それぞれ中心として, 半径 OP の円をかき, その交点の 1 つを R とする。

- ③ 半直線 OR をひく。

- 7 (1) 直線上の 1 点を通る垂線。

- ① 点 Q を中心とする円をかき, 直線 ℓ との交点を A, B とする。

- ② 線分 AB の垂直二等分線をひく。

- (2) 直線上にない 1 点を通る垂線。

- ① 点 Q を中心とする円をかき, 直線 ℓ との交点を A, B とする。

- ② 2 点 A, B を, それぞれ中心として, 半径 QA の円をかき, その交点の 1 つを R とする。

p.144~p.145

- ③ 直線 QR をひく。
 8 まず、半径をのばした直線 OX をひく。接線 m は半径と垂直なので、直線 OX 上の点 X を通る垂線を作図すればよい。

- 9 (1) 同じ半径の円では、弧の長さは中心角の大きさに比例するので、

$$\ell = 2\pi r \times \frac{a}{360}$$

$$S = \pi r^2 \times \frac{a}{360}$$

$$144 \div 360 = \frac{144}{360} = \frac{2}{5} \text{ (倍)}$$

- (2) 同じ半径の円では、面積は中心角の大きさに比例するので、 $40 \div 360 = \frac{40}{360} = \frac{1}{9}$ (倍)

- 10 (1) 弧の長さは、 $2\pi \times 9 \times \frac{80}{360} = 4\pi$ (cm)

$$\text{面積は、} \pi \times 9^2 \times \frac{80}{360} = 18\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

- (2) おうぎ形の中心角の大きさを x° とする。半径 5cm の円の周の長さは、 $2\pi \times 5 = 10\pi$ (cm)
 よって、 $2\pi : 10\pi = x : 360$

$$2\pi \times 360 = 10\pi \times x$$

$$x = 72$$

$$\text{面積は、} \pi \times 5^2 \times \frac{72}{360} = 5\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

- (3) おうぎ形の中心角の大きさを x° とする。おうぎ形の面積と中心角の大きさは比例することから、比例式をつくる。

$$\text{半径 12cm の円の面積は、} \pi \times 12^2 = 144\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{よって、} 60\pi : 144\pi = x : 360$$

$$60\pi \times 360 = 144\pi \times x$$

$$x = 150$$


$$\text{弧の長さは、} 2\pi \times 12 \times \frac{150}{360} = 10\pi \text{ (cm)}$$

- (4) 半径を r cm とすると、円の周の長さは $2\pi r$ cm とおけることから考える。

$$4\pi : 2\pi r = 240 : 360 \quad r = 3$$

$$\text{面積は、} \pi \times 3^2 \times \frac{240}{360} = 6\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

- 11 (2)



(周の長さ) = (半径 6cm の半円の弧の長さ)

+ (半円の直径)

+ (半径 3cm の円の周の長さ)





したがって、周の長さは、

$$2\pi \times 6 \times \frac{1}{2} + 6 \times 2 + 2\pi \times 3 = 12\pi + 12 \text{ (cm)}$$


面積は、半径 6cm の半円の面積から半径 3cm の円の面積をひいたものだから、

$$\pi \times 6^2 \times \frac{1}{2} - \pi \times 3^2 = 9\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$


- 1 (1)




- 2 例



- 3



- 4 (1), (2)



- (3) 6π cm

- 5 $9\pi - 18 \text{ (cm}^2\text{)}$

- 6 (1) 5π cm

- (2) $16\pi \text{ cm}^2$

解説

- 1 (3) ① 線分 AB を点 A
の方に延長する。

- ② 点 A を中心とする円
をかき、半直線 BA と
の交点を P, Q とする。

- ③ 2点 P, Q を、それぞれ中心として、等しい半径
の円をかき、その交点と点 A を結び、 $AB = AD$
となる点 D とする。

- ④ 2点 D, B を、それぞれ中心として、半径 AB
の円をかき、その交点を C とする。

- (4) 円周上に適当な 3 点 A, B, C をとり線分 AB と、
線分 BC の垂直二等分線を作図し、その 2 直線の交
点を O とすればよい。なぜなら、垂直二等分線上
の点から 2 点 A, B までの距離と 2 点 B, C までの
距離は等しいから、 $OA = OB = OC$ となる。これ
らは円 O の等しい半径と考えられるので、点 O が
この円の中心を表すことになる。

- 2 $\angle BAC = 75^\circ$ であればよいので、
 $\angle ABC + \angle ACB = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$

作図可能な角の組み合わせは、

$$\angle ABC = 45^\circ, \angle ACB = 60^\circ$$

がある。

- ① 点 B を通る線分 BC の
垂線 RB を作図する。

- ② $\angle RBC$ の二等分線 ℓ
を作図する。

- ③ 2点 B, C を、それぞ
れ中心として、半径 BC の円をかき、その交点を S
とし、点 S と C を結ぶ。

$\triangle SBC$ は正三角形であるから、 $\angle SCB = 60^\circ$

- ④ 半直線 ℓ と半直線 CS との交点が A である。

- 3 図形を直線にそって転がすと、図形は回転の中心を
 $B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ の順に変えながら回転移動をくり返
す。このとき、点 A は回転の中心となっている頂点
との距離を半径とする弧をえがいて移動する。

- 4 (1) 頂点 A は、次の 2 つの弧をえがいて移動する。



- ① 点 C を中心とする半径 AC の弧
② 点 B を中心とする半径 AB の弧
(最後の回転移動で点 A は動かない)

- (2) 頂点 B は、次の 2 つの弧をえがいて移動する。

- ① 点 C を中心とする半径 BC の弧
(次の回転移動で点 B は動かない)
② 点 A を中心とする半径 AB の弧

- (3) 頂点 B が通過した跡にできる線は、半径 4cm、
中心角 135° のおうぎ形 2 つ分である。

$$2\pi \times 4 \times \frac{135}{360} \times 2 = 6\pi (\text{cm})$$



- 5 求める図形の面積は、右の
図の色のついた部分の面積を
4 倍したものである。
右の図の色のついた部分の面
積は、

$$\pi \times 3^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{4}\pi - \frac{9}{2} (\text{cm}^2)$$



よって、求める面積は、

$$4 \times \left(\frac{9}{4}\pi - \frac{9}{2} \right) = 9\pi - 18 (\text{cm}^2)$$

- 6 (1) 点 A が動いた長さは、図のおうぎ形 CAA' の
 $\widehat{AA'}$ の長さになるから、

$$2\pi \times 10 \times \frac{90}{360} = 5\pi (\text{cm})$$

- (2) 次の図のように、おうぎ形と三角形に分けて考え
る。



求める面積は、

$$\text{おうぎ形 CAA}' + \triangle ABC$$

$$- (\text{おうぎ形 CBB}' + \triangle A'B'C)$$

ここで、 $\triangle ABC$ と $\triangle A'B'C$ は合同だから、求める
面積は、


$$\text{おうぎ形 CAA}' - \text{おうぎ形 CBB}'$$

$$\text{おうぎ形 CAA}' \text{ の面積} \cdots \pi \times 10^2 \times \frac{90}{360} = 25\pi (\text{cm}^2)$$

$$\text{おうぎ形 CBB}' \text{ の面積} \cdots \pi \times 6^2 \times \frac{90}{360} = 9\pi (\text{cm}^2)$$


$$\text{求める面積は、} 25\pi - 9\pi = 16\pi (\text{cm}^2)$$

別解




辺 AB が通過した部分(影の部分)の面積は、上
の図のように、 $\widehat{AA'}$ を延長した弧の上に 2 点 D,
E をとると、図形 ABD は図形 A'B'E と合同に
なるから、求める面積はおうぎ形 CED の面積と
おうぎ形 CBB' の面積との差に等しくなることが
わかる。







p.146~p.147



- 2 (1) $AE \parallel BC$ (2) $AE \perp AB$
(3) $\angle ABC = \angle EAB$



- 4 (1) 例 対称移動, ウ
平行移動, キ
(2) 例 回転移動, セ
対称移動, タ




解説

- 1 (2) 直線の一部で、両端のあるものを線分という。
(3) 点 A を端として、点 B を通り、点 B の方にのびた線をひく。

- 2 (1) 四角形 ABCD は長方形なので、向かい合う辺は平行であるから、 $AD \parallel BC$ となる。
(2)(3) 四角形 ABCD は長方形なので、 $\angle EAB$, $\angle ABC$ は直角であるから、 $AE \perp AB$, $\angle ABC = \angle EAB$ となる。

- 3 (1) 点 A から右に 3 進むと直線 l だから、さらに、右に 3 進んだ点が点 A に対応する点 D である。点 E, F も同じように考える。
(2) 点 G は点 A から左に 1, 下に 8 だけ移動した点だから、点 B, C も同様に左に 1, 下に 8 だけ移動させる。
(3) $\angle KJM = 90^\circ$ だから、点 J から右に 1, 下に 4 のところが点 M である。点 N も同じように考える。

- 4 (1) 直線 l を対称の軸としてウに対称移動させ、キまで平行移動させる。ほかに、オまで平行移動させてから、点 A を回転の中心として回転移動(点対称移動)させるなどの方法も考えられる。



- (2) 点 B を回転の中心として回転移動させてセに移動させ、直線 m を対称の軸としてタに対称移動させる。ほかに、点 C を回転の中心として回転移動させてエに移動させ、タまで平行移動させるなどの方法も考えられる。

- 5 (1) ① 点 P を中心とする円をかき、線分 AB との交点を Q, R とする。
② 2 点 Q, R をそれぞれ中心として、等しい半

径の円をかき、その交点を S とする。

③ 直線 PS をひく。

(2) ① 2 点 A, B を、それぞれ中心として、等しい半径の円をかき、その交点を C, D とする。

② 直線 CD をひく。

(3) 点 A から辺 BC への垂線を作図するのに、辺 BC の長さが不足するので、線分 BC を点 C のほうへ延長した直線をはじめにひく。つづいて、垂線を作図し、これとの交点を H とする。


(4) 線分 BC の垂直二等分線を作図し、線分 BC との交点を M とし、線分 AM をひく。

(5) 2 点 A, B から等しい距離になる点の集合は、線分 AB の垂直二等分線である。この垂直二等分線と円 O との交点が P となる。点 P は 2 つあることに注意する。

(6) 下の図のように、点 B から直線 ℓ への垂線 m を作図し、直線 ℓ との交点を Q とする。


$BQ = QB'$ となる点 B' を垂線 m 上にとり、点 A と点 B' を結ぶ。

線分 AB' と直線 ℓ との交点が P となる。




p.148~p.149


1 (1)




(2)



(3)



(4)




2 (1)

線分 BF

(2) $\angle FCE$

(3) 右の図



3 (1)

$27\pi\text{cm}^2$

(2) 210°

(3) 4cm

4 (1)


周... $24\pi\text{cm}$

面積... $16\pi\text{cm}^2$

(2) 周... $8\pi\text{cm}$

面積... $8\pi - 16(\text{cm}^2)$

5 (1)



(2) 長さ... $2\pi\text{cm}$

面積... $\frac{16}{3}\pi\text{cm}^2$

解 説

1



(3) 線分 AB と半直線 AD から等しい距離にある点は、 $\angle DAB$ の二等分線上にあり、線分 AB と半直線 BC から等しい距離にある点は、 $\angle ABC$ の二等分線上にある。この 2 直線の交点を P とし、この点から線分 AB に垂線 PQ をひいて、これを半径とする円をかく。

- (4) 弧 AB 上に点 C をとり、線分 AC の垂直二等分線と線分 BC の垂直二等分線の交点を P として、半径 PA の円をかく。


2 (3) (2)より、 $\angle FCB = \angle FCE$

よって、折り目の線分 CF は $\angle ECB$ の二等分線になるので、次のように作図することができる。

- ① 点 C を中心として、半径 BC の円をかき、辺 AD との交点を E とする。
- ② 2 点 B, E をそれぞれ中心として、等しい半径の円をかき、その交点と点 C を結ぶ。(下の図 2 のように、点 C から等しい距離にある点を取りなおして角の二等分線を作図してもよい。)
- ③ ②の半直線と辺 AB との交点を F とする。



別解 2 点 B, E は、線分 CF を対称の軸とする線対称な図形の対応する点である。よって、線分 BE の垂直二等分線が折り目の線 CF となることを利用して作図することもできる。



3 (1) $\pi \times 9^2 \times \frac{120}{360} = 27\pi (\text{cm}^2)$

- (2) 中心角の大きさを x° とすると、

$$\pi \times 6^2 \times \frac{x}{360} = 21\pi \text{ より、} x = 210$$

- (3) 半径を $r \text{ cm}$ とすると、

$$2\pi \times r \times \frac{45}{360} = \pi \text{ より、} r = 4 (\text{cm})$$

4 (1) (周の長さ) = (半径 6cm の円周の長さ) + (半径 2cm の円周の長さ) + (半径 4cm の円周の長さ)

したがって、周の長さは、

$$2\pi \times 6 + 2\pi \times 2 + 2\pi \times 4 = 24\pi (\text{cm})$$

面積は、半径 6cm の円の面積から半径 2cm の円の面積と半径 4cm の円の面積をひいたものだから、

$$\pi \times 6^2 - \pi \times 2^2 - \pi \times 4^2 = 16\pi (\text{cm}^2)$$

- (2) 周の長さは、半径 2cm の円の円周の長さ 2 つ分であるから、


$$2\pi \times 2 \times 2 = 8\pi (\text{cm})$$

また、アの部分の面積は、半径 2cm で中心角 90° のおうぎ形の面積から、直角をはさむ辺が 2cm の直角二等辺三角形の面積をひいたものなので、


$$\pi \times 2^2 \times \frac{90}{360} - 2 \times 2 \times \frac{1}{2} = \pi - 2 (\text{cm}^2)$$

求める面積は、アの 8 個分なので、

$$8(\pi - 2) = 8\pi - 16 (\text{cm}^2)$$



5 (1) 頂点 A は、次の 3 つの弧をえがいて移動する。




- ① 点 B を中心とする半径 AB の弧
 ② 点 C を中心とする半径 AC の弧
 ③ 点 E (点 B) を中心とする半径 DE (半径 AB) の弧


- (2) 頂点 D が動いた長さは、上の図の③の弧 DD' の長さになるから、

$$2\pi \times 3 \times \frac{120}{360} = 2\pi (\text{cm})$$

辺 DF が通過した部分の面積は、下の図の色をつけた部分になる。



次の図のように、おうぎ形と三角形に分けて考える。



求める面積は、

$$\text{おうぎ形 EFF}' + \triangle DEF - (\text{おうぎ形 EDD}' + \triangle D'EF')$$

ここで、 $\triangle DEF$ と $\triangle D'EF'$ は合同だから、求める面積は、

$$\begin{aligned} & \text{おうぎ形 EFF}' - \text{おうぎ形 EDD}' \\ &= \pi \times 5^2 \times \frac{120}{360} - \pi \times 3^2 \times \frac{120}{360} \\ &= \frac{25}{3}\pi - 3\pi = \frac{16}{3}\pi (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

17 いろいろな立体

p.150~p.153

- ① (1) ア 円錐 イ 四角柱 [直方体]
 ウ 四角錐 エ 球
 オ 三角錐 カ 円柱


(2) A…頂点, B…側面, C…底面

- ② (1) 三角柱
 (2) 四角錐

- ③ (1) ウ, 五角柱 カ, 六角錐
 (2) ア, 六角柱 オ, 正八面体

- ④ (1) イ
 (2) 正六面体, 正十二面体, 正二十面体

- ⑤ (1) 円錐 (2) 三角柱
 (3) 球



- ⑦ (1) 四角柱 [直方体]
 (2) 点B…点D, 点H 辺AB…辺IH

- ⑧ (1) 三角錐 [四面体]
 (2) 点A…点C, 点E 辺AB…辺CB


- ⑨ 10πcm

解説

- ① (1) ア, ウ, オのようにさきのとがった部分(Aの部分)のある立体は「~錐」とよばれる。イ, カのような立体は「~柱」とよばれる。球は曲面だけでできている。
 (2) さきのとがった部分(Aの部分)は, 頂点とよばれる。「~錐」とよばれる立体でも, 「~柱」とよばれる立体と同じように側面(Bの部分)と底面(Cの部分)がある。ただし, 「~錐」とよばれる立体には, 底面は1つしかない。


- ② (1) 右の図のような立体になる。
 これは, 三角柱である。

側面がすべて長方形である立体は角柱であり, 底面が三角形ならば三角柱, 四角形ならば四角柱, 五角形ならば五角柱, …という。




- (2) 右の図のような立体になる。
 これは, 四角錐である。

側面がすべて三角形である立体は角錐であり, 底面が三角形ならば三角錐, 四角形ならば四角錐, 五角形ならば五角錐, …という。



- ③ (1) 七面体とは, 7つの平面で囲まれた立体である。角柱は底面が2つあるので, $7-2=5$ より, 長方形の側面が5つあるウの五角柱が七面体である。また, 角錐は底面が1つなので, $7-1=6$ より, 三角形の側面が6つあるカの六角錐も七面体である。
 (2) 八面体とは, 8つの平面で囲まれた立体である。(1)と同様に, $8-2=6$ より, 長方形の側面が6つあるアの六角柱が八面体である。また, $8-1=7$ より, 三角形の側面が7つある七角錐も八面体であるが該当する図がない。オの正八面体は正三角形8個で囲まれた立体なので明らかに八面体である。
 ④ (1) アは, 1つの頂点に集まる面の数が3つであり, すべての頂点で同じである。さらに, 4つの面がすべて合同な正三角形でできているから, 正四面体である。イは, 下の図のように, ある頂点に集まる面の数が, 3つのところと4つのところがあり, すべての頂点で数が同じではないので, 正多面体とはいえない。



ウは, 1つの頂点に集まる面の数が4つであり, すべての頂点で同じである。さらに, 8つの面がすべて合同な正三角形でできているから, 正八面体である。

- (2) 正多面体は5つあり, 上記の2つ以外を答える。
 ⑤ (1) 平面図が円なので, 選択肢の中では円柱か円錐か球であることがわかり, 立面図が三角形であることから, 円錐である。
 (2) 平面図が三角形で, 立面図が四角形なので, 三角

柱である。

- (3) 平面図が円なので、選択肢の中では、円柱か円錐か球であることがわかり、立面図も円なので、球である。

- ⑥ 投影図をかくとき、実際に見える辺は実線、見えない辺は破線で表す。


- (1) 正四角錐を真上から見ると、頂点が底面の正方形の対角線の交点になり、側面の辺が対角線にそのまま対応する図形(平面図)となる。立面図は、1つの側面を横から見た形で、二等辺三角形になる。

- (2) (1)を底面の正方形の対角線にそった斜めの方から見てあるので、平面図は、(1)の平面図を45°回転させた図形になる。


また、立面図には、2つの側面が見えて、その2つの側面の共通な辺を、三角形のまん中に実線で縦に書き入れる。

- (3) 立方体はすべての面が正方形なので、立面図も平面図もそれぞれ正方形になる。

- (4) 矢印の方向から見ると、辺 AB は見え、辺 CD は見える。したがって、立面図には辺 AB を破線で、辺 CD を実線でかき入れる。



- ⑦ (1) 展開図を組み立てると、右の図のようになる。(実際に、紙などを使って、同じような展開図をかくて切り取り、組み立ててみるとよい。)




この立体は、四角柱となる。

または、直方体と答えてもよい。

- (2) 右上の図より、点 B と重なる点は2つあって、点 D、点 H となる。…*

右上の図より、点 A と重なる点は2つあって、点 I、点 M となる。これと*から、辺 AB と重なる辺は、辺 IH となる。(展開図から考えて、点 M や点 D をふくむ辺の組み合わせで、あてはまるものは存在しないので、答えは、辺 IH だけとわかる。)

- ⑧ (1), (2) 右の図のように、△BDF を底面とすると、点 A、点 C、点 E を頂点とする三角錐になる。三角錐は平面が4面あるので四面体ということもできる。



図より、辺 AB と重なる辺は辺 CB である。

(展開図から考えて、点 E をふくむ辺の組み合わせには辺 EB に対応するものは存在しないので、答えは、辺 CB だけとわかる。)

- ⑨ 円柱の展開図で、線分 AB の長さは底面の円の周


の長さに等しくなる。

$$2\pi \times 5 = 10\pi(\text{cm})$$


p.154~p.155

確認問題


- ① (1) ア
(2) ア 四角錐 イ 円柱
ウ 四角柱 [直方体] エ 円錐
(3) A…頂点, B…側面, C…底面
- ② (1) ア 七面体 イ 四面体
ウ 六面体
(2) 正二十面体
(3) 正四面体, 正六面体, 正八面体, 正十二面体
- ③ (1) 円柱 (2) 直方体 (3) 四角錐
- ④ (1) 四角柱 [直方体]



- (2) 三角錐



- (3) 四角錐




- ⑤ ㊦ a ㊩ c ㊵ b ㊶ d
- ⑥ (1) 正四角錐
(2) 点 D, 点 H
(3) 辺 ED


解説

- ① (2) アは、さきのとがった形で、底面が四角形なので、四角錐である。

底面が正方形のものを、正四角錐という。



四角錐



四角錐(正四角錐)

四角柱と直方体

四角柱は底面の形が台形でも四角柱というのに対して、底面が長方形の場合を特に直方体という。

したがって、四角柱の方が直方体よりも多くの種類の立体を表している。

次の図で、図1は四角柱で、図2は四角柱であり、直方体でもある。

図1






図2




また、どちらも六面体である。

- (3) 右の図はこの立体の見取図を表している。矢印の方向から見てから、辺OBは手前側に、辺ODは向こう側になるので、立面図にかき入れる辺OBは実線に、辺ODは破線になる。



- 5 ㊦…正三角錐や正四角錐の側面だと二等辺三角形が正解となる。

- 6 (1) 展開図を組み立てると、右の図のようになる。この立体は、四角錐となる。




- (2) 右の図のように、点Bと重なる点は2つあって、点D、点Hとなる。
- (3) 図より、辺GHと重なる辺は辺EDである。


- 2 (1) 面の数を数える。

- (2) 正二十面体は合同な正三角形が20個集まってできた多面体である。


- (3) 正多面体は以下の5種類しかない。




正四面体




正六面体



正八面体



正十二面体



正二十面体


- 3 (1) 立面図や平面図が円で表されるのは、円柱、円錐、球である。円と四角形なので、円柱である。

- (2) どちらも四角形であることから、直方体とわかる。どちらも合同な長方形の場合は、円柱の可能性もある。

- (3) 立面図が三角形であることから、錐体が予想される。平面図が四角形なので四角錐となる。

- 4 (1) 類題6(4)と同じように考える。

- (2) 右の図の平面図で、○印をつけた辺は側面の三角形の辺を表している。この辺は立面図では手前側になるので、○印の実線で表される線をかき入れる。




18 空間内の平面と直線 / 立体の構成

p.156~p.161

- 1 (1) 決まらない。 (2) 決まらない。
 (3) 決まる。 (4) 決まる。
 (5) 決まる。 (6) 決まらない。
 (7) 決まる。 (8) 決まらない。

- 2 (1) 決まらない。
 (2) A, B, D B, C, D C, A, D
 (順不同)

- 3 (1) 右の図
 (2) 直線 BF, 直線 EF,
 直線 CG, 直線 HG



- 4 (1) 直線 DC
 (2) 直線 OA, 直線 AD, 直線 OB, 直線 BC
 (3) 直線 OC, 直線 OD
 (4) 直線 OB, 直線 OC, 直線 OD, 直線 AB,
 直線 AD
 (5) 直線 BC, 直線 DC

- 5 (1) 直線 AB, 直線 BC, 直線 CD, 直線 DA
 (2) 直線 AE, 直線 BF, 直線 CG, 直線 DH
 (3) 直線 EF, 直線 FG, 直線 GH, 直線 HE
 (4) 平面 AEHD, 平面 BFGC
 (5) 平面 ABCD, 平面 AEFB

- 6 (1) 辺 AC (2) 辺 BD

- 7 (1) 平面 DEF
 (2) 平面 ABC, 平面 DEF, 平面 ABED,
 平面 ADFC

- (3) 平面 ABC, 平面 DEF

- 8 (1) 平面 ABCD
 (2) 平面 CGHD
 (3) 平面 BFEA, 平面 BFGC, 平面 CGHD,
 平面 AEHD
 (4) 平面 ABCD, 平面 BFGC, 平面 EFGH
 (5) 平面 ABCD, 平面 BFEA, 平面 EFGH,
 平面 CGHD, 平面 AEHD


- 9 (1) 三角柱 (2) 四角柱 (3) 円柱

- 10 (1) 円柱 (2) 長方形 (3) 円

- 11 (1)



- (2)



- 12 (1) 球 (2) 円
 (3) 図形…円


最大になるとき…切り口の平面が球の中心を通るとき

- 13 (1) 六角柱
 (2) 線分 AB…母線 線分 AB の長さ…高さ

- 14 (1) 三角錐 (2) 五角錐


解説

- 1 (1) 2点 A, B を通るということは、その2点を通る直線をふくむ平面を考えると同じである。右の図のように、2点 A, B を通る直線をふくむ平面はたくさんあり、平面は1つに決まらない。




- (2) 同じ直線上にある3点 A, B, C を通るということは、その3点を通る直線をふくむ平面を考えると同じである。(1)と同じで、平面は1つに決まらない。


- (3) 同じ直線上にない3点 A, B, C を通る場合、右の図のようになり、平面は1つに決まる。




- (4) 直線 ℓ をふくみ、その直線上にない点 A を通る場合、右の図のようになり、平面は1つに決まる。




- (5) 交わる2直線 ℓ, m をふくむ場合、右の図のようになり、平面は1つに決まる。




- (6) 1点で交わる3直線 ℓ, m, n をふくむ場合、右の図のように、条件を満たす平面ができないことがあり、平面は1つに決まらない。



- (7) 平行な2直線 ℓ, m をふくむ場合、右の図のようになり、平面は1つに決まる。




- (8) 平行な3直線 ℓ, m, n をふくむ場合、右の図のように、条件を満たす平面ができないことがあり、平面は1つに決まらない。



- 2 (1) 同じ直線上にない3点 A, B, C によって、平面はただ1つに決まる(平面 P)。

点 D は平面 P 上にないので、4点を通るような平面は存在しない。したがって、平面は決まらない。

(2) 同じ直線上にない3点が決まれば平面が1つに決まるので、3点A, B, D, または3点B, C, D, または3点C, A, Dのいずれかが決まるとき、平面が1つに決まる。




3 (2) 直線ADと交わらず、しかも平行でない直線がねじれの位置にある直線である。したがって、(1)で選んだ直線と直線AD自身以外の直線である。

4 (1) 底面の四角形ABCDは正方形だから、直線ABと平行な直線は、直線DCである。


(2) 直線ABと交わる直線は、図から頂点Aで交わる直線OAと直線AD、頂点Bで交わる直線OBと直線BCである。

(3) 直線ABとねじれの位置にある直線は、右の図のように、直線OC、直線ODである。(1)と(2)の答え以外の直線が、ここでの答えになっている。)




(4) 直線OAと交わる直線は、下の図から頂点Oで交わる直線OBと直線OCと直線OD、頂点Aで交わる直線ABと直線ADである。

(5) 直線OAとねじれの位置にある直線は、右の図のように、直線BC、直線DCである。(直線OAと平行な直線はないので、(4)の答え以外の直線が、ここでの答えになる。)



5 (1) 右の図の○印で示すように、平面ABCD上にある直線は、直線AB、直線BC、直線CD、直線DAの4本ある。




(2) 上の図の△印で示すように、平面ABCDと垂直に交わる直線は、直線AE、直線BF、直線CG、直線DHの4本ある。

(3) 上の図の●印で示すように、平面ABCDと平行な直線は、直線EF、直線FG、直線GH、直線HEの4本ある。

(4) 直線HGと垂直に交わる平面は、平面AEHDと平面BFGCである。

(5) 直線HGと平行な平面は、平面ABCDと平面AEFBである。

6 (1) 底面：面BCD (2) 底面：面ABC



7 (1) 柱体では、底面どうしは平行な位置関係にある。面ABCはこの三角柱の底面だから、平面ABCと平行な平面は、平面DEFである。

(2) 平面BEFCにはほかのすべての平面が交わっている。したがって、平面BEFCと交わる平面は、平面ABC、平面DEF、平面ABED、平面ADFCである。

(3) 柱体では、底面と側面は垂直な位置関係にある。面BEFCはこの三角柱の側面だから、平面BEFCと垂直な平面は、底面にあたる平面ABC、平面DEFである。


8 (1) 柱体では、底面どうしは平行な位置関係にある。面EFGHはこの四角柱の底面だから、平面EFGHと平行な平面は、平面ABCDである。

(2) もとの立体は立方体なので、向かい合う面どうしは平行な位置関係にある。もとの立方体で面BFEAと平行な面に対応するこの立体の面は、面CGHDになる。よって、平面BFEAと平行な平面は、平面CGHDである。

(3) 柱体では、底面と側面は垂直な位置関係にあり、この2つの平面は交わる。面EFGHはこの四角柱の底面だから、平面EFGHと交わる平面は、平面BFEA、平面BFGC、平面CGHD、平面AEHDである。(2つの平面の位置関係は、平行か交わるかのどちらかなので、(1)以外の面が答えになる。)

(4) もとの立体は立方体なので、となり合う面どうしは垂直な位置関係にある。もとの立方体に対応して、面CGHDととなり合う面にあたるものを答える。したがって、平面CGHDと垂直な平面は、平面ABCD、平面BFGC、平面EFGHである。

(5) 面BFGCととなり合う面は交わるので、平面BFGCと交わる平面は、平面ABCD、平面BFEA、平面EFGH、平面CGHDである。また、下の図のように、直線ADと直線BCとの交点をP、直線EHと直線FGとの交点をQとすると、平面BFGCと平面AEHDは直線PQで交わる。




9 ある形の面を垂直な方向に一定の距離だけ平行に動

かしてできる立体は、角柱や円柱になる。


- 10 (1) 円柱 (2) 長方形 (3) 円



- 11 (1) 回転させる前の図形を、右の図の影をつけた部分のように、大きい直角三角形から小さい直角三角形を除いた図形に分けて考える。直角三角形を回転させるとできる回転体は円錐だから、見取図は、大きい円錐から小さい円錐を除いた立体になる。




- (2) 回転させる前の図形を、右の図の影をつけた部分のように、2つの長方形に分けて考える。長方形を回転させるとできる回転体は円柱であるから、見取図は、2つの円柱を重ねた立体になる。




- 12 (2)(3) 球を、回転の軸をふくむ平面で切っても、回転の軸に垂直な平面で切っても、図1のように切り口の図形は円である。

切り口の面積が最大になるのは、切り口の平面が球の中心を通るときで、図2において、円の面積は $A < B < C$ で C が最大となる。




- 13 (1) できる立体は右の図のような六角柱となる。

- (2) この線分 AB を母線といい、この線分 AB の長さは右の図からわかるように、この六角柱の高さを表す。



- 14 (1) 三角錐 (2) 五角錐



p.162~p.163

確認問題

- 1 エ, オ

- 2 (1) 直線 FB, 直線 GC, 直線 HD
(2) 直線 DA, 直線 EA, 直線 CB, 直線 FB, 直線 CD

- (3) 直線 AD, 直線 AE, 直線 BF, 直線 BC, 直線 AB

- 3 (1) 直線 OA, 直線 OB, 直線 OE, 直線 BC, 直線 ED, 直線 AB, 直線 AE
(2) 平面 OCD, 平面 ODE, 平面 OEA, 平面 OAB

- 4 (1) 平面 EDJK
(2) 平面 ABCDEF, 平面 GHIJKL
(3) 辺 AG, 辺 BH, 辺 CI, 辺 DJ, 辺 EK, 辺 FL

- 5 ア, 円 ウ, 五角形

- 6 (1) 立体…円柱 切り口…長方形
(2) 立体…球 切り口…円
(3) 立体…円錐 切り口…二等辺三角形

- 7 (1) ア (2) エ (3) ウ

- 8 (1) 円錐 (2) 母線

解説

- 1 ア…1 点が直線上にあるときは決まらない。

イ…同じ直線上だから決まらない。

ウ…5 点のうち 3 点が同じ直線上にない場合を考えると、残りの 2 点が 3 点のつくる平面上にあれば、5 点を通る平面は存在する。このように、特別な場合だけ平面が 1 つに決まるので、平面がかならず 1 つに決まるとはいえない。

エ…2 直線が交わっていれば平面はかならず 1 つに決まる。


オ…「ある直線とその直線上にない 1 点が決まるとき」と同じだから、平面はかならず 1 つに決まる。

カ…1 つの直線と、その直線上にない 1 点で平面が 1 つだけ決まるので、残りの 1 点とその平面上にないとき、平面は決まらない。

- 2 (1) この四角柱の高さにあたる線分 EA に対応する直線になるので、これと平行な直線は、直線 FB, 直線 GC, 直線 HD である。

- (2) 直線 AB と交わる

直線は、図から頂点 A で交わる直線 DA と直線 EA, 頂点 B で交わる直線 CB, 直線 FB がある。また、線分 AB と線分 CD は延長すると交わるので、




直線 CD も直線 AB と交わる。

- (3) 直線 GH と平行なのは直線 CD, 直線 GH と交わるものは直線 GC, 直線 GF, 直線 HD, 直線 HE, 直線 EF である。これら以外が直線 GH とねじれの位置にある直線になる。

- 3 (1) 平面 OCD と平行になる直線はなく, 平面 OCD 上の直線である直線 OC, 直線 CD, 直線 OD 以外のすべての直線と交わる。

- (2) 直線 BC をふくむ平面である平面 OBC, 平面 ABCDE 以外の平面と直線 BC は交わる。


- 4 (1) 正六角柱を真上から見ると, 右の図のようになる。四角形 ABDE は長方形なので, $AB \parallel ED$ したがって, 平面 ABHG と平面 EDJK は平行になる。




- (2)(3) 角柱は, 2つの底面が平行であり, 辺 AG や辺 BH などが高さになる。

- 5 面を平行に動かしてできる立体は, 2つの底面の形が同じなのでイ以外。アの底面の形は円, ウは五角形。


- 6 (1) 下の図のように, 1回転させてできる立体は円柱で, 切り口は長方形になる。




- (2) 下の図のように, 1回転させてできる立体は球で, 切り口は円になる。



- (3) 下の図のように, 1回転させてできる立体は円錐で, 切り口は二等辺三角形になる。




- 7 (1) 回転させる前の図形は, 右の図のように, 長方形から直角三角形をひいた図形になる。長方形を回転させるとできる回転体は円柱で, 直角三角形を回転させるとできる回転体は円錐になるから, 見取図は, 円柱から円錐を取り除いた立体




になる。


- (2) 回転させる前の図形は, 右の図のように, 2つの直角三角形を組み合わせた図形になる。直角三角形を回転させるとできる回転体は円錐になるから, 見取図は, 2つの円錐を重ねた立体になる。



- (3) 回転させる前の図形は, 右の図のように, 大きい長方形から小さい長方形をひいた図形になる。長方形を回転させるとできる回転体は円柱になるから, 見取図は, 大きい円柱から小さい円柱を取り除いた立体になる。




- 8 (2) 線分 PQ を母線という。また, 円錐を底面に平行な平面で切ると切り口は円になり, 頂点を通り底面に垂直な平面で切ると切り口は二等辺三角形になる。



19 立体の体積と表面積 / 空間図形の利用

p.164~p.169

- ① (1) 196cm^3 (2) 208cm^3
 (3) 324cm^3 (4) $468\pi\text{cm}^3$
- ② (1) 68cm^3 (2) 192cm^3
 (3) $480\pi\text{cm}^3$ (4) $600\pi\text{cm}^3$
- ③ $324\pi\text{cm}^3$
- ④ (1) $972\pi\text{cm}^3$ (2) $18\pi\text{cm}^3$
 (3) $\frac{1372}{3}\pi\text{cm}^3$ (4) $\frac{1024}{3}\pi\text{cm}^3$
- ⑤ (1) 180cm^2 (2) 12cm^2
 (3) 204cm^2
- ⑥ (1) 128cm^2 (2) 150cm^2
 (3) 510cm^2
- ⑦ (1) $140\pi\text{cm}^2$ (2) $49\pi\text{cm}^2$
 (3) $238\pi\text{cm}^2$
- ⑧ (1) 240cm^2 (2) 100cm^2
 (3) 340cm^2
- ⑨ (1) $12\pi\text{cm}$ (2) 120°
 (3) $108\pi\text{cm}^2$ (4) $144\pi\text{cm}^2$
- ⑩ (1) $133\pi\text{cm}^2$ (2) $36\pi\text{cm}^2$
- ⑪ (1) $324\pi\text{cm}^2$ (2) $400\pi\text{cm}^2$
 (3) $27\pi\text{cm}^2$ (4) $192\pi\text{cm}^2$



解説

- ① (1) (体積) = (底面積) × (高さ) だから、
 $28 \times 7 = 196(\text{cm}^3)$

- (2) 底面積は、 $4 \times 4 = 16(\text{cm}^2)$
 求める体積は、 $16 \times 13 = 208(\text{cm}^3)$

- (3) 底面積は、 $6 \times 6 = 36(\text{cm}^2)$
 求める体積は、 $36 \times 9 = 324(\text{cm}^3)$

別解 縦 6cm 、横 6cm 、高さ 9cm の直方体なので、
 (直方体の体積) = (縦) × (横) × (高さ)
 $= 6 \times 6 \times 9 = 324(\text{cm}^3)$

- (4) 求める体積は、 $\pi \times 6^2 \times 13 = 468\pi(\text{cm}^3)$

- ② 角錐、円錐の体積は、角柱、円柱の体積の $\frac{1}{3}$ である。

- (1) (体積) = $\frac{1}{3} \times (\text{底面積}) \times (\text{高さ})$ だから、

$$\frac{1}{3} \times 17 \times 12 = 68(\text{cm}^3)$$

- (2) 底面が 1 辺 8cm の正方形である正四角錐だから、
 底面積は、 $8 \times 8 = 64(\text{cm}^2)$

$$\text{求める体積は、} \frac{1}{3} \times 64 \times 9 = 192(\text{cm}^3)$$

- (3) 求める体積は、 $\frac{1}{3} \times \pi \times 12^2 \times 10 = 480\pi(\text{cm}^3)$

- (4) 求める体積は、 $\frac{1}{3} \times \pi \times 15^2 \times 8 = 600\pi(\text{cm}^3)$

- ③ できる立体は、底面の半径 9cm 、高さ 12cm の円錐になる。

$$\text{求める体積は、} \frac{1}{3} \times \pi \times 9^2 \times 12 = 324\pi(\text{cm}^3)$$

- ④ 半径 r の球の体積 $\dots \frac{4}{3}\pi r^3$

- (1) $\frac{4}{3}\pi \times 9^3 = 972\pi(\text{cm}^3)$

- (2) $\left(\frac{4}{3}\pi \times 3^3\right) \times \frac{1}{2} = 18\pi(\text{cm}^3)$

- (3) 半径は 7cm である。

$$\frac{4}{3}\pi \times 7^3 = \frac{1372}{3}\pi(\text{cm}^3)$$

- (4) $\left(\frac{4}{3}\pi \times 8^3\right) \times \frac{1}{2} = \frac{1024}{3}\pi(\text{cm}^3)$

- ⑤ (1) 側面は大きな長方形になる。

$$10 \times (5 + 5 + 8) = 180(\text{cm}^2)$$

- (2) 1 つの底面の面積を求める。

$$\frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12(\text{cm}^2)$$

- (3) (表面積) = (側面積) + (底面積) × 2
 $180 + 12 \times 2 = 204(\text{cm}^2)$

- ⑥ (1) 底面を 1 辺 4cm の正四角柱とみると、側面は
 4 つの長方形が並んでいるから、表面積は、

$$6 \times (4 + 4 + 4 + 4) + (4 \times 4) \times 2 = 96 + 32 = 128(\text{cm}^2)$$

- (2) 同じ大きさの正方形が 6 個あるので、
 $(5 \times 5) \times 6 = 150(\text{cm}^2)$

- (3) 側面は 3 つの長方形が並んでいるから、側面積は、
 $15 \times (5 + 12 + 13) = 450(\text{cm}^2)$

底面を底辺 5cm 、高さ 12cm の直角三角形とみると、

$$\text{底面積は、} \frac{1}{2} \times 5 \times 12 = 30(\text{cm}^2)$$


以上より、表面積は、 $450 + 30 \times 2 = 510(\text{cm}^2)$

- ⑦ (1) 側面は次の図のように長方形になる。

$$10 \times 2\pi \times 7 = 140\pi(\text{cm}^2)$$

- (2) $\pi \times 7^2 = 49\pi(\text{cm}^2)$

(3) 表面積は、 $140\pi + 49\pi \times 2 = 238\pi(\text{cm}^2)$



8 (1) 側面は、底辺 10cm、高さ 12cm の二等辺三角形だから、側面積は、 $\left(\frac{1}{2} \times 10 \times 12\right) \times 4 = 240(\text{cm}^2)$

(2) 正四角錐だから、底面は正方形である。

底面積は、 $10 \times 10 = 100(\text{cm}^2)$

(3) 表面積は、 $240 + 100 = 340(\text{cm}^2)$

9 (1) おうぎ形の弧の長さは、底面の円の周の長さと同じから、 $2\pi \times 6 = 12\pi(\text{cm})$

(2) おうぎ形の中心角を x° とすると、

$$(2\pi \times 6) : (2\pi \times 18) = x : 360$$

$$36\pi \times x = 12\pi \times 360 \quad \text{これを解くと、} x = 120$$

参考 おうぎ形の中心角

(2) の 6 は底面の円の半径、18 は円錐の母線の長さ (= おうぎ形の半径) である。

$$\frac{2\pi \times (\text{底面の円の半径})}{2\pi \times (\text{母線の長さ(おうぎ形の半径)})} = \frac{x}{360}$$

この両辺に 360 をかけて、

$$x = 360 \times \frac{(\text{底面の円の半径})}{(\text{母線の長さ})}$$

または、

$$x = 360 \times \frac{(\text{底面の円の半径})}{(\text{おうぎ形の半径})}$$

となる。

(3) 側面積は、 $\pi \times 18^2 \times \frac{120}{360} = 108\pi(\text{cm}^2)$

(4) 底面積は、 $\pi \times 6^2 = 36\pi(\text{cm}^2)$

よって、表面積は、 $108\pi + 36\pi = 144\pi(\text{cm}^2)$

10 (1) おうぎ形の中心角の大きさを x° とすると、

$$(2\pi \times 7) : (2\pi \times 12) = x : 360$$

よって、 $x = 210$

したがって、側面積は、

$$\pi \times 12^2 \times \frac{210}{360} = 84\pi(\text{cm}^2)$$

表面積は、 $84\pi + \pi \times 7^2 = 133\pi(\text{cm}^2)$

別解 1 $S = \frac{1}{2} \ell r$ (ℓ : 弧の長さ、 r : おうぎ形の半径)

を用いると、 $r = 12$ 、 $\ell = 2\pi \times 7 = 14\pi$ より、

$$S = \frac{1}{2} \times 14\pi \times 12 = 84\pi(\text{cm}^2)$$

別解 2 底面積は、 $\pi \times 7^2 = 49\pi(\text{cm}^2)$

側面のおうぎ形の面積を $S\text{cm}^2$ とすると、

側面積は、

$$S : (\pi \times 12^2) = (2\pi \times 7) : (2\pi \times 12)$$

これを解いて、 $S = 84\pi(\text{cm}^2)$

(2) 側面の展開図は、半径 9cm のおうぎ形である。

その中心角の大きさを x° とすると、

$$(2\pi \times 3) : (2\pi \times 9) = x : 360 \quad \text{よって、} x = 120$$

したがって、側面積は、

$$\pi \times 9^2 \times \frac{120}{360} = 27\pi(\text{cm}^2)$$

底面積は、 $\pi \times 3^2 = 9\pi(\text{cm}^2)$

以上より、表面積は、 $27\pi + 9\pi = 36\pi(\text{cm}^2)$

11 半径 r の球の表面積 $\cdots 4\pi r^2$

(1) $4\pi \times 9^2 = 324\pi(\text{cm}^2)$

(2) $4\pi \times 10^2 = 400\pi(\text{cm}^2)$

(3) 球の半分(半球)の表面積を計算するときは、切り口の円の面積を忘れないように注意する。

$$\text{球の表面積の半分} \cdots (4\pi \times 3^2) \times \frac{1}{2} = 18\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{切り口の円の面積} \cdots \pi \times 3^2 = 9\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{求める表面積} \cdots 18\pi + 9\pi = 27\pi(\text{cm}^2)$$

(4) 切り口の円の面積を忘れないように注意する。

半径は 8cm である。

$$\text{球の表面積の半分} \cdots (4\pi \times 8^2) \times \frac{1}{2} = 128\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{切り口の円の面積} \cdots \pi \times 8^2 = 64\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{求める表面積} \cdots 128\pi + 64\pi = 192\pi(\text{cm}^2)$$

12 まず、展開図の各頂点に対応する点を記入する。ひもが頂点 A から頂点 D まで結んだ線分 AD のときももっとも短くなるから、頂点 A から辺 BE、CF を通って頂点 D まで線をひけばよい。

p.170~p.171

確認問題

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 (1) 216cm^3 | (2) $144\pi\text{cm}^3$ |
| 2 (1) 432cm^3 | (2) $320\pi\text{cm}^3$ |
| 3 (1) $\frac{256}{3}\pi\text{cm}^3$ | (2) $9\pi\text{cm}^3$ |
| 4 (1) 144cm^2 | (2) 828cm^2 |
| 5 (1) $90\pi\text{cm}^2$ | (2) $522\pi\text{cm}^2$ |
| 6 (1) 297cm^2 | (2) 160cm^2 |
| 7 (1) $56\pi\text{cm}^2$ | (2) $84\pi\text{cm}^2$ |
| 8 (1) $64\pi\text{cm}^2$ | (2) $18\pi\text{cm}^2$ |
| 9 12cm | |

解説

1 (1) 底面を底辺 9cm、高さ 4cm の三角形とみると、

$$\text{底面積は、} \frac{1}{2} \times 9 \times 4 = 18(\text{cm}^2)$$

$$\text{求める体積は、} 18 \times 12 = 216(\text{cm}^3)$$

(2) 求める体積は、 $\pi \times 6^2 \times 4 = 144\pi(\text{cm}^3)$

- 2 (1) 底面が1辺9cmの正方形である正四角錐だから、
底面積は、 $9 \times 9 = 81(\text{cm}^2)$

$$\text{求める体積は、} \frac{1}{3} \times 81 \times 16 = 432(\text{cm}^3)$$

$$(2) \text{ 求める体積は、} \frac{1}{3} \times \pi \times 8^2 \times 15 = 320\pi(\text{cm}^3)$$

3 (1) $\frac{4}{3}\pi \times 4^3 = \frac{256}{3}\pi(\text{cm}^3)$

$$(2) \left(\frac{4}{3}\pi \times 3^3\right) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 9\pi(\text{cm}^3)$$

4 (1) 側面は4つの長方形が並んでいるから、側面積は、
 $7 \times (4 + 4 + 4 + 4) = 112(\text{cm}^2)$

底面を1辺4cmの正方形とみると、

$$\text{底面積は、} 4 \times 4 = 16(\text{cm}^2)$$

$$\text{以上より、表面積は、} 112 + 16 \times 2 = 144(\text{cm}^2)$$

(2) 側面は3つの長方形が並んでいるから、側面積は、
 $20 \times (9 + 12 + 15) = 720(\text{cm}^2)$

底面を底辺12cm、高さ9cmの直角三角形とみると、

$$\text{底面積は、} \frac{1}{2} \times 12 \times 9 = 54(\text{cm}^2)$$

$$\text{以上より、表面積は、} 720 + 54 \times 2 = 828(\text{cm}^2)$$

5 (1) 展開図にしたときの長方形の横の長さは底面の
円周の長さに等しいから、 $2\pi \times 3 = 6\pi(\text{cm})$

$$\text{よって、側面積は、} 12 \times 6\pi = 72\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{底面積は、} \pi \times 3^2 = 9\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{以上より、表面積は、} 72\pi + 9\pi \times 2 = 90\pi(\text{cm}^2)$$

(2) 展開図にしたときの長方形の横の長さは底面の円
周の長さに等しいから、 $2\pi \times 9 = 18\pi(\text{cm})$

$$\text{よって、側面積は、} 20 \times 18\pi = 360\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{底面積は、} \pi \times 9^2 = 81\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{以上より、表面積は、} 360\pi + 81\pi \times 2 = 522\pi(\text{cm}^2)$$

6 (1) 側面は、底辺9cm、高さ12cmの二等辺三角形
だから、側面積は、 $\left(\frac{1}{2} \times 9 \times 12\right) \times 4 = 216(\text{cm}^2)$

正四角錐だから、底面は正方形である。

$$\text{底面積は、} 9 \times 9 = 81(\text{cm}^2)$$

$$\text{以上より、表面積は、} 216 + 81 = 297(\text{cm}^2)$$

(2) 側面は底辺8cm、高さ6cmの二等辺三角形だから、

$$\text{側面積は、} \left(\frac{1}{2} \times 8 \times 6\right) \times 4 = 96(\text{cm}^2)$$

正四角錐だから、底面は正方形である。

$$\text{底面積は、} 8 \times 8 = 64(\text{cm}^2)$$

$$\text{以上より、表面積は、} 96 + 64 = 160(\text{cm}^2)$$

7 (1) 側面の展開図は、半径10cmのおうぎ形である。
その中心角の大きさを x° とすると、

$$(2\pi \times 4) : (2\pi \times 10) = x : 360 \quad \text{よって、} x = 144$$

したがって、側面積は

$$\pi \times 10^2 \times \frac{144}{360} = 40\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{底面積は、} \pi \times 4^2 = 16\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{以上より、表面積は、} 40\pi + 16\pi = 56\pi(\text{cm}^2)$$

(2) 側面の展開図は、半径8cmのおうぎ形である。

その中心角の大きさを x° とすると、

$$(2\pi \times 6) : (2\pi \times 8) = x : 360 \quad \text{よって、} x = 270$$

したがって、側面積は、

$$\pi \times 8^2 \times \frac{270}{360} = 48\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{底面積は、} \pi \times 6^2 = 36\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{以上より、表面積は、} 48\pi + 36\pi = 84\pi(\text{cm}^2)$$

8 (1) $4\pi \times 4^2 = 64\pi(\text{cm}^2)$

(2) 球の半分の半分(半球の半分)の表面積を計算する
ときは、切り口に2つの半円があるので、この面積
を忘れないように注意する。

球の半分の半分の表面積は、


$$(4\pi \times 3^2) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 9\pi(\text{cm}^2)$$

切り口の2つの半円の面積は、

$$(\pi \times 3^2) \times \frac{1}{2} \times 2 = 9\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{求める表面積は、} 9\pi + 9\pi = 18\pi(\text{cm}^2)$$

- 9 まず、展開図の各頂点に対
応する点を記入する。ひもが
頂点Aから頂点Dまで結んだ
線分ADのときもっとも短く
なるから、展開図に頂点Aか
ら辺OB、OCを通して頂点D
まで線をひく。




$$\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = 20^\circ \text{ より、} \angle AOD = 60^\circ$$

また、 $OA = OD = 12\text{cm}$ だから、 $\triangle OAD$ は正三角形
である。

よって、ひもの長さの線分ADは12cmである。

p.172~p.175

- 1 (1) ㉞ 多面体 ㉞ 正多面体
(2) ㉞ 立面図 ㉞ 平面図
㉞ 投影図
(3) ㉞ 二等辺三角形
(4) ㉞ 平面
(5) ㉞ ねじれ
(6) ㉞ 回転体 ㉞ 母線
(7) ㉞ $\frac{1}{3}Sh$ ㉞ $\frac{4}{3}\pi r^3$
(8) ㉞ おうぎ形 ㉞ 円周
- 2 (1) 四角錐, 五面体 (2) 五角柱, 七面体
- 3 (1) イ, ウ (2) ウ, オ
(3) イ, エ (4) カ
- 4 (1) 三角錐 (2) 四角柱 (3) 円柱
- 5 (1) 点 A, 点 I (2) 辺 CB
- 6 ウ, エ
- 7 (1) 面 AEHD, 面 ABCD, 面 EFGH
(2) 直線 BF, 直線 CG
(3) 直線 AE, 直線 DH, 直線 EF, 直線 GH, 直線 EH
- 8 (1) 円錐 (2) 10cm
(3) 円 (4) 二等辺三角形
- 9 (1) 例  (2) 例 
- 10 (1) 120cm^3 (2) $343\pi\text{cm}^3$
- 11 (1) 336cm^2 (2) 175cm^2
- 12 (1) 3cm
(2) 体積... $45\pi\text{cm}^3$ 表面積... $48\pi\text{cm}^2$
- 13 (1) 160°
(2) 側面積... $36\pi\text{cm}^2$ 表面積... $52\pi\text{cm}^2$
- 14 体積... $\frac{500}{3}\pi\text{cm}^3$ 表面積... $100\pi\text{cm}^2$




解説

- 2 (1) 底面が1つ, 側面が三角形だから角錐である。
底面の形から, 四角錐という。側面が4つあるから面の数は5つ, よって, 五面体ともいう。
- (2) 底面が2つ, 側面が長方形だから角柱である。底面の形から, 五角柱という。側面が5つあるから面の数は7つ, よって, 七面体ともいう。
- 3 (1) イとウが正多面体である。
正多面体は, 正四面体, 正六面体, 正八面体, 正十二面体, 正二十面体の5種類がある。
立方体は, 正六面体である。

多面体の展開図


(正四面体)

正三角形が4個




(正六面体)

正方形が6個




(正八面体)

正三角形が8個



(正十二面体)

正五角形が12個



(正二十面体)


正三角形が20個




- (2) 正四面体は正三角形を4つ組み合わせたもので, 正三角錐は, 底面が正三角形の三角錐である。

(正四面体)

(正三角錐)



4つの面が正三角形




底面が正三角形


- (3) 正四角柱は, 底面が正方形である四角柱である。
単なる四角柱は, 底面が台形であっても長方形であってもよい。

(正四角柱)

(四角柱)



正方形


四角形で
あればよい

- (4) ア～カの中で、曲面だけで囲まれている立体は球だけである。円錐の底面は平面。

- 4 (1) この投影図の見取図は、右の図のようになり、三角錐と考えられる。
(立方体から切り取った形。)

- (2) 平行四辺形を底面とする四角柱である。

- 5 右図で、線でつないだように重なる。




- 6 ア 面 ABC, ABD があり、
1つに決まらない。

- イ 面 ABC, DBC があり、
1つに決まらない。


- ウ 面 ABC 1つだけに決まる。

- エ 面 ABC 1つだけに決まる。


- 7 (1) 面 ABFE と垂直な面は
3つある。



- (2) 面 AEHD と平行な直線は
2本ある。




- (3) 直線 BC と交わる直線、または平行な直線すべてに×をつける。残った5本の直線がねじれの位置にある。




- 8 (1) 右の図のような円錐になる。


- (2) 円錐の側面をえがく線分 AC が母線である。辺 AB は円錐の高さ、辺 BC は底面の半径を表す。



- (3) 右の図のようになる。回転体を、回転の軸に垂直な平面で切ると、切り口は円になる。




- (4) 右の図のようになる。回転体を、回転の軸をふくむ平面で切ると、切り口は回転の軸を対称の軸とする線対称な図形になる。




- 9 見取図の中央に回転の軸をかき、回転させる前の図形を考える。

(1)



(2)



- 10 (1) 底面積は、 $\frac{1}{2} \times (3+7) \times 4 = 20(\text{cm}^2)$

求める体積は、 $20 \times 6 = 120(\text{cm}^3)$

- (2) 求める体積は、 $\frac{1}{3} \times \pi \times 7^2 \times 21 = 343\pi(\text{cm}^3)$

- 11 (1) 側面は3つの長方形が並んでいるから、側面積は、 $12 \times (6+8+10) = 288(\text{cm}^2)$

底面を底辺 8cm、高さ 6cm の直角三角形とみると、

底面積は、 $\frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24(\text{cm}^2)$

以上より、表面積は、 $288 + 24 \times 2 = 336(\text{cm}^2)$

- (2) 側面は4つの二等辺三角形が並んでいるから、側面積は、

$$\left(\frac{1}{2} \times 7 \times 9\right) \times 4 = 126(\text{cm}^2)$$

底面は1辺 7cm の正方形だから、底面積は、 $7 \times 7 = 49(\text{cm}^2)$

以上より、表面積は、 $126 + 49 = 175(\text{cm}^2)$

- 12 (1) 底面の半径を $r\text{cm}$ とすると、展開図の側面の長方形の横の長さは、底面の円周の長さに等しいから、 $2\pi r = 6\pi$ これを解いて、 $r = 3$

- (2) 体積は、 $\pi \times 3^2 \times 5 = 45\pi(\text{cm}^3)$

表面積は、 $5 \times 6\pi + \pi \times 3^2 \times 2 = 48\pi(\text{cm}^2)$

- 13 (1) 弧の長さは、 $2\pi \times 4(\text{cm})$

半径 9cm の円周の長さは、 $2\pi \times 9(\text{cm})$

$$(2\pi \times 4) : (2\pi \times 9) = x : 360$$

これを解いて、 $x = 160$

- (2) 側面積は、 $\pi \times 9^2 \times \frac{160}{360} = 36\pi(\text{cm}^2)$

底面積は、 $\pi \times 4^2 = 16\pi(\text{cm}^2)$

表面積は、 $36\pi + 16\pi = 52\pi(\text{cm}^2)$

- 14 体積は、 $\frac{4}{3} \pi \times 5^3 = \frac{500}{3} \pi(\text{cm}^3)$

表面積は、 $4\pi \times 5^2 = 100\pi(\text{cm}^2)$

- 15 まず、展開図の各頂点に対応する点を記入する。ひもが頂点 A から向かいあう頂点 B まで結んだ線分 AB のときもっとも短くなるから、頂点 A から向かいあう頂点 B まで線をひけばよい。

p.176~p.177

- 1 (1) ア 2 イ 2 ウ 2
 (2) 記号…イ
 説明…例 1つの頂点に集まる面の数がどこも同じではないから。
- 2 (1) ウ (2) ア
- 3 12cm
- 4 ア, イ, ウ
- 5 (1) 9cm^3 (2) $\frac{27}{2}\text{cm}^2$ [13.5cm^2]
 (3) 2cm
- 6 2cm
- 7 (1) 4cm (2) $56\pi\text{cm}^2$
- 8 $9\pi\text{cm}^3$

解説

- 1 (1) それぞれの立体の面の数, 辺の数, 頂点の数は次のようになる。

	面の数	辺の数	頂点の数
ア	4	6	4
イ	6	9	5
ウ	8	12	6


どの場合も, 次の式が成り立つ。

$$(\text{面の数}) - (\text{辺の数}) + (\text{頂点の数}) = 2$$


- (2) アは正四面体, ウは正八面体である。正多面体には, 次の条件がある。

- ① どの面も合同な正多角形である。
 ② どの頂点にも面が同じ数だけ集まっている。
 イの六面体は, 条件①にはあてはまるが, 4つの面が集まる頂点と, 3つの面が集まる頂点があるため, 条件②にあてはまらない。

- 2 展開図を組み立てると, 右の図のようになる。(組み立て方によって, 2通り考えられる)



- 3 まず, 展開図の各頂点に対応する点を記入する。展開図には辺 BC が 2 本あるから, 点 P が記入されていない辺を辺 B'C' とする。辺 B'C' の点 P を P' とし, 記入する。ひもが点 P から点 P' まで結んだ




線分のときももっとも短くなるから, 展開図に点 P から辺 AC, AD, BD を通って点 P' まで線をひく。このとき, 線分 PP' は線分 BB', CC' と平行, また四角形 BCC'B' は平行四辺形だから, ひもの長さの線分 PP' は 12cm である。

- 5 (1) $\triangle APQ$ を底面とすると, 辺 AE が高さになる。

$$\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 3 \right) \times 6 = 9(\text{cm}^3)$$

- (2) 右の展開図より,

$$6 \times 6 - \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 3 + \frac{1}{2} \times 6 \times 3 \times 2 \right) = \frac{27}{2}(\text{cm}^2) \quad [13.5\text{cm}^2]$$



- (3) 求める高さを $x\text{cm}$ とすると, (1), (2) より,

$$\frac{1}{3} \times \frac{27}{2} \times x = 9 \quad x = 2$$

- 6 図 1 より, $\triangle CFG$ を底面, HG を高さと考え, 水の体積は,

$$\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 10 \times 12 \right) \times 15 = 300(\text{cm}^3)$$

- 図 2 で, 水の深さを $x\text{cm}$ とすると,

$$10 \times 15 \times x = 300 \quad x = 2$$

- 7 (1) 底面の円が, 円 O の円周上を 2 回半回転しながら 1 周するから, 底面の半径を $r\text{cm}$ とすると,

$$2\pi r \times 2.5 = 2\pi \times 10 \quad r = 4$$

- (2) 円錐の側面のおうぎ形の中心角を x° とすると,

$$(2\pi \times 4) : (2\pi \times 10) = x : 360$$

これを解くと, $x = 144$

$$\text{側面積は, } \pi \times 10^2 \times \frac{144}{360} = 40\pi(\text{cm}^2)$$

$$\text{表面積は, } 40\pi + \pi \times 4^2 = 56\pi(\text{cm}^2)$$

別解 側面積の計算で, $\frac{144}{360}$ を, $\frac{2\pi \times 4}{2\pi \times 10}$ としても

$$\text{よい。}\pi \times 10^2 \times \frac{2\pi \times 4}{2\pi \times 10} = \pi \times 10 \times 4 = 40\pi(\text{cm}^2)$$

円錐の母線の長さを ℓ , 底面の半径を r , 側面積を S とすると, 次の式が成り立つ。

$$S = \pi \ell r$$

- 8 半球から円錐を取り除いた立体である。

$$\left(\frac{4}{3} \pi \times 3^3 \right) \times \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 3 = 9\pi(\text{cm}^3)$$

p.178~p.179

1 ① 1 ② 3 ③ 6 ④ 7


⑤ 五角柱 ⑥ 四角錐

2 (1) 点 I, 点 G (2) 辺 GF

(3) 平面㊦, 平面㊧, 平面㊨

3 (1) 右図

(2) エ



4 ア, エ

5 イ, オ

6 (1) 直線 CF
(2) 直線 AB, 直線 AC, 直線 AD
(3) 辺 DF [辺 AC]

7 (1) エ (2) ア

8 24cm^3


解説

- 1 ① 角錐の底面は1つである。
 ② 側面の数は、底面の辺の数と同じである。
 ③ 角錐の辺の数は、底面の辺の数の2倍である。
 ④ 角錐の頂点の数は、底面の頂点の数より1多い。
 ⑤ 底面が2つあるから柱体で、側面が5つあるから五角柱である。
 ⑥ 底面が1つだから錐体で、側面が4つあるから四角錐である。


参考 N角柱とN角錐の面, 辺, 頂点の数

立体	N角柱	N角錐
底面の数	2	1
側面の数	N	N
辺の数	3N	2N
頂点の数	2N	N+1

- 2 (1) 右の図の矢印のように、点Aは点Iと、点Iは点Gと重なる。
 したがって、点Aと重なるのは、点Iと点Gである。
 (2) 点Bは点Dと、点Dは点Fと重なるので、辺ABと重なる辺は辺GFである。
 (3) ㊦ととなり合う平面は、㊩, ㊧, ㊨となる。




- 3 (1) 正四角錐の底面は正方形である。したがって、真上から見たとき正四角錐の頂点が、正方形の対角線の交点になる。




- (2) 右の図のような正八面体も平面図は同じになる。


4 参考 立方体の展開図は、次の11種類である。




5 ア




イ




ウ




エ



オ




- 6 (2) 右の図のように、直線EFと交わる直線、または平行な直線すべてに×をつける。残った3本の直線がねじれの位置にある。




- (3) 面BEFCに垂直で、点Dを通る線分DFの長さが距離を表す。また、 $AC = DF$ である。

- 7 見取図の中に回転の軸をかき、回転させる前の図形を考える。

(1)




(2)



- 8 右の図のようになる。底面を $\triangle FGH$ とすると、高さは、線分 $PG (= 4\text{cm})$ である。

底面積は、 $\frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18(\text{cm}^2)$

体積は、 $\frac{1}{3} \times 18 \times 4 = 24(\text{cm}^3)$



p.180~p.181

- 1 (1) 50cm^3 (2) 240cm^2
 (3) 体積… $36\pi\text{cm}^3$ 表面積… $36\pi\text{cm}^2$
 2 (1) 体積… $480\pi\text{cm}^3$ 表面積… $336\pi\text{cm}^2$
 (2) 体積… $256\pi\text{cm}^3$ 表面積… $240\pi\text{cm}^2$
 3 25cm^2
 4 (1) $8\pi\text{cm}$ (2) 135°
 5 (1) 120° (2) 12cm
 6 (1) 6cm (2) $16\pi\text{cm}^2$
 7 (1) 400cm^3 (2) 360cm^2
 8 16cm

解説

- 1 (1) 底面積は、 $\frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 15(\text{cm}^2)$

よって、体積は、 $\frac{1}{3} \times 15 \times 10 = 50(\text{cm}^3)$

- (2) 右の図の立体である。

側面積は、 $7 \times 6 \times 4 = 168(\text{cm}^2)$

底面積は、 $6 \times 6 = 36(\text{cm}^2)$

以上より、表面積は、

$$168 + 36 \times 2 = 240(\text{cm}^2)$$

- (3) 体積は、 $\frac{4}{3} \pi \times 3^3 = 36\pi(\text{cm}^3)$

表面積は、 $4\pi \times 3^2 = 36\pi(\text{cm}^2)$

- 2 (1) 右の図のような、円柱から円柱を取り除いた立体になる。底面積は、

$$\pi \times 8^2 - \pi \times 4^2 = 48\pi(\text{cm}^2)$$

体積は、 $48\pi \times 10 = 480\pi(\text{cm}^3)$

側面積は、

$$(2\pi \times 8 + 2\pi \times 4) \times 10 = 240\pi(\text{cm}^2)$$

表面積は、 $240\pi + 48\pi \times 2 = 336\pi(\text{cm}^2)$

- (2) 右の図のような、

円柱から円錐を取り除いた立体になる。

体積は、

$$\pi \times 8^2 \times 6 - \frac{1}{3} \times \pi \times 8^2 \times 6 = 256\pi(\text{cm}^3)$$




取り除いた円錐の展開図で、側面になるおうぎ形の中心角を x° とすると、

$$(2\pi \times 8) : (2\pi \times 10) = x : 360$$

これを解くと、 $x = 288$


$$\text{円錐の側面積は、} \pi \times 10^2 \times \frac{288}{360} = 80\pi(\text{cm}^2)$$

求める表面積は、



$$2\pi \times 8 \times 6 + 80\pi + \pi \times 8^2 = 240\pi(\text{cm}^2)$$

- 3 2つの立体の展開図は、次のようになる。



図のように、㉞, ㉜, ㉝の3種類の面はそれぞれ同じである。

よって、表面積の差は、正方形BEFCの面積に等しく、 $5 \times 5 = 25(\text{cm}^2)$

- 4 (1) 側面の長方形の横の長さは、底面の円周の長さに等しいから、 $x = 2\pi \times 4 = 8\pi(\text{cm})$

- (2) 弧の長さは、 $2\pi \times 3(\text{cm})$

半径8cmの円周の長さは、 $2\pi \times 8(\text{cm})$

求める中心角 x° は $(2\pi \times 3) : (2\pi \times 8) = x : 360$

これを解くと、 $x = 135$


- 5 (1) 展開図で、側面になるおうぎ形の弧の長さは底面の円周の長さに等しく、 $2\pi \times 4(\text{cm})$

半径12cmの円周の長さは、 $2\pi \times 12(\text{cm})$

求める中心角 x° は、 $(2\pi \times 4) : (2\pi \times 12) = x : 360$

これを解くと、 $x = 120$

- (2) 円錐の頂点をOとして、母線OAで切ったときの展開図は右の図のようになる。Bは弧の真ん中になり、
 (1)より、 $\angle AOB = 60^\circ$
 $\triangle OAB$ は正三角形になるから、 $AB = 12\text{cm}$



- 6 (1) 底面の円が、円Oの円周上を3回転して1周するから、円Oの半径を $r\text{cm}$ とすると、

$$2\pi \times 2 \times 3 = 2\pi r \quad r = 6$$

- (2) 円錐の展開図で、側面になるおうぎ形の中心角を x° とすると、

$$(2\pi \times 2) : (2\pi \times 6) = x : 360$$

これを解くと、 $x = 120$

$$\text{円錐の側面積は、} \pi \times 6^2 \times \frac{120}{360} = 12\pi(\text{cm}^2)$$


求める表面積は、 $\pi \times 2^2 + 12\pi = 16\pi(\text{cm}^2)$

別解 側面積は、 $\pi \times 6 \times 2 = 12\pi(\text{cm}^2)$

- 7 右の図のような立体である。

- (2) $\frac{1}{2} \times 10 \times 13 \times 4 + 10^2 = 360(\text{cm}^2)$

- 8 球の体積は、 $\frac{4}{3} \pi \times 6^3 = 288\pi(\text{cm}^3)$



これを水中に沈めたとき、水面の上昇は、

$$288\pi \div (\pi \times 12^2) = 2(\text{cm})$$

よって、水面の高さは、 $14 + 2 = 16(\text{cm})$

20 データの活用


p.182~p.185

- ① (1) 最大値…61kg
最小値…37kg
範囲…24kg

(2) 体重の記録

階級(kg)	度数(人)	累積度数(人)
以上 未満		
34 ~ 40	2	2
40 ~ 46	6	8
46 ~ 52	8	16
52 ~ 58	7	23
58 ~ 64	2	25
計	25	

(3) 6kg



- ② (1) 平均値…9.5 本
中央値…9.5 本
最頻値…9 本

(2)


階級(本)	階級値(本)	度数(人)	階級値×度数
以上 未満			
0 ~ 4	2	2	4
4 ~ 8	6	4	24
8 ~ 12	10	8	80
12 ~ 16	14	5	70
16 ~ 20	18	1	18
計		20	196

- (3) 平均値…9.8 本
最頻値…10 本

③ (1)

階級(cm)	一般の生徒		
	度数(人)	相対度数	累積相対度数
以上 未満			
150 ~ 155	12	0.03	0.03
155 ~ 160	88	0.22	0.25
160 ~ 165	140	0.35	0.60
165 ~ 170	104	0.26	0.86
170 ~ 175	48	0.12	0.98
175 ~ 180	8	0.02	1.00
180 ~ 185	0	0	1.00
185 ~ 190	0	0	1.00
計	400	1.00	

(2)



- (3) 例 全体の傾向として、バレーボール部員の方が、一般の生徒よりも身長が高い。

例 バレーボール部員の方が、一般の生徒よりも最頻値が大きい。

④ コインB

⑤ (1)

階級(度)	度数(日)	相対度数	累積相対度数
以上 未満			
20 ~ 25	6	0.20	0.20
25 ~ 30	12	0.40	0.60
30 ~ 35	9	0.30	0.90
35 ~ 40	3	0.10	1.00
計	30	1.00	

(2) 25 度以上 30 度未満

(3) 0.60

解説

- ① (1) データより、最大値は 61kg、最小値は 37kg。

範囲 = 最大値 - 最小値 = 61 - 37 = 24 (kg)

(2) 数え間違いがないように、「正」の字を書くなどして整理し、数え終えた数字を×や／などの印をつけて消去していくとよい。

(3) 40 - 34 = 6 (kg), 46 - 40 = 6 (kg), 52 - 46 = 6 (kg), …となるので、階級の幅は 6kg。

(4) 度数分布多角形では、両端に度数 0 の階級があると考え、線分を横軸までのばす。

- ② (1) 平均値 = $\frac{20 \text{ 人分の筆記用具の総数}}{\text{人数}} = \frac{190}{20} = 9.5 \text{ (本)}$

中央値は、データの個数が 20 で偶数なので、 $20 \div 2 = 10$ より、10 番目と 11 番目の値の平均になる。

データを小さい順に並べると、

3, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, ⑨, ⑩, …より、10 番目の値は 9 本、11 番目の値は 10 本。

したがって、 $\frac{9+10}{2} = 9.5 \text{ (本)}$

最頻値は、データの値の中でもっとも多く現れる値なので、9 本。

(2) 0本以上4本未満の階級の階級値は、 $\frac{0+4}{2}=2$ (本)

4本以上8本未満の階級の階級値は、 $\frac{4+8}{2}=6$ (本)

(3) 度数分布表から平均値を求めるときは、

$$\text{平均値} = \frac{(\text{階級値} \times \text{度数}) \text{の合計}}{\text{度数の合計}} = \frac{196}{20} = 9.8 \text{(本)}$$

度数分布表から最頻値を求めるときは、度数のもっとも多い階級の階級値なので、8本以上12本未満の階級の階級値の10本。

③ (1) 150cm 以上 155cm 未満の階級の相対度数は、

$$\frac{12}{400} = 0.03 \quad \text{累積相対度数も、} 0.03$$

155cm 以上 160cm 未満の階級の相対度数は、

$$\frac{88}{400} = 0.22 \quad \text{累積相対度数は、} 0.03 + 0.22 = 0.25$$

(3) グラフの相対度数の大きい階級をくらべると、バレーボール部員の方が右側にあるので、一般の生徒より身長が高い人が多いことがわかる。

④ 表の出た回数の相対度数は、表の出る確率を表すと考えられるので、これをくらべる。

$$\text{コイン A は、} \frac{483}{1000} = 0.483$$

$$\text{コイン B は、} \frac{590}{1200} = 0.491 \dots$$

したがって、コイン B の方が表が出やすいといえる。

⑤ (1) 25度以上30度未満の階級の度数は、

$$30 - (6 + 9 + 3) = 12 \text{(日)}$$

(3) 20度以上25度未満の階級の相対度数と、25度以上30度未満の階級の相対度数の合計である、25度以上30度未満の階級の累積相対度数を答えればよい。

p.186~p.187

▶ 確認問題


① (1)

階級(cm)	度数(人)	累積度数(人)
以上 120 ~ 150 未満	2	2
150 ~ 180	4	6
180 ~ 210	6	12
210 ~ 240	8	20
240 ~ 270	4	24
計	24	

(2) 210cm 以上 240cm 未満の階級

(3) 6人

(4) 180cm 以上 210cm 未満の階級



② 最大値…15 時間

最小値…3 時間

範囲…12 時間

平均値…7.5 時間

中央値…7 時間

最頻値…8 時間

③ (1)

階級(点)	度数(人)	累積度数(人)
以上 5 ~ 10 未満	6	6
10 ~ 15	4	10
15 ~ 20	12	22
20 ~ 25	16	38
25 ~ 30	2	40
計	40	

平均値…18 点


最頻値…22.5 点

(2) 17.5 点

④ (1) ㉞ 0.12 ㉟ 0.03 ㊱ 0.96

(2) 18%

(3)



(4) 例 全体の傾向として、B 中学校の方が、
A 中学校よりも通学時間が長い。

例 A 中学校の方が、B 中学校よりも範囲がせまい。

- 5 (1) ㊦ 0.19 ㊩ 0.17
(2) 0.17

解 説

1 (1) 例えば、データの「150」は、120cm 以上 150cm 未満の階級ではなく、150cm 以上 180cm 未満の階級にはいることに注意する。

(2) 記録が 210cm の生徒は、180cm 以上 210cm 未満の階級ではなく、210cm 以上 240cm 未満の階級にはいる。

(3) 表の 150cm 以上 180cm 未満の階級の累積度数を答えればよい。

(4) 記録が短い順ではなく、長い順から数えていることに注意する。

240cm 以上 270cm 未満の階級に 4 人

210cm 以上 240cm 未満の階級に 8 人

合計すると、 $4+8=12$ (人)

15 人には不足しているので、次の階級の人数を読みとる。

180cm 以上 210cm 未満の階級に 6 人

合計すると、 $12+6=18$ (人)

これで 15 人をこえるので、15 番目の生徒はこの階級にはいることがわかる。

2 データより、最大値は 15 時間、最小値は 3 時間。

範囲 = 最大値 - 最小値 = $15-3=12$ (時間)

平均値 = $\frac{8+5+5+3+10+8+4+15+6+8+6+12}{12}$

$$= \frac{90}{12} = 7.5(\text{時間})$$

中央値は、データが 12 個なので、値の小さい順に並べたとき、6 番目と 7 番目の値の平均になる。

3, 4, 5, 5, 6, ⑥, ⑧, 8, 8, 10, 12, 15

$$\frac{6+8}{2} = 7(\text{時間})$$

最頻値は、もっとも人数が多い 8 時間。

3 (1) 平均値 = $\frac{(\text{階級値} \times \text{度数}) \text{の合計}}{\text{度数の合計}}$

$$= \frac{7.5 \times 6 + 12.5 \times 4 + 17.5 \times 12 + 22.5 \times 16 + 27.5 \times 2}{40}$$

$$= \frac{720}{40} = 18(\text{点})$$

度数のもっとも多い階級は、20 点以上 25 点未満の

階級だから、最頻値はその階級値 $\frac{20+25}{2} = 22.5(\text{点})$

(2) 中央値は、度数の合計が 40 人なので、値の小さい順に並べたとき、20 人目と 21 人目の値の平均に

なる。累積度数から、20 人目も 21 人目も、15 点以上 20 点未満の階級にはいつていることがわかる。

よって、階級値は $\frac{15+20}{2} = 17.5(\text{点})$

4 (1) ㊦ $\frac{24}{200} = 0.12$

㊩ $\frac{6}{200} = 0.03$

㊷ $0.84 + 0.12(\text{㊦}) = 0.96$

(2) B 中学校の、12 分以上 16 分未満の階級の累積相対度数 0.18 から答えればよい。

(3) 度数分布多角形では、両端に 0 の階級があるものとする。

(4) (3) のグラフが、全体的に A 中学校が左側で、B 中学校が右側にあることから考える。


5 (1) ㊦ $\frac{19}{100} = 0.19$

㊩ $\frac{85}{500} = 0.17$

(2) 投げた回数が多くなるにつれて、1 の目の出た回数の相対度数は 0.17 に近づいているので、この値が 1 の目の出る確率といえる。

p.188

- 1 (1) ㉞ 階級の幅
 (2) ㉠ 度数 ㉡ 累積度数
 (3) ㉢ 平均値 ㉣ 中央値
 ㉤ 最頻値
 (4) ㉦ 相対度数 ㉧ 累積相対度数
- 2 (1) ㉞ 0.16 ㉠ 0.56
 ㉡ 11 ㉢ 46
- (2) (人)



(3) 39 人

解説

- 2 (1) ㉞ 30kg 以上 35kg 未満の階級の度数と度数の合計より, $\frac{8}{50} = 0.16$
 ㉠ 30kg 以上 35kg 未満の階級の累積相対度数と 35kg 以上 40kg 未満の階級の相対度数より,
 $0.24 + 0.32 = 0.56$
 または, (累積相対度数) = $\frac{(\text{その階級の累積度数})}{(\text{度数の合計})}$
 より, $\frac{28}{50} = 0.56$
 ㉡ $28 + \boxed{11} = 39$ だから, $39 - 28 = 11$
 ㉢ $39 + 7 = 46$
- (3) 握力が 45kg 未満の生徒の人数は, 40kg 以上 45kg 未満の階級の累積度数であるから, 39 人。

p.189

- 1 500cm
- 2 (1) 平均値...26m 中央値...28m 範囲...28m
 (2) 平均値
 (3) 14 人目の記録...19m
 求めなおした中央値...26.5m

解説

- 1 ヒストグラムより, A 中学の 4.8m 以上が 2 人, B 中学の 4.8m 以上が 4 人なので, 全体の上位 6 人は A 中学から 2 人, B 中学から 4 人だとわかる。A 中学の 2 人の平均値が 498cm, B 中学の 4 人の平均値が 501cm なので,
- $$\frac{498 \times 2 + 501 \times 4}{6} = 500(\text{cm})$$
- 2 13 個のデータを値の小さい順に並べると,
 11, 18, 19, 21, 24, 25, 28,
 29, 29, 30, 30, 35, 39
- (1) 平均値は,
- $$\frac{11 + 18 + 19 + 21 + 24 + 25 + 28 + 29 \times 2 + 30 \times 2 + 35 + 39}{13} = \frac{338}{13} = 26(\text{m})$$
- 中央値は 7 番目の値だから, 28m
 範囲は, $39 - 11 = 28(\text{m})$
- (2) 平均値と等しいデータを加えても, 平均値は変化しない。また, 中央値について考えると, 26m は 14 個の中の小さい順に並べて 7 番目の値, 8 番目の値が 28m になるから,
- 中央値は, $\frac{26 + 28}{2} = 27(\text{m})$
- (3) 14 人目の記録を $x(\text{m})$ とすると,
- $$\frac{338 + x}{14} = 26 - 0.5 \text{ より, } x = 19$$
- このとき, 中央値は $\frac{25 + 28}{2} = 26.5(\text{m})$

p.190~p.191


- 1 (1) 5分
(2)

階級(分)	度数(人)	累積度数(人)
以上 5 ~ 未満 10	1	1
10 ~ 15	3	4
15 ~ 20	5	9
20 ~ 25	7	16
25 ~ 30	4	20
合計	20	

- (3) 20分以上25分未満の階級

- 2 (1) ㊦ 0.07 ㊧ 0.23 ㊨ 0.25
㊩ 0.06

- (2) (相対度数)



- (3) 例 全体の傾向として、B中学校の方がA中学校よりタイムが速い。

- 3 (1) ㊦ 0.400 ㊧ 0.525
㊨ 32 ㊩ 0.800

- (2) 20%

- 4 (1) 15点
(2) 中央値…12.5点 平均値…13点

- 5 (1) ㊦ 0.41 ㊧ 0.42
(2) 0.42 (3) 裏

解説

- 1 (1) $10 - 5 = 5$ (分), $15 - 10 = 5$ (分),
 $20 - 15 = 5$ (分), …となるので, 階級の幅は, 5分。
(3) 通学時間が短い順に並べた10番目の生徒は, 累積度数が最初に10人をこえる階級にはいつている。
15分以上20分未満の階級の累積度数は9人
20分以上25分未満の階級の累積度数は16人
よって, 20分以上25分未満の階級にはいつている。

- 2 (1) ㊦ $\frac{13}{182} = 13 \div 182 = 0.071\cdots$ より, 0.07
㊧ $\frac{42}{182} = 42 \div 182 = 0.230\cdots$ より, 0.23

㊨ $\frac{45}{182} = 45 \div 182 = 0.247\cdots$ より, 0.25

㊩ $\frac{11}{182} = 11 \div 182 = 0.060\cdots$ より, 0.06

- (3) A中学校もB中学校も全体の分布の形は似ているが, A中学校の相対度数でもっとも大きいのが9.0秒以上9.5秒未満である。これに対して, B中学校は8.5秒以上9.0秒未満であるので, B中学校の方が全体的にタイムが速いことがわかる。

3 (1) ㊦ $\frac{16}{40} = 16 \div 40 = 0.400$

㊧ $0.125 + 0.400 = 0.525$

または, $\frac{21}{40} = 21 \div 40 = 0.525$

㊨ $21 + 11 = 32$

㊩ $0.525 + 0.275 = 0.800$

または, $\frac{32}{40} = 32 \div 40 = 0.800$

- (2) 80点以上100点未満の階級の相対度数が80点以上の生徒の割合を表しているから,
 $0.200 \times 100 = 20(\%)$

- 4 18個のデータを値の小さい順に並べると,
5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20

- (1) 最大値は20, 最小値は5だから, $20 - 5 = 15$ (点)

- (2) 小さい順に並べた9番目は12, 10番目は13だから, 中央値は,

$(12 + 13) \div 2 = 12.5$ (点)

平均値は,

$(5 + 6 + 8 \times 2 + 9 + 10 + 11 \times 2 + 12 + 13 + 15$

$+ 16 + 17 \times 2 + 18 + 19 \times 2 + 20) \div 18$

$= 234 \div 18$

$= 13$ (点)

5 (1) ㊦ $\frac{203}{500} = 203 \div 500 = 0.406$ より, 0.41

㊧ $\frac{844}{2000} = 844 \div 2000 = 0.422$ より, 0.42

- (2) 投げた回数が多くなるにつれて, 表が出た回数の相対度数は0.42に近づいているので, この値が表が出る確率といえる。

- (3) (2)より, 投げた回数全体における表が出る割合は,
 $0.42 \times 100 = 42(\%)$
割合が50%未満なので, 表は裏よりも出にくいと考えられる。

